

副作用初期症状DB

■ 概要

- ・添付文書に記載されている副作用の初期症状に関するデータベースです。
- ・副作用の早期発見などのためにご利用いただくことが可能です。

■ 特徴・機能

- ・副作用毎に初期症状を登録し、その初期症状を「自覚症状」、「自他覚症状」、「他覚症状」に分類しており、服薬指導を行う相手に応じた確認を行うことが可能です。
- ・【重大な副作用】【その他の副作用】など、添付文書の記載項目名の情報も保持しています。

■ 目的・利用場面

- ・初期症状から疑われる副作用の検索にご利用いただけます。
- ・初期症状から副作用の早期発見や原因となる医薬品の特定にご利用いただけます。

■データ例

『リスパダールOD錠1mg』の添付文書（抜粋）

【重大な副作用】

低血糖（頻度不明）：脱力感、倦怠感、冷汗、振戦、傾眠、意識障害等の低血糖症状が認められた場合には、投与を中止し適切な処置を行うこと。



『低血糖』のデータ（概略）

低血糖	
自	頭痛
自	だるい
自	動悸がする
自	寒気がする
自	冷や汗が出る
自	気分が悪くなる
自	立ちくらみがする
自	全身の力が抜ける感じがする
自	強い空腹感がある
自	眼がちらつく
自他	ふらつく
自他	気が遠くなる
自他	手の震え
自他	汗の量が増える
自他	体の震え
自他	ろれつが回らない
自他	うとうとする
自他	脈が速くなる
自他	痙攣する
自他	吐き気・嘔吐
他	意識を失う
他	何を言っているのかわからない

▶ 患者さん本人に確認する症状（自覚症状）

▶ 患者さん本人・患者さんの家族に確認する症状（自他覚症状）

▶ 患者さんの家族に確認する症状（他覚症状）