

貯 法：室温保存
有効期間：3年

選択的セロトニン再取り込み阻害剤

セルトラリン塩酸塩錠

セルトラリン錠25mg「アメル」 セルトラリン錠50mg「アメル」 セルトラリン錠100mg「アメル」

Sertraline Tablets 「AMEL」

セルトラリン塩酸塩口腔内崩壊錠

セルトラリンOD錠25mg「アメル」 セルトラリンOD錠50mg「アメル」

Sertraline OD Tablets 「AMEL」

	錠25mg	錠50mg	錠100mg
承認番号	22700AMX00993	22700AMX00994	22700AMX00995
販売開始	2015年12月	2015年12月	2015年12月

	OD錠25mg	OD錠50mg
承認番号	22700AMX00926	22700AMX00927
販売開始	2015年12月	2015年12月

劇薬
処方箋医薬品
注意－医師等の処方箋により使用すること

- 2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）**
2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2.2 MAO阻害剤を投与中あるいは投与中止後14日間以内の患者[10.1、11.1.1 参照]
2.3 ビモジドを投与中の患者[10.1、11.1.8 参照]

3. 組成・性状

3.1 組成




販売名	セルトラリン錠 25mg「アメル」	セルトラリン錠 50mg「アメル」
有効成分	1錠中、セルトラリン塩酸塩 28mg（セルトラリンとして 25mg）を含有する。	1錠中、セルトラリン塩酸塩 56mg（セルトラリンとして 50mg）を含有する。
添加剤	結晶セルロース、無水リン酸水素カルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、デンプングリコール酸ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール 400、ポリソルベート 80、カルナウバロウ	結晶セルロース、無水リン酸水素カルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、デンプングリコール酸ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール 400、ポリソルベート 80、カルナウバロウ

販売名	セルトラリン錠 100mg「アメル」
有効成分	1錠中、セルトラリン塩酸塩 112mg（セルトラリンとして 100mg）を含有する。
添加剤	結晶セルロース、無水リン酸水素カルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、デンプングリコール酸ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、タルク、酸化チタン、カルナウバロウ

販売名	セルトラリン OD 錠 25mg「アメル」	セルトラリン OD 錠 50mg「アメル」
有効成分	1錠中、セルトラリン塩酸塩 28mg（セルトラリンとして 25mg）を含有する。	1錠中、セルトラリン塩酸塩 56mg（セルトラリンとして 50mg）を含有する。
添加剤	D-マンニトール、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、スクラロース、トメントール、ステアリン酸マグネシウム	D-マンニトール、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、クロスカルメロースナトリウム、スクラロース、トメントール、ステアリン酸マグネシウム

3.2 製剤の性状

販売名	剤形・色	外形・大きさ等	識別コード
セルトラリン錠 25mg「アメル」	フィルムコーティング錠		セルトラリン 25 アメル
	白色～帯黄白色	長径：約 8.4mm 短径：約 4.1mm 厚さ：約 2.6mm 質量：約 78.5mg	
セルトラリン錠 50mg「アメル」	割線入りフィルムコーティング錠		セルトラリン 50 アメル
	白色～帯黄白色	直径：約 7.1mm 厚さ：約 3.4mm 質量：約 154.5mg	

販売名	剤形・色	外形・大きさ等	識別コード
セルトラリン錠 100mg「アメル」	割線入り フィルム コーティ ング錠		セルトラ リン 100 アメル
	白色～帯 黄白色	直径：約 9.1mm 厚さ：約 4.2mm 質量：約 308.0mg	
セルトラリン OD錠 25mg「ア メル」	素錠		KW STL /OD 25
	白色	直径：約 7.5mm 厚さ：約 2.8mm 質量：約 150.0mg	
セルトラリン OD錠 50mg「ア メル」	割線入り 素錠		KW STL /OD 50
	白色	直径：約 9.5mm 厚さ：約 3.5mm 質量：約 300.0mg	

4. 効能又は効果

- うつ病・うつ状態
- パニック障害
- 外傷後ストレス障害

5. 効能又は効果に関連する注意

〈効能共通〉

5.1 抗うつ剤の投与により、24歳以下の患者で、自殺念慮、自殺企図のリスクが増加するとの報告がある。本剤の投与にあたっては、リスクとベネフィットを考慮すること。
[8.1-8.4、9.1.1、9.1.2、9.7.2、9.7.3、15.1.1 参照]

〈うつ病・うつ状態〉

5.2 本剤を18歳未満の大うつ病性障害患者に投与する際には適応を慎重に検討すること。[9.7.2 参照]

〈外傷後ストレス障害〉

5.3 本剤を18歳未満の外傷後ストレス障害患者に投与する際には適応を慎重に検討すること。[9.7.3 参照]

5.4 外傷後ストレス障害の診断は、DSM^(注)等の適切な診断基準に基づき慎重に実施し、基準を満たす場合にのみ投与すること。

注) DSM: American Psychiatric Association (米国精神医学会)の Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (精神疾患の診断・統計マニュアル)

6. 用法及び用量

通常、成人にはセルトラリンとして1日25mgを初期用量とし、1日100mgまで漸増し、1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により1日100mgを超えない範囲で適宜増減する。

7. 用法及び用量に関連する注意

本剤の投与量は、予測される効果を十分に考慮し、必要最小限となるよう、患者ごとに慎重に観察しながら調節すること。[8.1-8.4、9.1.1、9.1.2、15.1.1 参照]

8. 重要な基本的注意

〈効能共通〉

8.1 うつ症状を呈する患者は希死念慮があり、自殺企図のおそれがあるので、このような患者は投与開始早期ならびに投与量を変更する際には患者の状態及び病態の変化を注意深く観察すること。[5.1、7.、8.2-8.4、9.1.1、9.1.2、9.7.2、9.7.3、15.1.1 参照]

8.2 不安、焦燥、興奮、パニック発作、不眠、易刺激性、敵意、攻撃性、衝動性、アカシジア/精神運動不穏、軽躁、躁病等があらわれることが報告されている。また、因果関係は明らかではないが、これらの症状・行動を来した症例において、基礎疾患の悪化又は自殺念慮、自殺企図、他害行為が報告されている。患者の状態及び病態の変化を注意深く観察するとともに、これらの症状の増悪が観察された場合には、

服薬量を増量せず、徐々に減量し、中止するなど適切な処置を行うこと。[5.1、7.、8.1、8.3、8.4、9.1.1-9.1.4、9.7.2、9.7.3、15.1.1 参照]

8.3 自殺目的での過量服用を防ぐため、自殺傾向が認められる患者に処方する場合には、1回分の処方日数を最小限にとどめること。[5.1、7.、8.1、8.2、8.4、9.1.1、9.1.2、9.7.2、9.7.3、15.1.1 参照]

8.4 家族等に自殺念慮や自殺企図、興奮、攻撃性、易刺激性等の行動の変化及び基礎疾患悪化があらわれるリスク等について十分説明を行い、医師と緊密に連絡を取り合うよう指導すること。[5.1、7.、8.1-8.3、9.1.1-9.1.4、9.7.2、9.7.3、15.1.1 参照]

8.5 眠気、めまい等があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分注意させること。

8.6 投与中止(突然の中止)により、不安、焦燥、興奮、浮動性めまい、錯感覚、頭痛及び悪心等があらわれることが報告されている。投与を中止する場合には、突然の中止を避け、患者の状態を観察しながら徐々に減量すること。

*8.7 血小板減少があらわれることがあるので、投与期間中は血液検査を行うこと。[11.1.9 参照]

〈外傷後ストレス障害〉

8.8 外傷後ストレス障害患者においては、症状の経過を十分に観察し、本剤を漫然と投与しないよう、定期的に本剤の投与継続の要否について検討すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 躁うつ病患者

躁転、自殺企図があらわれることがある。[5.1、7.、8.1-8.4、9.1.2、9.7.2、9.7.3、15.1.1 参照]

9.1.2 自殺念慮又は自殺企図の既往のある患者、自殺念慮のある患者

自殺念慮、自殺企図があらわれることがある。[5.1、7.、8.1-8.4、9.1.1、9.7.2、9.7.3、15.1.1 参照]

9.1.3 脳の器質的障害又は統合失調症の素因のある患者

精神症状を増悪させることがある。[8.2、8.4、9.1.4 参照]

9.1.4 衝動性が高い併存障害を有する患者

精神症状を増悪させることがある。[8.2、8.4、9.1.3 参照]

9.1.5 てんかん等の痙攣性疾患又はこれらの既往歴のある患者

痙攣発作を起こすことがある。[11.1.3 参照]

9.1.6 QT延長又はその既往歴のある患者、著明な徐脈や低カリウム血症等がある患者

QT延長、心室頻拍(torsade de pointesを含む)を起こすおそれがある。[10.2、11.1.8 参照]

9.1.7 出血の危険性を高める薬剤を併用している患者、出血傾向又は出血性素因のある患者

鼻出血、胃腸出血、血尿等が報告されている。[10.2、16.7.1 参照]

9.1.8 緑内障又はその既往歴のある患者

眼圧上昇を起こし、症状が悪化するおそれがある。

9.3 肝機能障害患者

血中濃度半減期が延長し、AUC及びC_{max}が増大することがある。[16.6.2 参照]

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

9.5.1 妊娠末期に本剤あるいは他のSSRI、SNRIが投与された女性が出産した新生児において、入院期間の延長、呼吸補助、経管栄養を必要とする、離脱症状と同様の症状が出産直後にあらわれたとの報告がある。臨床所見としては、呼吸窮迫、チアノーゼ、無呼吸、発作、体温調節障害、哺乳障害、嘔吐、低血糖症、筋緊張低下、筋緊張亢進、反射亢進、振戦、びくつき、易刺激性、持続性の泣きが報告されている。

9.5.2 海外の疫学調査において、妊娠中に本剤を含むSSRIを投与された女性が出産した新生児において、新生児遷延性肺高血圧症のリスクが増加したとの報告がある¹⁾²⁾。このうち1つの調査では、妊娠34週以降に生まれた新生児における新生児遷延性肺高血圧症発生のリスク比は、妊娠早期の投与

では2.4 (95%信頼区間 1.2-4.3)、妊娠早期及び後期の投与では3.6 (95%信頼区間 1.2-8.3)であった²⁾。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。ヒト母乳中へ移行することが報告されている³⁾。[16.3.2 参照]

9.7 小児等

9.7.1 小児等を対象とした国内臨床試験は実施していない。

9.7.2 海外で実施された6～17歳のうつ病性障害 (DSM-IV^{注)}における分類)を対象としたプラセボ対照二重盲検比較試験において有効性が確認できなかったとの報告がある。また、本剤群でみられた自殺企図 [1.1% (2/189例)] は、プラセボ群 [1.1% (2/184例)] と同様であり、自殺念慮は本剤群で1.6% (3/189例)にみられた。これらの事象と本剤との関連性は明らかではない⁴⁾ (海外において本剤は小児うつ病性障害患者に対する適応を有していない)。[5.1、5.2、8.1-8.4、9.1.1、9.1.2、15.1.1 参照]

9.7.3 海外で実施された6～17歳の外傷後ストレス障害 (DSM-IV^{注)}における分類)を対象としたプラセボ対照二重盲検比較試験において有効性が確認できなかったとの報告がある。当該試験にて自殺企図はみられなかったが、自殺念慮は本剤群でのみ4.5% (3/67例)にみられた⁵⁾ (海外において本剤は小児外傷後ストレス障害患者に対する適応を有していない)。[5.1、5.3、8.1-8.4、9.1.1、9.1.2、15.1.1 参照]

注) DSM-IV: American Psychiatric Association (米国精神医学会)のDiagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition (DSM-IV 精神疾患の診断・統計マニュアル)

9.8 高齢者

高齢者においては、肝機能、腎機能の低下を考慮し、用量等に注意して慎重に投与すること。本剤は、主として肝臓で代謝されるが、高齢者では肝機能が低下していることが多いため、高い血中濃度が持続し、出血傾向の増強等がおこるおそれがある。[16.6.3 参照]

10. 相互作用

本剤は肝代謝酵素 CYP2C19、CYP2C9、CYP2B6 及び CYP3A4 等で代謝される⁶⁾。[16.4 参照]

10.1 併用禁忌 (併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
MAO 阻害剤 セレギリン塩酸塩 (エフピー) ラサギリンメシル酸塩 (アジレクト) サフィナミドメシル酸塩 (エクフィナ) [2.2、11.1.1 参照]	発汗、不穏、全身痙攣、異常高熱、昏睡等の症状があらわれることがある。 なお、MAO 阻害剤の投与を受けた患者に本剤を投与する場合、また本剤投与後に MAO 阻害剤を投与する場合には、14 日間以上の間隔をおくこと。	セロトニンの分解が阻害され、脳内セロトニン濃度が高まると考えられる。
ピモジド (オーラップ) [2.3、11.1.8 参照]	ピモジドとの併用により、ピモジドの AUC 及び C _{max} がそれぞれ 1.4 倍増加したとの報告がある ⁷⁾ 。 ピモジドは QT 延長を引き起こすことがあるので本剤と併用しないこと。	機序不明

10.2 併用注意 (併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
メチルチオニウム塩化物水和物 (メチレンブルー) [11.1.1 参照]	セロトニン症候群があらわれるおそれがある。	左記薬剤の MAO 阻害作用によりセロトニン作用が増強されると考えられる。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
リネゾリド [11.1.1 参照]	セロトニン症候群の症状 (錯乱、協調運動障害、血圧上昇等) があらわれることがある。このような症状があらわれた場合には、本剤と併用薬の両方あるいはいずれか一方の投与を中止するなど適切な処置を行うこと。	リネゾリドは非選択的、可逆的 MAO 阻害作用を有する。
5-HT _{1B/1D} 受容体作動薬 スマトリプタン コハク酸塩 ゾルミトリプタン エレトリプタン 臭化水素酸塩	脱力、反射亢進、協調運動障害、錯乱、不安、焦燥、興奮があらわれることがある。	相互に作用を増強させるおそれがある。
トラマドール塩酸塩含有製剤 メサドン塩酸塩 ペンタゾシン含有製剤 ペチジン塩酸塩含有製剤 タベンタドール塩酸塩 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物含有製剤 フェンタニル含有製剤	セロトニン作用が増強されるおそれがある。	これらの薬剤はセロトニン作用を有する。
L-トリプトファン含有する製剤 アミノ酸製剤 経腸成分栄養剤	セロトニン作用が増強されるおそれがある。	L-トリプトファンはセロトニンの前駆物質であるため、脳内セロトニン濃度が高まるおそれがある。
セイヨウオトギリソウ (St. John's Wort、セント・ジョーンズ・ワート) 含有食品	セロトニン作用が増強されるおそれがある。	セイヨウオトギリソウ (St. John's Wort、セント・ジョーンズ・ワート) はセロトニン作用を有する。
炭酸リチウム	セロトニンに関連した副作用 (振戦等) が増大するおそれがある。	相互に作用を増強させるおそれがある。
三環系抗うつ剤 クロミプラミン塩酸塩 イミプラミン塩酸塩 アミトリプチリン塩酸塩	薬剤の血中濃度が上昇し、作用が増強されるおそれがある。	本剤がこれらの薬剤の代謝を阻害することがある。
ワルファリン [9.1.7、16.7.1 参照]	ワルファリンのプロトロンビン反応時間曲線下面積が軽度増加 (8%) したとの報告がある ⁸⁾ 。本剤の投与を開始もしくは中止する場合は、プロトロンビン時間を慎重にモニターすること。	機序不明

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
出血傾向が増強する薬剤 非定型抗精神病剤 フェノチアジン系薬剤 三環系抗うつ剤 アスピリン等の非ステロイド系抗炎症剤 ワルファリン等 [9.1.7、16.7.1 参照]	異常出血（鼻出血、胃腸出血、血尿等）が報告されているので、注意して投与すること。	SSRI の投与により血小板凝集能が阻害され、これらの薬剤との併用により出血傾向が増大することがある。
血糖降下薬 トルブタミド [16.7.2 参照]	トルブタミドのクリアランスが減少（16%）したとの報告がある ⁹⁾ 。	本剤がこの薬剤の代謝を阻害するためと考えられる。
シメチジン [16.7.3 参照]	本剤の AUC 及び C _{max} の増大（50%、24%）及び t _{1/2} の延長（26%）がみられたとの報告がある ¹⁰⁾ 。	本剤の代謝が阻害されたためと考えられる。
アルコール（飲酒）	本剤投与中は、飲酒を避けることが望ましい。	本剤との相互作用は認められていないが、他の抗うつ剤で作用の増強が報告されている。
QT 延長を起こすことが知られている薬剤 [9.1.6、11.1.8 参照]	QT 延長を起こすおそれがある。	併用により QT 延長作用が相加的に増加するおそれがある。
スルピリン水和物	本剤の血漿中濃度が低下し、有効性が減弱するおそれがある。	併用により CYP2B6 及び CYP3A4 が誘導され、本剤の代謝が促進されるためと考えられる。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 セロトニン症候群（頻度不明）

不安、焦燥、興奮、錯乱、発汗、下痢、発熱、高血圧、固縮、頻脈、ミオクロヌス、自律神経不安定等があらわれることがあるので、異常が認められた場合には投与を中止し、体冷却、水分補給等の全身管理とともに適切な処置を行うこと。[2.2、10.1、10.2 参照]

11.1.2 悪性症候群（頻度不明）

無動緘黙、強度の筋強剛、嚥下困難、頻脈、血圧の変動、発汗等が発現し、それに引き続き発熱がみられる場合がある。抗精神病剤との併用時にあらわれることが多いため、特に注意すること。異常が認められた場合には、抗精神病剤及び本剤の投与を中止し、体冷却、水分補給等の全身管理とともに適切な処置を行うこと。本症発現時には、白血球の増加や血清 CK の上昇がみられることが多く、また、ミオグロビン尿を伴う腎機能の低下がみられることがある。

11.1.3 痙攣（頻度不明）、昏睡（頻度不明）

[9.1.5 参照]

11.1.4 肝機能障害（頻度不明）

肝不全、肝炎、黄疸があらわれることがあるので、必要に応じて肝機能検査を行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

11.1.5 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（SIADH）（頻度不明）

低ナトリウム血症、低浸透圧血症、尿中ナトリウム排泄量の増加、高張尿、痙攣、意識障害等を伴う抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（SIADH）があらわれることがあるので、異常が認められた場合には投与を中止し、水分摂取の制限等適切な処置を行うこと。

11.1.6 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）（頻度不明）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）（頻度不明）

異常が認められた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

11.1.7 アナフィラキシー（頻度不明）

アナフィラキシー（呼吸困難、喘鳴、血管浮腫等）があらわれることがある。

11.1.8 QT 延長（頻度不明）、心室頻拍（torsade de pointes を含む）（頻度不明）

[2.3、9.1.6、10.1、10.2 参照]

* 11.1.9 血小板減少（頻度不明）

¹¹⁾[8.7 参照]

* 11.2 その他の副作用

	1%以上	1%未満	頻度不明
精神系	睡眠障害（不眠等）、錯乱状態	悪夢、易刺激性、易興奮性、うつ病、躁病、精神症、多幸症、リビドー減退、記憶障害、注意力障害	攻撃的反応、不安、焦燥、興奮、幻覚
神経系	傾眠（15.2%）、頭痛、浮動性めまい、振戦、感覚減退	起立性めまい、味覚異常、頭部不快感、運動障害（アカシジア、錐体外路症状、運動過多、歯ざしり、歩行異常等）、錯感覚	不随意性筋収縮、ジスキネジー、ジストニー、片頭痛、失神
感覚器		調節障害、視覚異常（霧視、羞明、視力低下等）、耳鳴、耳閉感、回転性眩暈	散瞳
循環器	動悸	起立性低血圧、血圧低下、血圧上昇、頻脈	
肝臓	ALT 増加、AST 増加、γ-GTP 増加	LDH 増加、Al-P 増加、総ビリルビン増加、直接ビリルビン増加	
* 血液		白血球数増加又は減少、単球増加、出血傾向（鼻出血、胃腸出血、血尿等）	血小板機能異常、紫斑、斑状出血、皮下出血
消化器系	悪心・嘔吐（20.3%）、口内乾燥、下痢・軟便、便秘、腹部不快感、腹痛、腹部膨満、消化不良、食欲不振	胃腸障害、食欲亢進	肺炎
過敏症	発疹	蕁麻疹、そう痒症、顔面浮腫、眼窩周囲浮腫	光線過敏性反応

	1%以上	1%未満	頻度不明
泌尿器・生殖器		排尿困難、尿閉、頻尿、性機能障害(射精遅延、持続勃起症等)、月経障害	尿失禁・夜尿、乳汁漏出症、女性化乳房
筋・骨格系		背部痛、関節痛、筋緊張異常(筋硬直、筋緊張亢進、筋痙攣等)	開口障害
代謝・内分泌		総蛋白減少、総コレステロール増加、尿糖、尿蛋白	甲状腺機能低下症、低ナトリウム血症、高プロラクチン血症、血糖異常
その他	倦怠感、多汗(発汗、寝汗等)	無力症、熱感、異常感、胸痛、胸部圧迫感、疲労、発熱、はてり、悪寒、体重減少、体重増加、末梢性浮腫、あくび、脱毛症	気管支痙攣、好酸球性肺炎

13. 過量投与

本剤の過量投与、又は本剤の過量投与他剤やアルコールとの併用による死亡例が海外で報告されている。

13.1 症状

傾眠、胃腸障害(悪心・嘔吐等)、頻脈、振戦、不安、焦燥、興奮、浮動性めまいのようなセロトニン性の副作用であり、まれに昏睡が認められた。

13.2 処置

特異的な解毒剤は知られていない。活性炭投与等の適切な処置を行うこと。催吐は薦められない。本剤は分布容積が大きいので、強制利尿、透析、血液灌流及び交換輸血はあまり効果的でない。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

〈製剤共通〉

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

14.2 服用時の注意

〈OD錠〉

本剤は舌の上のせて唾液を湿潤させると崩壊するため、水なしで服用可能である。また、水で服用することもできる。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

15.1.1 海外で実施された大うつ病性障害等の精神疾患を有する患者を対象とした、本剤を含む複数の抗うつ剤の短期プラセボ対照臨床試験の検討結果において、24歳以下の患者では、自殺念慮や自殺企図の発現のリスクが抗うつ剤投与群でプラセボ群と比較して高かった。

なお、25歳以上の患者における自殺念慮や自殺企図の発現のリスクの上昇は認められず、65歳以上においてはそのリスクが減少した。[5.1、7、8.1-8.4、9.1.1、9.1.2、9.7.2、9.7.3 参照]

15.1.2 主に50歳以上を対象に実施された海外の疫学調査において、選択的セロトニン再取り込み阻害剤及び三環系抗うつ剤を含む抗うつ剤を投与された患者で、骨折のリスクが上昇したとの報告がある。

15.1.3 海外で実施された臨床試験において、本剤を含む選択的セロトニン再取り込み阻害剤が精子特性を変化させ、受精率に影響を与える可能性が報告されている¹²⁾、¹³⁾。

15.1.4 電気けいれん療法との併用については、その有効性及び安全性が確立されていない。

16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 単回投与

健康成人男性(6例)にセルトラリン50、100及び200mg^{注)}を食後に単回経口投与した時の最高血漿中濃度(Cmax)はそれぞれ15.1、30.8及び90.8ng/mL、血漿中濃度-時間曲線下面積(AUC_{0-∞})はそれぞれ0.557、1.081及び2.975μg・hr/mLであり用量に伴い増加した。また、血漿中濃度半減期(T_{1/2})は50、100及び200mg^{注)}投与に対し、それぞれ22.5、24.1及び23.4時間であった¹⁴⁾。

セルトラリン50、100及び200mg^{注)}を単回投与した時のセルトラリンの薬物動態パラメータ

投与量(mg)	n	Cmax(ng/mL)	Tmax(hr)	T _{1/2} (hr)	AUC _{0-∞} (μg・hr/mL)
50	6	15.1±4.3	8.7±2.1	22.5±8.1	0.557±0.261
100	6	30.8±7.9	6.7±1.0	24.1±7.9	1.081±0.551
200 ^{注)}	6	90.8±15.0	6.3±1.5	23.4±6.2	2.975±1.001

(平均値±標準偏差)

Tmax: 最高濃度到達時間

16.1.2 反復投与

健康成人男性(6例)にセルトラリン100mgを1日1回10日間朝食後に反復経口投与した時の血漿中濃度は投与5日目には定常状態に達し、10日間の反復投与により理論値(R=2.0)を超える蓄積(投与1日目: Cmax 40.5ng/mL、AUC₀₋₂₄ 0.612μg・hr/mL、10日目: Cmax 69.9ng/mL、AUC₀₋₂₄ 1.22μg・hr/mL)は認められなかった¹⁵⁾。

16.1.3 生物学的同等性試験

〈セルトラリン錠50mg「アメル」、セルトラリン錠100mg「アメル」〉


セルトラリン錠50mg「アメル」及びセルトラリン錠100mg「アメル」と各標準製剤について、下記のとおりクロスオーバー法により健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log(0.80)~log(1.25)の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された¹⁶⁾。

	標準製剤	試験投与量
セルトラリン錠50mg「アメル」	ジェイゾプロフト錠50mg	それぞれ1錠(セルトラリンとして50mg)
セルトラリン錠100mg「アメル」	ジェイゾプロフト錠50mg	セルトラリン錠100mg「アメル」1錠、標準製剤2錠(それぞれセルトラリンとして100mg)

薬物動態パラメータ(生物学的同等性)

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₍₀₋₉₆₎ (ng・hr/mL)	Cmax(ng/mL)	Tmax(hr)	T _{1/2} (hr)
セルトラリン錠50mg「アメル」	535.25±187.91	18.81±5.77	5.7±0.8	24.98±4.74
ジェイゾプロフト錠50mg	499.98±207.51	17.39±6.60	5.5±0.7	25.29±4.49

(Mean±S.D., n=24)




血漿中未変化体濃度(生物学的同等性)

薬物動態パラメータ (生物学的同等性)

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC _(0→96) (ng・hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T _{1/2} (hr)
セルトラリン錠 100mg「アメル」	923.47± 281.60	39.13± 9.01	4.6±0.9	24.36± 4.55
ジェイゾロフト錠 50mg	892.81± 290.70	34.60± 8.63	5.0±0.6	24.80± 4.60

(Mean±S.D., n = 24)



血漿中未変化体濃度 (生物学的同等性)

〈セルトラリン OD 錠 50mg 「アメル」〉


セルトラリン OD 錠 50mg 「アメル」 とジェイゾロフト錠 50mg を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1 錠 (セルトラリンとして 50mg) 健康成人男子に水なし又は水ありで絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ (AUC、Cmax) について 90% 信頼区間法にて統計解析を行った結果、log (0.80) ~ log (1.25) の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された¹⁶⁾。

薬物動態パラメータ (生物学的同等性、水なし)

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC _(0→96) (ng・hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T _{1/2} (hr)
セルトラリン OD 錠 50mg 「アメル」	340.81± 112.56	11.09± 2.82	6.1±1.1	25.00± 4.16
ジェイゾロフト錠 50mg*	376.63± 121.38	13.09± 3.36	5.9±1.2	25.09± 4.65

(Mean±S.D., n = 62)

※水で服用




血漿中未変化体濃度 (生物学的同等性、水なし)

薬物動態パラメータ (生物学的同等性、水あり)

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC _(0→96) (ng・hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T _{1/2} (hr)
セルトラリン OD 錠 50mg 「アメル」	449.36± 177.70	14.62± 3.98	5.7±0.8	25.48± 6.03
ジェイゾロフト錠 50mg	460.35± 180.51	15.55± 4.65	5.6±0.7	26.22± 7.88

(Mean±S.D., n = 22)



血漿中未変化体濃度 (生物学的同等性、水あり)

血漿中濃度並びに AUC、Cmax 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

16.2 吸収

16.2.1 食事の影響

健康成人男性 (12 例) にセルトラリン 75mg を空腹時及び食後に単回経口投与し、薬物動態を比較した。食後投与時の Cmax は 21.9ng/mL であり、空腹時投与時の 18.1ng/mL に比べて高く、有意な差が認められたものの、AUC_{0-∞}、Tmax 及び T_{1/2} には有意差は認められなかった¹⁷⁾。

16.3 分布

16.3.1 蛋白結合

in vitro におけるヒト血清蛋白結合率は約 98.5%であった¹⁸⁾。

16.3.2 乳汁中移行

大うつ病を伴う授乳婦 (26 例) にセルトラリン 25~200mg^{注)} を 1 日 1 回、14 日間以上反復経口投与した時、いずれの授乳婦の乳汁においてもセルトラリンは検出され、乳児の血清においてもセルトラリンが確認された³⁾ (外国人データ)。[9.6 参照]

16.4 代謝

16.4.1 本剤の主代謝物は N-デスマチルセルトラリンであり、この他にも数種の代謝物が存在する。なお、代謝には CYP2C19、CYP2C9、CYP2B6 及び CYP3A4 など少なくとも 4 種の肝薬物代謝酵素が関与しており、多代謝経路を示す⁶⁾。[10. 参照]

16.5 排泄

16.5.1 健康成人男性 (6 例) にセルトラリン 50、100 及び 200mg^{注)} を食後に単回経口投与した時、投与後 24 時間までの未変化体の尿中排泄率はいずれの用量においても約 0.1%であった¹⁴⁾。

16.5.2 健康成人男性 (外国人、2 例) に¹⁴C-標識セルトラリン 50mg を単回経口投与した時、投与後 9 日目までに尿中に投与放射能の 43.5% (ほとんどが代謝物) が、糞中に 44.5% がそれぞれ排泄された¹⁹⁾。

16.6 特定の背景を有する患者

16.6.1 腎機能障害患者

腎機能障害患者 (24 例) にセルトラリン 100mg を食後に単回経口投与した時、セルトラリンの血漿中濃度は腎機能の障害により高くなる傾向を示したが、その上昇の程度は小さかった²⁰⁾ (外国人データ)。

16.6.2 肝機能障害患者

慢性非活動性肝不全患者 (Child-Pugh の分類 A 及び B、10 例) にセルトラリン 100mg を単回経口投与した時の血漿中濃度推移は、健康成人と比較して、Cmax が約 1.7 倍、AUC_{0-∞} が 4.4 倍増加し、T_{1/2} は 2.3 倍延長した。また、セルトラリン 50mg を肝機能障害者 (改訂 Child-Pugh の分類 A 及び B、10 例) に 21 日間反復経口投与した時、単回投与時と同様の傾向が認められた²¹⁾ (外国人データ)。[9.3 参照]

16.6.3 高齢者

高齢うつ病患者 (日本人、男性 5 例、女性 8 例、65 歳以上) にセルトラリンを 1 日 1 回、最高 6 週間反復経口投与 (25mg/日から 75mg/日まで増量) した。高齢者の T_{1/2} (男性 30.7 時間、女性 35.7 時間) は、健康成人男性の 23.4 時間と比較して長くなる傾向が認められた^{15)、22)}。

高齢者 (外国人、男性 11 例、女性 11 例、65 歳以上) 及び

成人（外国人、男性 11 例、女性 11 例、18～45 歳）にセルトラリンを 1 日 1 回、30 日間反復経口投与（50mg/日から 200mg/日^註）まで増量した。成人男性の最終投与後の Cmax は 117.5ng/mL であり、高齢者（男性 135.4ng/mL、女性 147.1ng/mL）及び成人女性（165.6ng/mL）に比べ低かったが、AUC にはいずれの群間でも有意な差は認められなかった^{23,24}。[9.8 参照]

16.7 薬物相互作用

16.7.1 ワルファリン

健康成人男性（15 例）にセルトラリン反復投与（50mg/日から 200mg/日^註）まで増量）前及び投与 22 日目にワルファリン 0.75mg/kg を単回経口投与し、ワルファリンのプロトロンビン反応時間曲線下面積（AUC₀₋₁₂₀）及び血漿蛋白結合率を比較した。セルトラリンとワルファリンの併用投与により、わずかながら有意な変化が認められた^{8,25}（外国人データ）。[9.1.7、10.2 参照]

16.7.2 トルプタミド

健康成人男性（25 例）にセルトラリン反復投与（50mg/日から 200mg/日^註）まで増量）前及び投与 22 日目にトルプタミド 1000mg を単回静脈内投与した時のトルプタミドの薬物動態を検討した。セルトラリンとトルプタミドの併用投与により、トルプタミドのクリアランスに軽度な低下が認められた⁹（外国人データ）。[10.2 参照]

16.7.3 シメチジン

健康成人男性（12 例）にシメチジン 800mg を 8 日間反復投与し、投与 2 日目にセルトラリン 100mg を単回併用投与した時のセルトラリンの薬物動態を検討した。シメチジンの併用により、プラセボ併用時に比べセルトラリンの AUC_{0-∞} は約 50%、Cmax 及び T_{1/2} は約 25%増大した¹⁰（外国人データ）。[10.2 参照]

注）本剤の承認用量は 1 日 100mg までである。

16.8 その他

セルトラリン錠 25mg「アメル」及びセルトラリン OD 錠 25mg「アメル」について、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン（平成 24 年 2 月 29 日 薬食審査発 0229 第 10 号）」に基づき、セルトラリン錠 50mg「アメル」及びセルトラリン OD 錠 50mg「アメル」を標準製剤としたとき、溶出挙動が同等と判断され、生物学的に同等とみなされた²⁶。

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

〈うつ病・うつ状態〉

17.1.1 国内第Ⅱ相及び第Ⅲ相試験

前期第Ⅱ相試験（内科・心療内科）、前期第Ⅱ相試験（精神科）、後期第Ⅱ相試験、第Ⅲ相試験（内科・心療内科）、第Ⅲ相試験（精神科）、ランダム化治療中止試験、高齢者試験及び長期投与試験を総合（計 8 試験）した場合、セルトラリン塩酸塩の改善率は 55.7%（491/882 例）であった。初期用量で効果が認められない患者においても、増量することで効果が認められた。ただし、第Ⅲ相試験ではトラゾドン塩酸塩及びアミトリプチリン塩酸塩と比較する二つの二重盲検比較試験が行われたが、有効性について両薬剤と同等、あるいはそれ以上の効果を有することは検証されなかった。有効性を検討した上記 8 試験に再燃抑制試験を加え総合（計 9 試験）した場合、副作用発現頻度は 51.5%（497/965 例）であった。主な副作用は悪心 13.2%（127/965 例）、傾眠 12.3%（119/965 例）、口内乾燥 10.2%（98/965 例）、頭痛 6.8%（66/965 例）及び下痢 5.0%（48/965 例）であった²⁷⁻²⁹。

17.1.2 国内第Ⅲ相試験

主要評価項目であるセルトラリン塩酸塩の再燃率は 8.5%（10/117 例）であり、プラセボの 19.5%（23/118 例）に比べ、統計的に有意に低かった。また、Kaplan-Meier 法による再燃-時間の推定曲線から、セルトラリン塩酸塩の再燃率は二重盲検期を通してプラセボに比べて統計的に有意に低く推移した。副次的評価項目であるハミルトンうつ病評価尺度（HAM-D）合計点はプラセボに比べて統計的に有意に少なく、Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire（Q-LES-Q）スコアにおいてもプラセボに比べて統計的に有意な改善が、二重盲検期において認められた³⁰。

有効性評価項目の成績

	セルトラリン塩酸塩群 (症例数：117 ^{a)})		プラセボ群 (症例数：118)	
	二重盲検期 開始時	終了・ 中止時	二重盲検期 開始時	終了・ 中止時
HAM-D 合計点 ^{b)}	8.3±3.4	6.3±6.2	8.1±3.3	9.7±7.2
全般改善度 における改善率	81.2% (95/117)	84.6% (99/117)	87.3% (103/118)	67.8% (80/118)
Q-LES-Q スコア ^{b)}	62.9±11.2	67.4±15.3	64.2±10.4	61.3±12.6

a) Q-LES-Q スコアにおける終了・中止時の症例数は 116 例

b) 平均値±標準偏差

副作用発現頻度は、非盲検期 66.2%（239/361 例）であり、主な副作用は悪心、傾眠、口内乾燥、頭痛であった。また、二重盲検期では、セルトラリン塩酸塩群 29.9%（35/117 例）、プラセボ群 31.4%（37/118 例）であった。主な副作用は、セルトラリン塩酸塩群で傾眠、頭痛、浮動性めまい、下痢及び上腹部痛であった^{30,31}。

セルトラリン塩酸塩を用いた治療によって改善の得られたうつ状態の再燃を抑える点でプラセボより優れていることを検証したが、うつ状態の改善における有効性では、すでに発売されている抗うつ薬（トラゾドン塩酸塩及びアミトリプチリン塩酸塩）と同等あるいはそれ以上の効果があることを検証していない。

〈パニック障害〉

17.1.3 国内第Ⅱ相及び第Ⅲ相試験

前期第Ⅱ相試験、後期第Ⅱ相試験及びランダム化治療中止試験を総合（計 3 試験）した場合、改善率は 72.7%（352/484 例）であった。初期用量で効果が認められない患者においても、増量することで効果が認められた。

副作用発現頻度は 74.9%（384/513 例）であった。主な副作用は、悪心 29.6%（152/513 例）、傾眠 20.7%（106/513 例）、頭痛 9.6%（49/513 例）、下痢 9.2%（47/513 例）、口内乾燥 7.6%（39/513 例）、浮動性めまい 7.6%（39/513 例）、倦怠感 6.6%（34/513 例）、食欲不振 6.6%（34/513 例）、胃不快感 6.0%（31/513 例）、食欲減退 5.8%（30/513 例）であった^{29,32}。

17.1.4 国内第Ⅱ相試験

プラセボ群、セルトラリン塩酸塩 25-75mg 群（低用量群）、50-150mg^註 群（高用量群）の 3 群間で二重盲検比較試験が行われた結果、全般改善度ではプラセボ群との間に有意差は認められなかった。また、パニック発作の回数では、投与前の発作回数に群間で不均衡がみられたが、プラセボに比べて高用量群では有意な減少は認められなかったものの、低用量群において有意な減少が認められた。

副作用発現頻度は、低用量群で 55.3%（26/47 例）、高用量群で 56.8%（25/44 例）であった。主な副作用は低用量群で下痢、傾眠及び悪心、高用量群で悪心であった³³。

17.1.5 国内第Ⅲ相試験

主要評価項目であるセルトラリン塩酸塩の再燃率は 10.1%（12/119 例）であり、プラセボの 13.2%（16/121 例）に比べて低かったが、有意差は認められなかった。また、Kaplan-Meier 法による再燃-時間の推定曲線から、セルトラリン塩酸塩の再燃率は二重盲検期を通してプラセボに比べて低く推移したが有意な差は認められなかった。副次的評価項目である全般改善度における改善率、パニック発作の回数、パニック障害重症度評価尺度（PDSS）合計点においては二重盲検期において、プラセボに比べて統計的に有意な差が認められた。

有効性評価項目の成績

	セルトラリン塩酸塩群 (症例数：119)		プラセボ群 (症例数：121)	
	二重盲検期 開始時	終了・ 中止時	二重盲検期 開始時	終了・ 中止時
全般改善度 における改善率	100% (119/119)	89.9% (107/119)	100% (121/121)	74.4% (90/121)

パニック発作の回数 (回/週) a) b)	0.8±1.7	0.6±1.3	0.9±2.1	1.0±1.8
PDSS 合計点 b)	5.7±3.6	4.3±4.1	6.5±3.7	6.4±4.7

a) 対数変換を施し解析を実施した

b) 平均値±標準偏差

副作用発現頻度は、非盲検期で81.5% (321/394例)であり、主な副作用は悪心、傾眠、頭痛であった。また、二重盲検期では、26.9% (32/119例)であり、主な副作用は悪心、頭痛、初期不眠症、下痢及び寝汗であった^{34),35)}。

17.1.6 製造販売後臨床試験

パロキセチンを対照とした二重盲検比較試験 (製造販売後臨床試験) における主要評価項目である12週・中止時のPanic and Agoraphobia Scale (PAS) 合計点において、セルトラリン塩酸塩の有効性はパロキセチンと同程度であった³⁶⁾。

Panic and Agoraphobia Scale (PAS) 合計点 (Efficacy Evaluable Set)

対象例数	セルトラリン	パロキセチン
	120	117
調整済み平均 ^{a)} (95%信頼区間)	-17.5 (-19.0, -16.0)	-16.7 (-18.2, -15.1)
調整済み平均の差 ^{a)} (95%信頼区間)	-0.9 (-3.0, 1.3)	

a) ベースラインのPAS合計点で調整

セルトラリン塩酸塩が投与された治療期の総症例147例中100例 (68.0%) に243件の副作用が発現した。主な副作用は、悪心30例 (20.4%)、傾眠30例 (20.4%)、下痢22例 (15.0%) であった。

注) 本剤の承認用量は1日100mgまでである。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

セルトラリン塩酸塩は脳内セロトニン神経に存在するセロトニン再取り込み機構を強力かつ選択的に阻害する薬物であり、脳内のシナプス間隙におけるセロトニン濃度を高めて持続的にセロトニン神経伝達を亢進するものと考えられる³⁷⁾⁻³⁹⁾。

18.1.1 ラット脳シナプトゾームを用いた実験における、セルトラリン塩酸塩のセロトニン再取り込みに対する50%抑制濃度 (IC₅₀) は0.058 μmol/Lであり、セルトラリン塩酸塩のセロトニン再取り込み阻害作用はノルエピネフリン又はドパミン再取り込み阻害作用に比べ約20倍選択的であった³⁹⁾ (*in vitro*)。

18.1.2 ラット又はウシ脳膜標品を用いた試験において、セルトラリン塩酸塩はセロトニン再取り込み部位に高い親和性を示すが、アドレナリン受容体 (α₁、α₂、β)、ドパミン受容体、ムスカリン受容体、ヒスタミン受容体 (H₁)、セロトニン受容体 (5-HT_{1A}、5-HT_{1B}、5-HT_{1D}、5-HT₂)、ベンゾジアゼピン受容体への結合親和性は低かった³⁷⁾ (*in vitro*)。またマウスにおける脳内ノルアドレナリン神経系、ドパミン神経系及びムスカリン性アセチルコリン神経系の活性化により生ずる行動や症状に影響を及ぼさなかった³⁷⁾。

18.2 抗うつ作用

18.2.1 マウスを用いた強制水泳試験において不動時間を短縮した³⁹⁾。

18.2.2 ラットを用いた強制水泳試験において逃避行動 (水車回転数) の減少を抑制した⁴⁰⁾。

18.2.3 嗅球摘出ラットの自発運動の亢進を抑制した⁴¹⁾。

18.2.4 拘束ストレス負荷による正常ラットの自発運動量の減少を回復させた⁴²⁾。

18.3 抗不安作用

18.3.1 マウスを用いたガラス玉覆い隠し試験においてガラス玉覆い隠し行動を抑制した⁴³⁾。

18.4 5-HT_{2c} 受容体作動薬による自発運動量減少に対する作用

m-クロロフェニルピペラジン (m-CPP) の投与によるラットの自発運動量の減少を軽減した⁴⁴⁾。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般名

セルトラリン塩酸塩 (Sertraline Hydrochloride)

化学名

(+) - (1*S*,4*S*) -4- (3,4-Dichlorophenyl) -1,2,3,4-tetrahydro-*N*-methyl-1-naphthylamine monohydrochloride

分子式

C₁₇H₁₇Cl₂N · HCl

分子量


342.69

性状

白色の結晶性の粉末である。

メタノール、エタノール (95)、*N,N*-ジメチルアセトアミドにやや溶けやすく、水に溶けにくい。

構造式



20. 取扱い上の注意

〈OD錠〉

アルミピロー開封後は湿気を避けて保存すること。

**22. 包装

〈セルトラリン錠 25mg 「アメル」〉

100錠 [10錠 (PTP) ×10]

500錠 [10錠 (PTP) ×50]

500錠 [瓶、バラ]

〈セルトラリン錠 50mg 「アメル」〉

100錠 [10錠 (PTP) ×10]

500錠 [10錠 (PTP) ×50]

500錠 [瓶、バラ]

〈セルトラリン錠 100mg 「アメル」〉

100錠 [10錠 (PTP) ×10]

〈セルトラリン OD錠 25mg 「アメル」〉

100錠 [10錠 (PTP) ×10、乾燥剤入り]

〈セルトラリン OD錠 50mg 「アメル」〉

100錠 [10錠 (PTP) ×10、乾燥剤入り]

*23. 主要文献

- 1) Chambers, C. D. et al. : N Engl J Med. 2006 ; 354 (6) : 579-587
- 2) Källén, B. et al. : Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2008 ; 17 (8) : 801-806
- 3) Stowe, Z. N. et al. : J Clin Psychiatry. 2003 ; 64 (1) : 73-80
- 4) Wagner, K. D. et al. : JAMA. 2003 ; 290 (8) : 1033-1041
- 5) Robb, A. S. et al. : J Child Adolesc Psychopharmacol. 2010 ; 20 (6) : 463-471
- 6) Obach, R. S. et al. : Drug Metab Dispos. 2005 ; 33 (2) : 262-270
- 7) Alderman, J. : Clin Ther. 2005 ; 27 (7) : 1050-1063
- 8) Apseloff, G. et al. : Clin Pharmacokinet. 1997 ; 32 (Suppl. 1) : 37-42
- 9) Tremaine, L. M. et al. : Clin Pharmacokinet. 1997 ; 32 (Suppl. 1) : 31-36
- 10) シメチジンとの薬物相互作用 (ジェイゾロフト錠 : 2006年4月20日承認、申請資料概要へ.3. (4) .3))
- 11) MID-NET®を用いた調査結果の概要 (MID-NET®を用いた抗うつ薬による血小板減少指標への影響評価) : <https://www.pmda.go.jp/files/000265771.pdf>
- 12) Safarinejad, M. R. : J Urol. 2008 ; 180 (5) : 2124-2128
- 13) Tanrikut, C. et al. : Fertil Steril. 2010 ; 94 (3) : 1021-1026
- 14) 上島国利, 他 : 神経精神薬理. 1997 ; 19 (6) : 395-423
- 15) 上島国利, 他 : 神経精神薬理. 1997 ; 19 (6) : 425-447

- 16) 社内資料：生物学的同等性試験 [錠 50mg、錠 100mg、OD 錠 50mg]
- 17) 上島国利, 他：神経精神薬理. 1997；19 (6)：461-470
- 18) 血清蛋白結合 (ジェイゾロフト錠：2006年4月20日承認、申請資料概要へ.2.(2).4)
- 19) 血漿及び尿・糞中代謝物 (ジェイゾロフト錠：2006年4月20日承認、申請資料概要へ.3.(3).1)
- 20) 腎機能低下者における試験 (ジェイゾロフト錠：2006年4月20日承認、申請資料概要へ.3.(5).1)
- 21) 肝機能低下者における試験 (ジェイゾロフト錠：2006年4月20日承認、申請資料概要へ.3.(5).2)
- 22) 上島国利, 他：神経精神薬理. 1997；19 (6)：569-585
- 23) Ronfeld, R. A. et al.：Clin Pharmacokinet. 1997；32 (Suppl.1)：22-30
- 24) 高齢者における試験 (ジェイゾロフト錠：2006年4月20日承認、申請資料概要へ.3.(1).4)
- 25) 薬物相互作用 (ジェイゾロフト錠：2006年4月20日承認、審査報告書)
- 26) 社内資料：生物学的同等性試験 (溶出挙動比較)
- 27) 有効性のまとめ、うつ病及びうつ状態のまとめ (ジェイゾロフト錠：2006年4月20日承認、申請資料概要ト.2.(1).1)
- 28) うつ病及びうつ状態を対象とした臨床試験・第Ⅲ相試験 (ジェイゾロフト錠：2006年4月20日承認、申請資料概要ト.1.(2).1)③)
- 29) 安全性のまとめ (ジェイゾロフト錠：2006年4月20日承認、申請資料概要ト.2.(2))
- 30) Kamijima, K. et al.：Int Clin Psychopharmacol. 2006；21 (1)：1-9
- 31) うつ病及びうつ状態を対象とした臨床試験・ランダム化治療中止試験 (ジェイゾロフト錠：2006年4月20日承認、申請資料概要ト.1.(2).1)④)
- 32) 臨床試験成績のまとめ、パニック障害 (ジェイゾロフト錠：2006年4月20日承認、申請資料概要ト.2.(1).2)
- 33) パニック障害を対象とした臨床試験・後期第Ⅱ相試験 (ジェイゾロフト錠：2006年4月20日承認、申請資料概要ト.1.(3).1)②)
- 34) Kamijima, K. et al.：Int Clin Psychopharmacol. 2005；20 (5)：265-273
- 35) パニック障害を対象とした臨床試験・ランダム化治療中止試験 (ジェイゾロフト錠：2006年4月20日承認、申請資料概要ト.1.(3).1)③)
- 36) 製造販売後試験の概要 (ジェイゾロフト錠：2016年3月25日承認、再審査報告書)
- 37) 各種受容体に対する作用 (ジェイゾロフト錠：2006年4月20日承認、申請資料概要ホ.1.(2).5)
- 38) Sprouse, J. et al.：Neuropsychopharmacology. 1996；14 (4)：225-231
- 39) Koe, B. K. et al.：J Pharmacol Exp Ther. 1983；226 (3)：686-700
- 40) Tadokoro, C. et al.：Psychopharmacology. 1997；130 (2)：124-130
- 41) Butler, J. et al.：Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 1988；12 (5)：585-594
- 42) Kennett, G. A. et al.：Eur J Pharmacol. 1987；134 (3)：265-274
- 43) 山中教造, 他：神経精神薬理. 1997；19 (6)：387-393
- 44) Kennedy, A. J. et al.：Psychopharmacology. 1993；113 (2)：262-268

24. 文献請求先及び問い合わせ先

共和薬品工業株式会社 お問い合わせ窓口
〒530-0005 大阪市北区中之島3-2-4
☎ 0120-041-189
FAX 06-6121-2858

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

共和薬品工業株式会社
大阪市北区中之島3-2-4