

貯法：2～8℃に保存
有効期間：5年

承認番号	22900AMX00956000
販売開始	2017年11月

抗ヒトTNF α モノクローナル抗体製剤
インフリキシマブ（遺伝子組換え）[インフリキシマブ後続2] 製剤

生物由来製品
劇薬
処方箋医薬品^注

インフリキシマブ[®] BS点滴静注用100mg「あゆみ」

Infliximab BS for I.V. Infusion 100mg [AYUMI]

注）注意—医師等の処方箋により使用すること

1. 警告

（効能共通）

1.1 本剤投与により、結核、敗血症を含む重篤な感染症及び脱髄疾患の悪化等があらわれることがあり、本剤との関連性は明らかではないが、悪性腫瘍の発現も報告されている。本剤が疾病を完治させる薬剤でないことも含め、これらの情報を患者に十分説明し、患者が理解したことを確認した上で、治療上の有益性が危険性を上まわると判断される場合にのみ投与すること。また、本剤の投与において、重篤な副作用により、致命的な経過をたどることがあるので、緊急時に十分に措置できる医療施設及び医師のもとで投与し、本剤投与後に副作用が発現した場合には、主治医に連絡するよう患者に注意を与えること。[1.2.1、1.2.2、1.4、2.1、2.2、2.4、8.2、8.7、9.1.1、9.1.2、9.1.4、11.1.1、11.1.2、11.1.4、15.1.4 参照]

1.2 感染症

1.2.1 重篤な感染症

敗血症、真菌感染症を含む日和見感染症等の致死的な感染症があらわれることがあるため、十分な観察を行うなど感染症の発症に注意すること。[1.1、2.1、9.1.1、11.1.1 参照]

1.2.2 結核

播種性結核（粟粒結核）及び肺外結核（髄膜、胸膜、リンパ節等）を含む結核が発症し、死亡例も認められている。結核の既感染者では症状の顕在化及び悪化のおそれがあるため、本剤投与に先立って結核に関する十分な問診及び胸部レントゲン検査に加え、インターフェロン- γ 遊離試験又はツベルクリン反応検査を行い、適宜胸部CT検査等を行うことにより、結核感染の有無を確認すること。また、結核の既感染者には、抗結核薬の投与をした上で、本剤を投与すること。ツベルクリン反応等の検査が陰性の患者において、投与後活動性結核が認められた例も報告されている。[1.1、2.2、8.2、9.1.2、11.1.2 参照]

1.3 本剤投与に関連する反応

1.3.1 Infusion reaction

本剤投与中あるいは投与終了後2時間以内に発現するinfusion reactionのうち、重篤なアナフィラキシー（呼吸困難、気管支痙攣、血圧上昇、血圧低下、血管浮腫、チアノーゼ、低酸素症、発熱、蕁麻疹等）、痙攣があらわれることがある。本剤は緊急時に十分な対応のできる準備をした上で投与を開始し、投与終了後も十分な観察を行うこと。また、重篤なinfusion reactionが発現した場合には、本剤の投与を中止し、適切な処置を行うこと。[2.3、8.6、8.8、9.1.7、11.1.3、14.2.2 参照]

1.3.2 遅発性過敏症（再投与の場合）

本剤投与後3日以上経過後に重篤なものを含む遅発性過敏症（筋肉痛、発疹、発熱、多関節痛、そう痒、手・顔面浮腫、嚥下障害、蕁麻疹、咽頭痛、頭痛等）があらわれることがある。再投与には遅発性過敏症の発現に備え、十分な観察を行うこと。[2.3、8.6、9.1.7、11.1.7 参照]

1.4 脱髄疾患の臨床症状及び/又は画像診断上の悪化が、本剤を含むTNF抑制作用を有する薬剤であらわれることがある。脱髄疾患（多発性硬化症等）及びその既往歴のある患者には投与しないこととし、脱髄疾患を疑う患者や家族歴を有する患者に投与する場合には、適宜画像診断等の検査を実

施するなど、十分な観察を行うこと。[1.1、2.4、9.1.4、11.1.4 参照]

（関節リウマチ）

1.5 本剤の治療を行う前に、非ステロイド性抗炎症剤及び他の抗リウマチ薬等の使用を十分勘案すること。また、本剤についての十分な知識とリウマチ治療の経験をもつ医師が使用すること。

（ベーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎）

1.6 本剤の治療を行う前に、既存治療薬（シクロスポリン等）の使用を十分勘案すること。また、ベーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎の治療経験を持つ眼科医と本剤について十分な知識を有する内科等の医師が診断と治療に対して十分な連携をとり使用すること。

（乾癬）

1.7 本剤の治療を行う前に、既存の全身療法（紫外線療法を含む）の使用を十分勘案すること。また、乾癬の治療経験を持つ医師と本剤について十分な知識を有する医師が連携をとり使用すること。

（強直性脊椎炎）

1.8 本剤の治療を行う前に、既存治療薬（非ステロイド性抗炎症剤等）の使用を十分勘案すること。また、本剤についての十分な知識と強直性脊椎炎の診断及び治療の経験をもつ医師が使用すること。

（クローン病）

1.9 本剤の治療を行う前に、既存治療薬の使用を十分勘案すること。また、本剤についての十分な知識とクローン病治療の経験をもつ医師が使用すること。

（潰瘍性大腸炎）

1.10 本剤の治療を行う前に、既存治療薬の使用を十分勘案すること。また、本剤についての十分な知識と潰瘍性大腸炎治療の経験をもつ医師が使用すること。

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

2.1 重篤な感染症（敗血症等）の患者〔症状を悪化させるおそれがある。〕[1.1、1.2.1、9.1.1、11.1.1 参照]

2.2 活動性結核の患者〔症状を悪化させるおそれがある。〕[1.1、1.2.2、8.2、9.1.2、11.1.2 参照]

2.3 本剤の成分又はマウス由来の蛋白質（マウス型、キメラ型、ヒト化抗体等）に対する過敏症の既往歴のある患者[1.3.1、1.3.2、8.6、8.8、9.1.7、11.1.3、11.1.7、14.2.2 参照]

2.4 脱髄疾患（多発性硬化症等）及びその既往歴のある患者〔症状の再燃及び悪化のおそれがある。〕[1.1、1.4、9.1.4、11.1.4 参照]

2.5 うっ血性心不全の患者 [15.1.2 参照]

3. 組成・性状

3.1 組成

成分・含量 (1バイアル中)	有効成分	インフリキシマブ（遺伝子組換え） [インフリキシマブ後続2] 100mg
	添加剤	精製白糖：500mg ポリソルベート80：0.5mg リン酸二水素ナトリウム：2.65mg リン酸水素二ナトリウム二水和物： 5.89mg

本剤は、チャイニーズハムスター卵巣細胞を用いて製造される。

3.2 製剤の性状

性状	白色の塊又は粉末（凍結乾燥ケーキ）
pH	6.9～7.5（日局注射用水10mLに溶解）
浸透圧比 （生理食塩液に対する比）	0.5～0.7（日局注射用水10mLに溶解）

**4. 効能又は効果

既存治療で効果不十分な下記疾患

- 関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）
- ベーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎
- 尋常性乾癬、乾癬性関節炎、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症
- 強直性脊椎炎
- 次のいずれかの状態を示すクローン病の治療及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限り）
中等度から重度の活動期にある患者
外瘻を有する患者
- 中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限り）

5. 効能又は効果に関連する注意

（関節リウマチ）

5.1 過去の治療において、非ステロイド性抗炎症剤及び他の抗リウマチ薬（メトトレキサート製剤を含む）等による適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与を行うこと。また、メトトレキサート製剤に本剤を上乗せすることのリスク・ベネフィットを判断した上で使用すること。

（ベーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎）

5.2 過去の治療において、他の薬物療法（シクロスポリン等）等の適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に本剤の投与を行うこと。

（乾癬）

5.3 過去の治療において、既存の全身療法（紫外線療法を含む）等の適切な治療を行っても、皮疹が体表面積の10%以上に存在する場合、もしくは難治性の皮疹、関節症状又は膿疱を有する場合に本剤の投与を行うこと。

（強直性脊椎炎）

5.4 過去の治療において、他の薬物療法（非ステロイド性抗炎症剤等）等の適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に本剤の投与を行うこと。

（クローン病）

5.5 過去の治療において、栄養療法、他の薬物療法（5-アミノサリチル酸製剤、ステロイド、アザチオプリン等）等の適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に本剤の投与を行うこと。なお、寛解維持投与は漫然と行わず経過を観察しながら行うこと。

（潰瘍性大腸炎）

5.6 過去の治療において、他の薬物療法（5-アミノサリチル酸製剤、ステロイド、アザチオプリン等）等の適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に本剤の投与を行うこと。寛解維持効果は確認されていないため、寛解導入後には本剤の継続投与の必要性を検討し、他の治療法への切替えを考慮すること。

6. 用法及び用量

（関節リウマチ）

通常、インフリキシマブ（遺伝子組換え）[インフリキシマブ後続2]として、体重1kg当たり3mgを1回の投与量とし点滴静注する。初回投与後、2週、6週に投与し、以後8週間の間隔で投与を行うこと。なお、6週の投与以後、効果が不十分又は効果が減弱した場合には、投与量の増量や投与間隔の短縮が可能である。これらの投与量の増量や投与間隔の短縮は段階的に行う。1回の体重1kg当たりの投与量の上限は、8週間の間隔であれば10mg、投与間隔を短縮した場合であれば6mgとする。また、最短の投与間隔は4週間とする。本剤は、メトトレキサート製剤による治療に併用して用いること。

（ベーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎）

通常、インフリキシマブ（遺伝子組換え）[インフリキシマブ後続2]として、体重1kg当たり5mgを1回の投与量とし点滴静注する。初回投与後、2週、6週に投与し、以後8週間の間隔で投与を行うこと。

（乾癬）

通常、インフリキシマブ（遺伝子組換え）[インフリキシマブ後続2]として、体重1kg当たり5mgを1回の投与量とし点滴静注する。初回投与後、2週、6週に投与し、以後8週間の間隔で投与を

行うこと。なお、6週の投与以後、効果が不十分又は効果が減弱した場合には、投与量の増量や投与間隔の短縮が可能である。これらの投与量の増量や投与間隔の短縮は患者の状態に応じて段階的に行う。1回の体重1kg当たりの投与量の上限は、8週間の間隔であれば10mg、投与間隔を短縮した場合であれば6mgとする。また、最短の投与間隔は4週間とする。

（強直性脊椎炎）

通常、インフリキシマブ（遺伝子組換え）[インフリキシマブ後続2]として、体重1kg当たり5mgを1回の投与量とし点滴静注する。初回投与後、2週、6週に投与し、以後6～8週間の間隔で投与を行うこと。

（クローン病）

通常、インフリキシマブ（遺伝子組換え）[インフリキシマブ後続2]として、体重1kg当たり5mgを1回の投与量とし点滴静注する。初回投与後、2週、6週に投与し、以後8週間の間隔で投与を行うこと。なお、6週の投与以後、効果が減弱した場合には、投与量の増量又は投与間隔の短縮が可能である。投与量を増量する場合は、体重1kg当たり10mgを1回の投与量とすることができる。投与間隔を短縮する場合は、体重1kg当たり5mgを1回の投与量とし、最短4週間の間隔で投与することができる。

（潰瘍性大腸炎）

通常、インフリキシマブ（遺伝子組換え）[インフリキシマブ後続2]として、体重1kg当たり5mgを1回の投与量とし点滴静注する。初回投与後、2週、6週に投与し、以後8週間の間隔で投与を行うこと。

7. 用法及び用量に関連する注意

（効能共通）

7.1 本剤と他の生物学的製剤の併用について安全性及び有効性は確立していないので併用を避けること。

（関節リウマチ）

7.2 国内及び海外の臨床試験により、メトトレキサート製剤併用での有効性及び安全性が確認されている。国内臨床試験におけるメトトレキサート製剤の併用量は、6mg/週以上であり、メトトレキサート併用時の本剤に対する抗体の産生率は、メトトレキサート非併用時よりも低かった。なお、メトトレキサート製剤以外の抗リウマチ薬併用の有用性は確立していない。[8.8、16.1.3 参照]

7.3 初回、2週、6週投与までは10mg/kg等への増量投与は行わないこと。また、増量により感染症の発現頻度が高まる恐れがあるため、感染症の発現には十分注意すること。10mg/kg等の高用量を初回投与から行うことにより、重篤な感染症の発現頻度が高まったとの報告がある¹⁾。

7.4 本剤による効果は、通常投与開始から14週以内に得られることが確認されている。14週以内に全く効果が得られない場合や、増量や投与間隔の短縮を行っても効果が得られない場合には、現在の治療計画の継続を慎重に再考すること。

7.5 本剤とアバタセプト（遺伝子組換え）の併用は行わないこと。海外で実施したプラセボを対照とした臨床試験において、本剤を含む抗TNF製剤とアバタセプト（遺伝子組換え）の併用療法を受けた患者では併用による効果の増強は示されおらず、感染症及び重篤な感染症の発現率が本剤を含む抗TNF製剤のみによる治療を受けた患者での発現率と比べて高かった。

（乾癬）

7.6 初回、2週、6週投与までは10mg/kg等への増量投与は行わないこと。また、増量により感染症の発現頻度が高まる恐れがあるため、感染症の発現には十分注意すること。本剤による効果が全く認められない場合や、増量や投与間隔の短縮を行っても症状の改善が認められない場合には、現在の治療計画の継続を慎重に再考すること。

（クローン病）

7.7 本剤を初回投与後、2週、6週と投与した後、臨床症状や内視鏡所見等により治療効果を評価すること。効果が認められない場合には、さらに継続投与を行っても効果が得られない可能性があり、他の治療法を考慮すること。また、10mg/kgへの増量や投与間隔の短縮は、5mg/kg 8週間隔投与による治療により効果は認められたものの、維持療法中に効果が減弱し、症状の再燃が認められた患者に対して行うこと。増量又は投与間隔の短縮を行っても効果が認められない場合には、他の治療法を考慮すること。

（潰瘍性大腸炎）

7.8 本剤を初回投与後、2週、6週と投与した後、8週時点で臨床症状や内視鏡所見等により治療効果を評価すること。効果が認められない場合には、さらに継続投与を行っても効果が得られない可能性があり、他の治療法を考慮すること。

8. 重要な基本的注意

- 8.1 本剤は血中濃度が長期にわたり持続するため（5mg/kg投与時は少なくとも8～12週間）、この間には副作用の発現に注意すること。また、他の生物製剤との切り替えの際も注意すること。
- 8.2 本剤投与に先立って結核に関する十分な問診及び胸部レントゲン検査に加え、インターフェロン- γ 遊離試験又はツベルクリン反応検査を行い、適宜胸部CT検査等を行うことにより、結核感染の有無を確認すること。また、本剤投与中も、胸部レントゲン検査等の適切な検査を定期的に行うなど結核症の発現には十分に注意し、患者に対し、結核を疑う症状が発現した場合（持続する咳、発熱等）には速やかに主治医に連絡するよう説明すること。[1.1、1.2.2、2.2、9.1.2、11.1.2 参照]
- 8.3 本剤を含む抗TNF製剤によるB型肝炎ウイルスの再活性化が報告されているので、本剤投与に先立って、B型肝炎ウイルス感染の有無を確認すること。[9.1.3 参照]
- 8.4 本剤を投与した後、発熱、咳嗽、呼吸困難等の間質性肺炎の症状があらわれた場合には速やかに主治医に連絡するよう患者に説明すること。[9.1.5、11.1.5 参照]
- 8.5 本剤治療中は、生ワクチン接種を行わないこと。また、本剤の投与と生ワクチン接種との間隔は十分にあげることが望ましい。やむを得ず生ワクチン接種から本剤の投与まで十分な間隔をあげることができない場合には、リスク・ベネフィットを慎重に判断した上で使用すること。生ワクチンによる感染症発現の可能性が否定できない。
- 8.6 本剤投与中はinfusion reactionに対する適切な薬剤治療（アドレナリン、副腎皮質ホルモン剤、抗ヒスタミン剤又はアセトアミノフェン等）や緊急処置を直ちに実施できるよう十分な体制のもとで、投与を開始し、投与終了後も十分な観察を行うこと。また、遅発性過敏症（3日以上経過後）があらわれることがあるので、患者に十分説明し、発疹、発熱、そう痒、手・顔面浮腫、蕁麻疹、頭痛等が発現した場合、主治医に連絡するよう指示するなど適切な対応をとること。[1.3.1、1.3.2、2.3、8.8、9.1.7、11.1.3、11.1.7、14.2.2 参照]
- 8.7 臨床試験における投与後3年間の追跡調査で、悪性リンパ腫等の悪性腫瘍の発現が報告されている。慢性炎症性疾患のある患者に長期の免疫抑制剤を投与した場合、感染症や悪性リンパ腫の発現の危険性が高まることが報告されている。また、本剤を含む抗TNF製剤を使用した小児や若年成人においても、悪性リンパ腫等の悪性腫瘍が報告されている。本剤に起因するか明らかでないが、悪性腫瘍等の発現には注意すること。[1.1、15.1.4 参照]
- 8.8 本剤はマウス蛋白由来部分があるため、ヒトには異種蛋白であり、投与後、本剤に対する抗体が産生されることがある。臨床試験において本剤に対する抗体の産生が確認された患者群は、抗体が産生されなかった患者群に比べ、infusion reactionの発現が多いう傾向にあり、また、本剤の血中濃度の持続が短くなる傾向がみられ、血中濃度が低下した患者では効果の減弱の可能性がある。[1.3.1、2.3、7.2、8.6、9.1.7、11.1.3、14.2.2、16.1.2-16.1.7、16.6.1 参照]
- 8.9 本剤を投与した患者において、乾癬が悪化又は新規発現したとの報告がある。重症な場合には本剤投与の中止を考慮すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

- *9.1.1 感染症（重篤な感染症を除く）の患者又は感染症が疑われる患者
適切な処置と十分な観察が必要である。本剤は免疫反応を減弱する作用を有し、正常な免疫応答に影響を与える可能性がある。[1.1、1.2.1、2.1、11.1.1 参照]
- 9.1.2 結核の既往感染者（特に結核の既往歴のある患者及び胸部レントゲン上結核治癒所見のある患者）又は結核感染が疑われる患者
(1) 結核の既往感染者は、問診及び胸部レントゲン検査等を定期的（投与開始後2ヵ月間は可能な限り1ヵ月に1回、以降は適宜必要に応じて）に行うことにより、結核症状の発現に十分に注意すること。結核を活動化させるおそれがある。[1.1、1.2.2、2.2、8.2、11.1.2 参照]
(2) 結核の既往歴を有する場合及び結核が疑われる場合には、結核の診療経験がある医師に相談すること。以下のいずれかの患者には、原則として抗結核薬の投与をした上で、本剤を投与すること。
・胸部画像検査で陳旧性結核に合致するか推定される陰影を有する患者
・結核の治療歴（肺外結核を含む）を有する患者
・インターフェロン- γ 遊離試験又はツベルクリン反応検査などの検査により、既感染が強く疑われる患者
・結核患者との濃厚接触歴を有する患者

[1.1、1.2.2、2.2、8.2、11.1.2 参照]

9.1.3 B型肝炎ウイルスキャリアの患者又は既往感染者（HBs抗原陰性、かつHBc抗体またはHBs抗体陽性）

肝機能検査値や肝炎ウイルスマーカーのモニタリングを行うなど、B型肝炎ウイルスの再活性化の徴候や症状の発現に注意すること。本剤を含む抗TNF製剤が投与されたB型肝炎ウイルスキャリアの患者又は既往感染者において、B型肝炎ウイルスの再活性化が報告されている。なお、これらの報告の多くは、他の免疫抑制作用をもつ薬剤を併用投与した患者に起きている。[8.3 参照]

9.1.4 脱髄疾患が疑われる徴候を有する患者及び家族歴のある患者

- (1) 脱髄疾患が疑われる徴候を有する患者については、神経学的評価や画像診断等の検査を行い、慎重に危険性と有益性を評価した上で本剤適用の妥当性を検討し、投与後は十分に観察を行うこと。脱髄疾患発現のおそれがある。[1.1、1.4、2.4、11.1.4 参照]
(2) 脱髄疾患の家族歴のある患者は、適宜画像診断等の検査を実施し、十分に注意すること。脱髄疾患発現のおそれがある。[1.1、1.4、2.4、11.1.4 参照]

9.1.5 間質性肺炎の既往歴のある患者

定期的な問診を行うなど、注意すること。間質性肺炎が増悪又は再発することがある。[8.4、11.1.5 参照]

9.1.6 重篤な血液疾患（汎血球減少、再生不良性貧血等）の患者又はその既往歴のある患者

血液疾患が悪化するおそれがある。[11.1.9 参照]

9.1.7 本剤投与経験のある患者

Infusion Reaction、遅発性過敏症が発現する可能性がある。[1.3.1、1.3.2、2.3、8.6、8.8、11.1.3、11.1.7、14.2.2 参照]

9.5 妊婦

9.5.1 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上まわると判断される場合にのみ投与すること。本剤投与による生殖発生毒性試験は実施されていない（本剤がヒトTNF α 特異的で動物実験が実施できないため）。また、マウスTNF α を中和する抗体投与により、マウスを用いて検討された結果では、催奇形性、母体毒性、胎児毒性は認められていない。

9.5.2 本剤は胎盤通過性があるとの報告がある。従って、本剤の投与を受けた患者からの出生児においては、感染のリスクが高まる可能性があるため、生ワクチンを接種する際には注意が必要である。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

9.7 小児等

〈クローン病及び潰瘍性大腸炎〉

9.7.1 6歳未満の幼児等を対象とした国内臨床試験は実施していないため、これらの患者には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合のみ投与し、副作用の発現に十分注意すること。

〈上記以外の効能〉

9.7.2 小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

感染症等の副作用の発現に留意し、十分な観察を行うこと。一般に生理機能（免疫機能等）が低下している。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 感染症（3.5%）

敗血症、肺炎（ニューモシテイス肺炎を含む）、真菌感染症、脳炎、髄膜炎（リステリア菌性髄膜炎を含む）、骨髄炎等の重篤な感染症（日和見感染症を含む）があらわれることがある。なお、死亡に至った症例の多くは、感染症によるものであった。[1.1、1.2.1、2.1、9.1.1 参照]

11.1.2 結核（0.3%）

結核の発症は、投与初期からあらわれる可能性がある。また、肺外結核（髄膜、胸膜、リンパ節等）もあらわれることがあることからその可能性も十分考慮した観察を行うこと。[1.1、1.2.2、2.2、8.2、9.1.2 参照]

*11.1.3 重篤なinfusion reaction（0.6%）

ショック、アナフィラキシー（呼吸困難、気管支痙攣、血圧上昇、血圧低下、血管浮腫、チアノーゼ、低酸素症、発熱、蕁麻疹等の重篤な副作用）、痙攣があらわれることがある。また、infusion reactionに引き続き脳出血、脳梗塞があらわれることがある。[1.3.1、2.3、8.6、8.8、9.1.7、14.2.2 参照]

11.1.4 脱髄疾患（0.1%）

多発性硬化症、視神経炎、横断性脊髄炎、ギラン・バレー症候群等があらわれることがある。[1.1、1.4、2.4、9.1.4 参照]

11.1.5 間質性肺炎 (0.5%)

発熱、咳嗽、呼吸困難等の呼吸器症状に十分に注意し、異常が認められた場合には、速やかに胸部レントゲン検査、胸部CT検査及び血液ガス検査等を実施し、本剤及びメトトレキサート製剤の投与を中止するとともにニューモシスティス肺炎との鑑別診断(β-Dグルカンの測定等)を考慮に入れ、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。主としてメトトレキサート製剤併用時において、間質性肺炎を発現し致命的な経過をたどった症例が報告されている。[8.4、9.1.5 参照]

11.1.6 肝機能障害 (0.1%)

AST、ALT、γ-GTP、LDH等の著しい上昇を伴う重篤な肝機能障害があらわれることがある。

11.1.7 遅発性過敏症 (0.6%)

筋肉痛、発疹、発熱、多関節痛、そう痒、手・顔面浮腫、嚥下障害、蕁麻疹、咽頭痛、頭痛等を伴う遅発性過敏症(3日以上経過後)があらわれることがある。[1.3.2、2.3、8.6、9.1.7 参照]

11.1.8 抗dsDNA抗体の陽性化を伴うループス様症候群 (0.4%)

抗dsDNA抗体が陽性化し、関節痛、筋肉痛、皮疹等の症状があらわれることがある。このような場合には、投与を中止すること。

11.1.9 重篤な血液障害 (0.1%)

汎血球減少、血小板減少、白血球減少、顆粒球減少、血球貪食症候群、血小板減少性紫斑病があらわれることがある。[9.1.6 参照]

11.1.10 横紋筋融解症 (頻度不明)

脱力感、筋肉痛、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇に注意し、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	5%以上	1%以上~5%未満	1%未満	頻度不明
精神・神経系	頭痛	浮動性めまい、感覚鈍麻、異常感覚	頭部不快感、体位性めまい、知覚過敏、失神、嗅覚錯誤、味覚異常、神経痛、不随意性筋収縮、片頭痛、振戦、運動過多、ジスキネジー、脳梗塞、協調運動異常、不眠症、不安、神経過敏、うつ病、感情不安定、多幸気分、錯乱、傾眠(眠気)	多発性神経障害、ニューロパシー、てんかん発作
血液		貧血(鉄欠乏性貧血、溶血性貧血)、カリウム減少、血小板数増加	リンパ節炎、脾腫、単球減少症、リンパ球減少症、リンパ球増加症、単球増加症、白血球増加症、好中球増加症、好酸球増加症、赤血球異常、低カリウム血症、好酸球数減少、骨髓球数増加、アミラーゼ増加、総蛋白減少、総蛋白増加、アルブミン減少、クロール減少、ナトリウム減少、血沈亢進、リンパ球形態異常(異形リンパ球)、リンパ節症、後骨髓球数増加、尿酸増加、カリウム増加、CRP増加、ヘマトクリット減少	血栓性血小板減少性紫斑病
循環器		ほてり、潮紅、高血圧、低血圧、動悸、血圧低下、血圧上昇	血腫、蒼白、末梢性虚血、徐脈、不整脈、頻脈、心室性期外収縮、狭心症、心不全、心拍数増加	血管炎(IgA血管炎)
呼吸器	気道感染、咽喉頭炎	呼吸困難、気管支炎、咳嗽、鼻炎、副鼻腔炎	発声障害、咽喉絞扼感、鼻出血、胸膜炎、胸水、喘息、気管支痙攣、胸部X線(CT)異常、PaO ₂ 低下、KL-6増加、扁桃炎	間質性肺線維症

	5%以上	1%以上~5%未満	1%未満	頻度不明
肝臓		ALP増加	脂肪肝、肝炎、胆嚢炎、肝腫大、高ビリルビン血症	
泌尿器	血尿(尿潜血)	尿路感染、尿中ブドウ糖陽性、尿中蛋白陽性、BUN増加、尿沈渣	腎盂腎炎、排尿困難、尿中白血球陽性、頻尿、クレアチニン増加、尿中ウロビリノーゲン増加、膀胱炎	
消化器	悪心	嘔吐、下痢、腹痛、便秘、胃腸炎	上腹部痛、嚥下障害、逆流性食道炎、腸閉塞、腸管狭窄、消化不良、血便、腸管穿孔、胃炎、痔核、肛門周囲痛、憩室炎、腹部膨満、胃ポリープ、胃潰瘍、腹膜炎、腹部不快感、腸炎、胃不快感、軟便、放屁	
		口内炎、歯周病	口腔内潰瘍形成、歯痛、口唇炎、口腔内痛、齦歯、唾液腺炎、口渇、舌炎	
皮膚	発疹(膿疱性皮疹、斑状皮疹、斑状丘疹、小水疱性皮疹、そう痒性皮疹、湿疹、紅斑性皮疹、頭部批棘疹、丘疹、血管炎性皮疹)	白癬、皮膚炎(脂漏性皮膚炎、水疱性皮膚炎、乾癬様皮膚炎)、ざ瘡、毛包炎、そう痒症、蕁麻疹、紅斑(発赤)、多汗症	麦粒腫、せつ、皮膚真菌感染、皮膚裂傷、皮膚嚢腫、ざ瘡、皮膚乾燥、皮膚変色、皮膚剥脱、脱毛症、乾癬、斑状出血、点状出血、皮膚潰瘍、脂漏、過角化、光線過敏性反応、皮膚腫瘍、多毛症、アトピー性皮膚炎	
投与部位			注射部位反応(注射部位疼痛、注射部位炎症、注射部位腫脹、注射部位出血、注射部位そう痒感)	
眼			眼内炎、涙器障害、角膜炎、眼瞼炎、視覚障害、眼痛、眼球乾燥、羞明、強膜炎、緑内障、眼圧上昇、眼脂、結膜炎、結膜充血、視野欠損、網膜静脈閉塞	
耳			耳痛、回転性めまい、耳鳴、耳不快感(耳閉感)、耳感染(外耳炎、中耳炎、迷路炎)	
筋・骨格系		関節痛、筋痛	関節腫脹、背部痛、筋骨格硬直、頸部痛、関節炎、骨痛、腱炎、筋力低下、滑液包炎、CK増加、筋骨格痛	皮膚筋炎、多発性筋炎

	5%以上	1%以上～5%未満	1%未満	頻度不明
抵抗機構	自己抗体陽性(抗DNA抗体陽性、抗カルジオリピン抗体陽性、抗核抗体陽性)、ウイルス感染(帯状疱疹、単純ヘルペス、インフルエンザ様疾患、インフルエンザ)	膿瘍	免疫グロブリン増加、爪周囲炎、限局性感染、サイトメガロウイルス抗原陽性、食道カンジダ症、蜂巣炎	ニューモシステイシス症、サルモネラ症、サルコイドーシス、非結核性マイコバクテリア感染(非結核性抗酸菌症)、クリプトコッカス症
代謝		高コレステロール血症	糖尿病、高血糖、抗利尿ホルモン不適合分泌、コレステロール減少、トリグリセリド増加	
その他	発熱	悪寒、熱感、倦怠感、疲労、胸痛、疼痛、浮腫(末梢性浮腫、顔面浮腫、全身性浮腫、眼窩周囲浮腫、血管浮腫、咽頭浮腫、喉頭浮腫)	腔感染、勃起不全、乳房肥大、亀頭包皮灸、不規則月経、腔出血、性器分泌物(白帯下)、無力症、不快感、胸部不快感、嚢胞、食欲不振、食欲亢進、過敏症、体重増加、体重減少、子宮平滑筋腫、リビドー減退、末梢腫脹	

14. 適用上の注意

14.1 薬剤調製時の注意

14.1.1 溶解方法

本剤は用時溶解とすること。(溶解後3時間以内に投与開始をすること。)

- (1) ゴム栓をエタノール綿等で清拭した後、21-Gあるいはさらに細い注射針を用いて、1バイアル当たり10mLの日局注射用水(日局生理食塩液も使用可)を静かに注入すること。その際に陰圧状態でないバイアルは使用しないこと。
- (2) バイアルを回転させながら緩やかに溶解し、溶解後は5分間静置すること。抗体蛋白が凝集するおそれがあるため、決して激しく振らず、長時間振り混ぜないこと。
- (3) 溶解後の性状は、無色から淡黄色で、わずかに乳白色から薄黄色又は乳白色をしている。変色、異物、その他の異常を認めたものは使用しないこと。
- (4) 溶解後の残液の再使用や保存は行わないこと。

14.1.2 希釈方法

患者の体重当たりで計算した必要量を成人は約250mL、体重が25kg未満の小児は約50mL、25kg以上の小児は約100mLの日局生理食塩液に希釈すること。体重が100kgを超える患者に投与する場合には、希釈後のインフリキシマブ(遺伝子組換え)[インフリキシマブ後続2]濃度が4mg/mLを超えないよう、日局生理食塩液の量を調整すること。ブドウ糖注射液等を含め日局生理食塩液以外の注射液は用いないこと。日局生理食塩液で希釈する際は、溶解液を緩徐に注入し、混和の際も静かに行うこと。希釈後のインフリキシマブ(遺伝子組換え)[インフリキシマブ後続2]濃度は、0.4～4mg/mLとすること。

14.2 薬剤投与時の注意

14.2.1 投与器具

本剤は無菌・パイロジェンフリーのインラインフィルター(ポアサイズ1.2ミクロン以下)を用いて投与すること。

14.2.2 投与経路及び投与速度

本剤は独立したラインにて投与するものとし、他の注射剤、輸液等と混合しないこと。また、原則、2時間以上をかけて緩徐に点滴静注すること。

なお、6週の投与以後、それまでの投与でinfusion reactionが認められなければ、点滴速度を上げて点滴時間を短縮することができ

る。ただし、平均点滴速度は1時間当たり5mg/kgを投与する速度を超えないこと(臨床試験において投与経験がない)。また、点滴時間を短縮した際にinfusion reactionが認められた場合には、次回以降の投与では、点滴時間を短縮せずに投与すること。[1.3.1、2.3、8.6、8.8、9.1.7、11.1.3 参照]

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

- 15.1.1 本剤の臨床試験は、国内では62週間(1年)まで、海外では102週間(2年)までの期間で実施されている。また、本剤の長期使用に関する特定使用成績調査は2年間までの期間で実施されている。これらの期間を超えた本剤の長期投与時の安全性は確立していない。
- 15.1.2 150例の中程度から重度のうっ血性心不全の患者(左室駆出率35%以下で、NYHA心機能分類Ⅲ/Ⅳ度)に、プラセボ及び本剤5、10mg/kgを初回、2週後、6週後に3回投与した海外での臨床試験を実施した。その結果、本剤投与群、特に10mg/kg群において心不全症状の悪化及び死亡が高率に認められたとの報告がある。初回投与後28週時点において、10mg/kg群で3例、5mg/kg群で1例の死亡が認められ、プラセボ群では死亡例はなかった。また、症状悪化による入院は、10mg/kg群51例中11例、5mg/kg群50例中3例、プラセボ群49例中5例であった。さらに、1年後の評価における死亡例は、10mg/kg群で8例であったのに対し、5mg/kg群及びプラセボ群ではそれぞれ4例であった。[2.5 参照]
- 15.1.3 乾癬患者において、本剤と紫外線療法又は既存の全身治療との併用に対する有効性と安全性は確立していない(使用経験がない)。
- 15.1.4 本剤の臨床試験及び臨床試験終了後3年間又は5年間の追跡調査において、悪性リンパ腫、乳癌、黒色腫、扁平上皮癌、直腸腺癌、基底細胞癌及び皮膚癌等が169例に報告されている。本剤投与と悪性腫瘍発現の関連性を検討するため、実際に悪性腫瘍が認められた例数並びに大規模なデータベースから抽出した同一背景を有する一般集団からの予測例数を表1～3に示した。この予測例数は、症例毎の性、年齢、追跡期間等よりNIH SEERデータベース(National Institute of Health (NIH) Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) database)から推定した値を用いた。表1のクローン病患者での比較では、本剤投与群における悪性腫瘍の予測例数14.49例に対し観察例数は21例であった。一方、プラセボ群においては予測例数0.20例に対し観察例数は1例であった。[1.1、8.7 参照]

表1. クローン病全試験での悪性腫瘍の観察例数及び予測例数

クローン病全試験 ^a	プラセボ投与例		
	全例追跡期間 (人・年)	悪性腫瘍 観察例数	悪性腫瘍 予測例数
a. 悪性リンパ腫	97	0	0.01
b. 非黒色腫性皮膚癌	96	1	NA
c. 上記以外の悪性腫瘍	96	1	0.19
悪性腫瘍計 (a+c) ^b	96	1	0.20
クローン病全試験 ^a	レミケード投与例		
	全例追跡期間 (人・年)	悪性腫瘍 観察例数	悪性腫瘍 予測例数
a. 悪性リンパ腫	4094	2	0.65
b. 非黒色腫性皮膚癌	4085	8	NA
c. 上記以外の悪性腫瘍	4055	19	13.85
悪性腫瘍計 (a+c) ^b	4055	21	14.49

※a: 既に終了したクローン病試験の試験期間中及び3年間の長期安全性追跡調査での発現例数を集計

※b: NIH SEER databaseに含まれていない非黒色腫性皮膚癌については除外

また、関節リウマチ患者での悪性腫瘍の観察例数及び予測例数を表2に示した。本剤投与群では予測例数52.37例に対し観察例数は50例、プラセボ群では、予測例数13.61例に対し観察例数は10例であった。

表2. 関節リウマチ全試験での悪性腫瘍の観察例数及び予測例数

関節リウマチ全試験 ^a	プラセボ投与例		
	全例追跡期間 (人・年)	悪性腫瘍 観察例数	悪性腫瘍 予測例数
a. 悪性リンパ腫	1626	0	0.46
b. 非黒色腫性皮膚癌	1611	6	NA
c. 上記以外の悪性腫瘍	1604	10	13.16
悪性腫瘍計 (a+c) ^b	1604	10	13.61
関節リウマチ全試験 ^a	レミケード投与例		
	全例追跡期間 (人・年)	悪性腫瘍 観察例数	悪性腫瘍 予測例数
a. 悪性リンパ腫	6391	9	1.79
b. 非黒色腫性皮膚癌	6357	24	NA
c. 上記以外の悪性腫瘍	6343	41	50.80
悪性腫瘍計 (a+c) ^b	6331	50	52.37

※a: 既に終了した関節リウマチ試験の試験期間中及び3年間又は5年間の長期安全性追跡調査での発現例数を集計

※b: NIH SEER databaseに含まれていない非黒色腫性皮膚癌については除外

また、全臨床試験における悪性腫瘍の観察例数及び予測例数を表3に示した。本剤投与群の予測例数105.18例に対し観察例数は106例、プラセボ群では予測例数19.46例に対して観察例数が15例であった。

表3. 全試験での悪性腫瘍の観察例数及び予測例数

全試験 ^a	プラセボ投与例		
	全例追跡期間 (人・年)	悪性腫瘍 観察例数	悪性腫瘍 予測例数
a. 悪性リンパ腫	2906	1	0.72
b. 非黒色腫性皮膚癌	2887	12	NA
c. 上記以外の悪性腫瘍	2877	14	18.75
悪性腫瘍計 (a+c) ^b	2877	15	19.46
全試験 ^a	レミケード投与例		
	全例追跡期間 (人・年)	悪性腫瘍 観察例数	悪性腫瘍 予測例数
a. 悪性リンパ腫	17852	14	4.13
b. 非黒色腫性皮膚癌	17721	67	NA
c. 上記以外の悪性腫瘍	17720	92	101.30
悪性腫瘍計 (a+c) ^b	17707	106	105.18

※a: 既に終了した試験の試験期間中及び3年間又は5年間の長期安全性追跡調査での発現例数を集計

※b: NIH SEER databaseに含まれていない非黒色腫性皮膚癌については除外

15.2 非臨床試験に基づく情報

本剤はヒト及びチンパンジーのTNF α のみに結合能を有し、ラットやカンクイザル等の一般的に動物実験に使用される動物種のTNF α と結合しない。このため、がん原性試験は実施されていない。

16. 薬物動態

16.1 血中濃度

(本剤)


16.1.1 健康成人

(1) 国内第I相試験

日本人健康成人男性被験者を対象に、本剤 (n=48) とRemicade[®]又はREMICADE[®] (米国、日本又は韓国で承認されたインフリキシマブ (遺伝子組換え) 製剤) (n=48) を3mg/kgの用量で単回静脈内投与したときの薬物動態の同等性を検証した。0時間から最終測定時点 (投与後8週時点) までの濃度-時間曲線下面積 (AUCt) のRemicade[®]又はREMICADE[®] (米国、日本又は韓国で承認されたインフリキシマブ (遺伝子組換え) 製剤) 群に対する本剤群の差 (幾何平均値の比) の90%信頼区間は、同等性の判定基準である0.80~1.25の範囲内であり、両剤は薬物動態学的に同等であることが示された²⁾。

本剤及びRemicade[®]又はREMICADE[®] (米国、日本又は韓国で承認されたインフリキシマブ (遺伝子組換え) 製剤) を単回静脈内投与したときの薬物動態パラメータ (平均値±標準偏差)

	例数	AUCt (0-8週) ($\mu\text{g} \cdot \text{h/mL}$)	Cmax ($\mu\text{g/mL}$)
本剤	48	14225.5±3085.2	56.1±8.08
Remicade [®] 又はREMICADE [®] (米国、日本又は韓国で承認されたインフリキシマブ (遺伝子組換え) 製剤)	48	14866.9±3160.1	56.9±8.58



本剤及びRemicade[®]又はREMICADE[®] (米国、日本又は韓国で承認されたインフリキシマブ (遺伝子組換え) 製剤) を単回静脈内投与したときの血中薬物濃度推移 (平均値±標準偏差)

(レミケード[®])

16.1.2 クロウン病

(1) 反復投与における薬物動態

国内クローン病患者にインフリキシマブを5mg/kgの用量で3回 (0, 2, 6週) 持続静脈内投与後、10週評価時に効果が認められた患者を対象に14週以降8週間隔で投与した時の薬物動態を検討した。8週間隔投与例の投与前の血中インフリキシマブ濃度 (メジアン) は維持された³⁾。

(2) 増量投与における薬物動態

5mg/kg 8週間隔投与で効果が維持できない患者の5mg/kg投与8週後の血中インフリキシマブ濃度 (メジアン) は0.30 $\mu\text{g/mL}$ であったが、これらの患者に10mg/kgを投与した場合、10mg/kg投与8週後の血中インフリキシマブ濃度 (メジアン) は1.29 $\mu\text{g/mL}$ まで上昇した⁴⁾。

(3) 投与間隔短縮時における薬物動態

5mg/kg 8週間隔投与で効果が維持できない患者19例に5mg/kg 4週間隔投与を行ったときの4週後の血中濃度は、投与間隔短縮前と比較して増加した³⁾。

(4) 単回及び反復投与における薬物動態

5mg/kgの単回投与では最高血中濃度 (Cmax) の中央値は118 $\mu\text{g/mL}$ 、分布容積 (Vd) の中央値は3.0L、消失半減期は9.5日であった。臨床試験において、患者の性、年齢、体重、肝及び腎機能等の背景別の薬物動態的な差は認められなかった。副腎皮質ホルモン剤を使用した患者では、使用しない患者に対してVd値の有意な増加が認められたが、副腎皮質ホルモン剤が電解質バランスに影響するために、体液貯留へ作用した結果と考えられた。5mg/kgの単回投与を受けた20例では2例にインフリキシマブに対する抗体が検出された。瘻孔を形成している疾患の患者にインフリキシマブ5mg/kgを初回、2週後、6週後に反復投与した後の蓄積性はなかった。インフリキシマブのクリアランスは、患者のクレアチニン値あるいはASTと相関は認められず、腎機能・肝機能障害者における動態の差は認められなかった。5mg/kgの反復投与を受けた31例では1例にインフリキシマブに対する抗体が検出された (外国人における成績) ⁵⁾。[8.8 参照]

薬物動態パラメータ		0週C1H	2週Cpre	6週Cpre
投与量	5mg/kg (n=28~30)	メジアン 113-206	168 26.7-46.4	33.7 13.8-33.3
	10mg/kg (n=29~32)	メジアン 274-419	359.5 54.1-93.7	75.1 31.7-69.1


C1H: 投与終了1時間後値, Cpre: 投与前値

($\mu\text{g/mL}$)

16.1.3 関節リウマチ

(1) 反復投与における薬物動態

メトトレキサート併用下 (6mg/週以上) で、インフリキシマブ3、10mg/kgを初回、2週後、6週後に反復投与したときの血中濃度は用量にほぼ比例して増加した (二重盲検比較試験)。また、性、年齢、副腎皮質ホルモン剤あるいは非ステロイド性抗炎症剤併用による背景別の薬物動態の差はみられなかったが、肥満度 (BMI) の増加に伴って血中濃度が増加する傾向がみられた。肝又は腎機能障害を有する患者に薬物動態の差が存在するか否かは不明である。3mg/kgの反復投与を受けた49例では2例、10mg/kgの反復投与を受けた50例では4例に、インフリキシマブに対する抗体が検出された^{6) 7)}。[7.2, 8.8 参照]



↑: レミケード投与
 ○: 3mg/kg (n=49)
 ●: 10mg/kg (n=48~51)

関節リウマチ患者にレミケードをメトトレキサート併用下(6mg/週以上)3回持続静脈内投与した時の血中インフリキシマブ濃度推移(メジアン)

薬物動態パラメータ		0週C1H	2週Cpre	6週Cpre	14週
投与量	3mg/kg (n=49)	平均値±標準偏差 47.9±11.3	11.5±4.1	5.6±4.1	0.8±1.1
	10mg/kg (n=48~51)	平均値±標準偏差 168.3	35.6±15.2	22.3±13.7	5.4±5.8

C1H: 投与終了1時間後値, Cpre: 投与前値

($\mu\text{g/mL}$)

(2) 増量投与における薬物動態

メトトレキサート併用下 (6mg/週以上) で、インフリキシマブ3mg/kgを初回、2週後、6週後に持続静脈内投与し、引き続き3mg/kg、6mg/kgあるいは10mg/kgを8週間隔で反復投与したときの血清中濃度は用量にはば比例して増加した (増量試験)。3mg/kg投与を受けた99例では27例、6mg/kg投与を受けた104例では24例、10mg/kg投与を受けた104例では13例に、インフリキシマブに対する抗体が検出された⁸⁾。[7.2、8.8 参照]

薬物動態パラメータ		0週C1H	14週C1H	22週Cpre	54週	
投与量	3mg/kg (n=86~99)	平均値±標準偏差 メジアン	57.77±14.23 58.14	60.82±13.60 60.35	0.85±0.98 0.50	0.90±1.13 0.44
	6mg/kg (n=91~104)	平均値±標準偏差 メジアン	58.86±11.74 58.52	110.94±23.83 113.41	2.18±2.30 1.81	2.88±2.80 2.28
	10mg/kg (n=95~104)	平均値±標準偏差 メジアン	58.23±11.34 57.16	188.70±39.61 186.12	4.73±4.78 3.13	6.50±6.26 5.47

C1H: 投与終了1時間後値、Cpre: 投与前値 (μg/mL)

(3) 反復投与における薬物動態


欧米第Ⅲ相試験 (ATTRACT試験) において、メトトレキサート併用下 (12.5mg/週以上) で、インフリキシマブ3、10mg/kgを初回、2週後、6週後に持続静脈内投与し、引き続き4週間隔あるいは8週間隔で102週間反復投与した維持治療期にも蓄積性はなく、安定した血清中濃度を長期間にわたり維持することが観察された。3mg/kgの反復投与 (4週間隔) を受けた73例では10例、3mg/kgの反復投与 (8週間隔) を受けた71例では8例、10mg/kgの反復投与 (4週間隔) を受けた74例では1例、10mg/kgの反復投与 (8週間隔) を受けた77例では6例に、インフリキシマブに対する抗体が検出された (外国人における成績) 9)。[7.2、8.8 参照]

注1) インフリキシマブの承認最大用量は1回10mg/kgである。

16.1.4 ベーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎

(1) 反復投与における薬物動態

インフリキシマブ5、10mg/kgを初回、2週後、6週後に投与し、引き続き8週間隔で46週後まで反復投与したときの血清中濃度は投与量の増加に伴って高くなり、安定した血清中濃度を長期間にわたり維持することが観察された¹⁰⁾。本試験では5、10mg/kgの反復投与を受けた8例においてインフリキシマブに対する抗体は検出されなかった¹¹⁾。[8.8 参照]



↑: レミケード投与
○: 5mg/kg (n=3~4) ベーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎患者にレミケードを複数回持続静脈内投与した時の血清中インフリキシマブ濃度推移
●: 10mg/kg (n=3~4)

薬物動態パラメータ		0週C1H	2週Cpre	6週Cpre	30週Cpre	54週	
投与量	5mg/kg (n=3~4)	平均値±標準偏差	114.9±20.3	15.9±9.9	14.3±7.7	6.7±4.5	6.8±4.7
	10mg/kg (n=3~4)	平均値±標準偏差	193.1±17.2	32.5±22.7	26.0±17.6	5.9±6.3	4.8±6.1

C1H: 投与終了1時間後値、Cpre: 投与前値 (μg/mL)

注2) インフリキシマブの承認最大用量は1回5mg/kgである。

16.1.5 乾癬

(1) 反復投与における薬物動態

尋常性乾癬患者と乾癬性関節炎患者にインフリキシマブ5mg/kgを初回、2週後、6週後に投与し、引き続き8週間隔で62週後まで投与したとき、安定した血清中濃度を維持することが観察された (検証的試験及び継続投与試験)。5mg/kgの反復投与を受けた35例中8例に、インフリキシマブに対する抗体が検出された^{12) 13)}。尋常性乾癬患者、乾癬性関節炎患者、膿疱性乾癬患者及び乾癬性紅皮症患者にインフリキシマブ5mg/kgを初回、2週後、6週後に投与し、引き続き8週間隔で46週後まで投与したとき、14週後から54週後までの投与8週後の血清中濃度 (中央値) は0.39 μg/mLから2.27 μg/mLの範囲で推移した (長期投与試験)。5mg/kgの反復投与を受けた64例中19例に、インフリキシマブに対する抗体が検出された¹⁴⁾。[8.8 参照]

薬物動態パラメータ		0週C1H	14週Cpre	30週Cpre	70週	
投与量	5mg/kg (n=27~35)	平均値±標準偏差 メジアン	97.18±19.40 98.33	3.34±2.95 2.45	2.16±2.18 1.48	2.22±2.26 2.09

C1H: 投与終了1時間後値、Cpre: 投与前値 (μg/mL)


(2) 増量投与における薬物動態

5mg/kg 8週間隔投与で効果が維持できない尋常性乾癬、乾癬性関節炎、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症患者の5mg/kg投与8週後の血清中インフリキシマブ濃度 (メジアン) は0.1 μg/mL未満であったが、これら患者に10mg/kgを投与した場合、10mg/kg投与40週後 (8週間隔投与) の血清中インフリキシマブ濃度 (メジアン) は1.10 μg/mLまで上昇した¹⁵⁾。

16.1.6 強直性脊椎炎

(1) 反復投与における薬物動態

インフリキシマブ5mg/kgを初回、2週後、6週後に投与し、引き続き6週間隔で42週後まで投与したとき、安定した血清中濃度を維持することが観察された。5mg/kgの反復投与を受けた33例では2例に、インフリキシマブに対する抗体が検出された¹⁶⁾。[8.8 参照]



強直性脊椎炎患者にレミケード5mg/kgを複数回持続静脈内投与した時の血清中インフリキシマブ濃度推移 (メジアン, n=32~33) ↑: レミケード投与

薬物動態パラメータ		0週C1H	24週Cpre	48週	
投与量	5mg/kg (n=32~33)	平均値±標準偏差 メジアン	91.76±21.10 86.28	7.40±4.33 7.01	6.96±4.48 7.37

C1H: 投与終了1時間後値、Cpre: 投与前値 (μg/mL)

16.1.7 潰瘍性大腸炎

(1) 反復投与における薬物動態

インフリキシマブ5mg/kgを初回、2週後、6週後に投与し、引き続き8週間隔で22週後まで投与したとき、安定した血清中濃度を維持することが観察された。5mg/kgの反復投与を受けた104例では10例にインフリキシマブに対する抗体が検出された¹⁷⁾。[8.8 参照]

(2) 反復投与における薬物動態

ACT1試験において、インフリキシマブ5mg/kgを初回、2週後、6週後に点滴静脈内投与し、引き続き8週間隔で46週後まで投与したとき、安定した血清中濃度を長期間にわたり維持することが観察された。5mg/kgの反復投与を受けた116例では9例にインフリキシマブに対する抗体が検出された (外国人における成績) ¹⁸⁾。[8.8 参照]

16.3 分布

(レミケード®)

ヒトTNFαトランスジェニックマウス及び同系統野生型マウスに、³⁵S標識体インフリキシマブ約10mg/kgを静脈内投与したときの臓器・組織内放射能濃度はいずれも心臓、肺、脾臓に高く、腎臓、肝臓、前肢及び後肢に中程度、消化管では比較的良かった¹⁹⁾。

16.4 代謝

(レミケード®)

ヒトTNFαトランスジェニックマウスに³⁵S標識体インフリキシマブ約10mg/kgを静脈内投与したところ、血清中には主として未変化体が検出され、代謝物は検出されなかった。また、ヒトIgG1と同様に細網内皮系細胞等により体内で分解再吸収されるものと推測される¹⁹⁾。

16.5 排泄

(レミケード®)

ヒトTNFαトランスジェニックマウスに、³⁵S標識体インフリキシマブ約10mg/kgを静脈内投与したところ、投与14日目までの尿及び糞中へは投与放射能のそれぞれ11.5%及び12.2%が排泄され、総排泄率は23.7%であった¹⁹⁾。

16.6 特定の背景を有する患者

(レミケード®)

16.6.1 小児

(1) クロウン病: インフリキシマブを5mg/kgの用量で3回 (0、2、6週) 持続静脈内投与後、10週評価時に効果が認められた患者を対象に14週以降8週間隔で投与した時の薬物動態を検討した。8週間隔投与例の投与前の血清中インフリキシマブ濃度 (メジアン) は維持された。5mg/kgの反復投与を受けた14例においてインフリキシマブに対する抗体は検出されなかった²⁰⁾。[8.8 参照]

(2) クロウン病: インフリキシマブ5mg/kg 8週間隔投与で効果が維持できない患者5例にインフリキシマブ10mg/kgを投与したときの8週後の血清中濃度は、増量前と比較して増加した。10mg/kgの投与を受けた5例においてインフリキシマブに対する抗体は検出されなかった²⁰⁾。[8.8 参照]

(3) 潰瘍性大腸炎: インフリキシマブ5mg/kgを初回、2週後、6週後に投与し、引き続き8週間隔で22週後まで投与したとき、安定した血清中濃度を維持することが観察された。5mg/kgの反復投与を受けた21例ではインフリキシマブに対する抗体は検出されなかった²¹⁾。[8.8 参照]

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

(本剤)

17.1.1 関節リウマチ

(1) 国内第Ⅲ相試験

メトトレキサートに対して効果不十分な日本人関節リウマチ患者を対象に、メトトレキサート併用下で本剤及びRemicade®又はREMICADE® (米国、日本又は韓国で承認されたインフリキシマブ (遺伝子組換え) 製剤) を3mg/kgの用量 (14週以降10mg/kgまで増量可) で反復静脈内投与した。DAS28-ESRの投与開始時から14週までの変化量について、投与開始時のDAS28-ESRを共変量とした共分散分析を用いて、本剤群 (n=123) とRemicade®又はREMICADE® (米国、日本又は韓国で承認されたインフリキシマブ (遺伝子組換え) 製剤) 群 (n=111) の平均値の差を算出した。その結果、投与開始14週時点でのDAS28-ESRのベースラインからの変化量の平均値 (標準偏差) は、本剤群で-2.13 (0.106)、Remicade®又はREMICADE® (米国、日本又は韓国で承認されたインフリキシマブ (遺伝子組換え) 製剤) 群で-2.16 (0.112) であった。両群の平均値の差は0.02、その95%信頼区間は-0.280~0.328であり、事前に規定した同等性の基準を満たしていることから、両剤は同等の有効性を有することが示された²²⁾。30週までの副作用発現頻度は、本剤群で45.2% (57/126例)、Remicade®又はREMICADE® (米国、日本又は韓国で承認されたインフリキシマブ (遺伝子組換え) 製剤) 群で42.2% (49/116例) であった。本剤群の主な副作用は、鼻咽頭炎10.3% (13/126例)、注入に伴う反応8.7% (11/126例) 及びアラニアミノトランスフェラーゼ増加4.0% (5/126例) であった²¹⁾。また、54週までの副作用発現頻度は、本剤群で56.3% (71/126例) であった²³⁾。

(レミケード®)

17.1.2 クロウン病

(1) 国内第Ⅱ相試験 (単回投与)

活動期クローン病患者25例を対象とし、インフリキシマブ1、3、5、10mg/kgを単回投与した。インフリキシマブ5mg/kgを投与した群のうち、IOIBD指標 (投与4週後の値が投与前より2点以上減少もしくは1点以下) では5例中4例、CDAI指標 (投与4週後の値が投与前より70ポイント以上減少) では4例中3例が有効であった²⁴⁾。副作用発現頻度 (臨床検査値異常変動は除く) は、インフリキシマブ5mg/kg投与群で71.4% (5/7例) であった。主な副作用は、眠気42.9% (3/7例) であった²⁵⁾。

(2) 国内第Ⅲ相試験 (維持投与)

インフリキシマブ5mg/kgを初回、2週後、6週後に投与し10週までに改善 (CDAI値が25%以上かつ70ポイント以上の減少) を認めた中等症から重症のクローン病患者57例に6週以降は8週間隔で46週まで投与し、効果が消失した場合はそれ以降4週間隔で50週まで投与した。54週後の改善率は82.5% (47/57例)、寛解率は61.4%であった (4週間隔投与を行った症例も含む)。

副作用発現頻度は、89.1% (57/64例) であった²⁶⁾。

(3) 国内第Ⅲ相試験 (増量投与)

インフリキシマブ5mg/kg 8週間隔投与では効果が維持できないクローン病患者39例を対象とし、インフリキシマブ10mg/kg 8週間隔で32週まで投与した。増量8週時点における10mg/kg投与前からのCDAI値の減少量 (中央値) は95.0 (33例) であった²⁷⁾。

(4) 国内試験 (増量投与含む) (小児)

インフリキシマブ5mg/kgを初回、2週後、6週後に投与し10週までに改善 (PCDAIが15ポイント以上減少、かつ30以下) を認めた中等症から重症の小児のクローン病患者14例に6週以降は8週間隔で46週まで投与し、効果が減弱した場合はそれ以降10mg/kgを8週間隔で46週まで投与した。54週後の改善率は91.7% (11/12例) であった (10mg/kg 8週間隔投与の増量投与を行った症例も含む)。インフリキシマブ5mg/kg 8週間隔で効果が減弱した5例において、インフリキシマブ10mg/kg 8週間隔で投与したとき、増量8週後の寛解率は60.0% (3/5例) であった。

副作用発現頻度は、64.3% (9/14例) であった²⁰⁾。

17.1.3 中等度から重度の活動期にあるクローン病患者

(1) 海外第Ⅱ/Ⅲ相試験 (単回投与)

既存治療で効果不十分な中等度から重度の活動期にあるクローン病患者に、プラセボ及びインフリキシマブ5mg/kgを単回投与した。その結果、有効率 (投与4週後におけるCDAI値が投与前より70ポイント以上減少) はプラセボ群17% (4/24例) に対して、5mg/kg群では81% (22/27例) であり、有意差が認められた²⁸⁾。副作用発現頻度は、インフリキシマブ投与群で44.4% (12/27例) 及びプラセボ群で24.0% (6/25例) であった。主な副作用は、インフリキシマブ投与群でめまい7.4% (2/27例)、疲労感7.4% (2/27例) であった²⁹⁾。

(2) 海外第Ⅲ相試験 (維持投与) (ACCENT I 試験)

インフリキシマブ5mg/kgを単回投与し、2週目に改善 (CDAI値が25%以上かつ70ポイント以上減少) が認められた活動期クローン病患者に、その後2、6週、以降は8週間隔で46週までプラセボ又はインフリキシマブ5mg/kg又は10mg/kgを投与した。その結果、初回投与後に認められた効果が消失するまでの期間はインフリキシマブ維持群で有意に長く (p=0.002)、その期間はプラセボ維持群19週に対して、5mg/kg、10mg/kg維持群ではそれぞれ38週 (p=0.002)、54週以上 (p<0.001) であった³⁰⁾。副作用発現頻度は、インフリキシマブ5mg/kg維持群で65.3% (126/193例)、インフリキシマブ10mg/kg維持群で58.9% (113/192例)、プラセボ維持群で53.2% (100/188例) であった³¹⁾。

17.1.4 外瘻を有するクローン病患者

(1) 海外第Ⅲ相試験 (3回投与)

既存治療で効果不十分な外瘻を有するクローン病患者に、プラセボ及びインフリキシマブ5mg/kgを3回 (初回、2週後、6週後) を投与した。その結果、有効率 (連続した2回の観察時に半数以上の瘻孔が閉鎖) はプラセボ群26% (8/31例) に対して、5mg/kg群では68% (21/31例) であり、有意差が認められた³²⁾。副作用発現頻度は、インフリキシマブ5mg/kg投与群で48.4% (15/31例)、インフリキシマブ10mg/kg投与群で53.1% (17/32例)、プラセボ群で45.2% (14/31例) であった。主な副作用は、5mg/kg群で頭痛16.1% (5/31例)、10mg/kg群で疲労感12.5% (4/32例) であった³³⁾。

(2) 海外第Ⅲ相試験 (維持投与) (ACCENT II 試験)

インフリキシマブ5mg/kgを初回、2週後、6週後に投与し、10週、14週で改善 (半数以上の瘻孔が閉鎖) が認められた外瘻を有するクローン病患者に、その後8週間隔で46週までプラセボ又はインフリキシマブ5mg/kgを投与した。その結果、14週以降の効果消失までの期間 (中央値) はプラセボ維持群14週間に対して、5mg/kg維持群は40週間を超え、5mg/kg維持群ではプラセボ維持群と比較して有意に長く効果を維持できることが示された (p<0.001) ³⁴⁾。副作用発現頻度は、インフリキシマブ5mg/kg維持群で47.1% (65/138例) 及びプラセボ維持群で60.4% (87/144例) であった³⁵⁾。

17.1.5 関節リウマチ

(1) 国内第Ⅱ/Ⅲ相試験

メトトレキサートに効果不十分な関節リウマチ患者を対象とし、メトトレキサート併用下 (6mg/週以上) で、プラセボ及びインフリキシマブ3mg/kgを初回、2週後、6週後に反復投与した (二重盲検比較試験)。その結果、14週後のACR基準20%以上改善率は、プラセボ群23.4% (11/47例) に対して、インフリキシマブ投与群61.2% (30/49例) であり、有意差が認められた (p<0.001) ³⁶⁾。

また、この二重盲検比較試験に参加した患者に対して、二重盲検比較試験の用量に関わらず引き続き3mg/kgを8週間隔で4回投与した。その結果、最終投与8週後のACR基準20%以上改善率は53.3% (24/45例) であり、有効性の維持が認められた³⁷⁾ ³⁸⁾。副作用発現頻度 (随伴症状) は、インフリキシマブ3mg/kg投与群で49.0% (24/49例) 及びプラセボ群で51.1% (24/47例) であった。主な副作用 (随伴症状) は、3mg/kg群で発熱12.2% (6/49例) であった³⁶⁾。

(2) 国内第Ⅲ相試験 (増量試験)

メトトレキサート併用下 (6mg/週以上) でインフリキシマブ3mg/kgを初回、2週後、6週後に投与し、引き続き3mg/kg、6mg/kgあるいは10mg/kgを8週間隔で反復投与した。成績は以下のとおりであった。

- 増量による効果: 54週後のACR-N改善 (平均値±SD) は3mg/kg群 (99例) 51.3±32.1、6mg/kg群 (104例) 53.8±34.4、10mg/kg群 (104例) 58.3±31.3であり、10mg/kg群では3mg/kg群に対して有意差が認められた (p=0.024)。10週後にACR基準20%以上改善を満たさなかった患者の54週後のACR基準20%以上改善率は3mg/kg投与37.5% (9/24例)、6mg/kg投与61.5% (16/26例)、10mg/kg投与61.5% (16/26例) であった。

- 関節破壊の進展防止: 関節破壊進展を手及び足のX線スコア (Sharp Score) で評価した結果、インフリキシマブ投与後の1年間のスコア変化は3mg/kg群0.00、6mg/kg群0.48、10mg/kg群0.00 (いずれも中央値) であった³⁹⁾ ⁴⁰⁾。

副作用発現頻度は、86.1% (179/208例) であった³⁹⁾。

(3) 海外第Ⅲ相試験 (ATTRACT試験)

メトトレキサート製剤に効果不十分な関節リウマチ患者を対象とし、メトトレキサート併用下 (12.5mg/週以上) で、プラセボ及びインフリキシマブ3mg/kgを初回、2週後、6週後に投与し、引き続き8週間隔で54週間反復投与した。成績は下記の通りであった。

- 症状の軽減: 54週後のACR基準20%以上改善率は、プラセボ投与群 (MTX単独群) 17.0% (15/88例) に対し、インフリキシマブ投与群では41.9% (36/86例) であり、有意差が認められた (p<0.001)。

- 関節破壊の進展防止: 投与前から54週までの関節破壊進展を手及び足のX線スコア (Sharp Score) で評価した結果、プラセボ群が4.00 (中央値) 悪化したのに対して、インフリキシマブ投与群は0.50 (中央値) であり、有意に関節破壊の進行が抑制された (p<0.001)。

- 身体機能障害の改善: 投与前から54週までの日常生活動作 (ADL) の改善をHAQスコア (活動制限と介護の必要性等) を評価する指標) で評価した結果、プラセボ群0.1 (中央値) に対してインフリキシマブ投与群0.3 (中央値) で有意差が認められた (p<0.001)。

副作用発現頻度は、インフリキシマブ投与群で62.5% (55/88例) 及びプラセボ群で44.2% (38/86例) であった⁹⁾。

17.1.6 ベーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎

(1) 国内第Ⅲ相試験

ベーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎患者を対象とし、インフリキシマブ5mg/kgを初回、2週後、6週後に反復投与した。その結果、14週間あたりの眼発作回数 (平均値±SD) は、投与前10.17±10.60回から投与後0.66±0.98回となり、有意に減少した (p<0.001)。また、14週間あたりの眼発作回数は、投与前後において12例中11例で減少し、そのうち7例で消失した。

副作用発現頻度は、100% (12/12例) であった。主な副作用は、DNA抗体陽性58.3% (7/12例)、皮膚炎41.7% (5/12例) であった⁴¹⁾。

17.1.7 乾癬

(1) 国内第Ⅲ相試験

尋常性乾癬患者と乾癬性関節炎患者 (局面型皮膚が体表面積の10%以上、かつPASI (Psoriasis Area and Severity Index) スコアが12以上) を対象とし、プラセボ及びインフリキシマブ5mg/kgを初回、2週後、6週後に投与した (検証的試験)。その結果、10週後のPASIスコア75%改善率は、プラセボ群0.0% (0/19例) に対して、インフリキシマブ投与群68.6% (24/35例) であり、有意差が認められた (p<0.001) ¹²⁾。

尋常性乾癬患者 (局面型皮膚が体表面積の10%以上、かつPASIスコアが12以上)、乾癬性関節炎患者 (腫脹関節数及び疼痛関節数が5以上、かつCRPが1.5mg/dL以上又は朝のこわばりが45分以上)、膿疱性乾癬患者及び乾癬性紅皮症患者を対象とし、インフリキシマブ5mg/kgを初回、2週後、6週後に投与し、引き続き8週間隔で46週後まで投与した (長期投与試験)。その結果、最終評価において、尋常性乾癬患者のPASIスコア75%改善率は54.1% (20/37例)、乾癬性関節炎患者のACR基準20%改善率は83.3% (10/12例)、膿疱性乾癬患者と乾癬性紅皮症患者の全般改善度が「消失又は改善」の割合はそれぞれ57.1% (4/7例)、87.5% (7/8例) であった¹⁴⁾。

副作用発現頻度は、インフリキシマブ投与群で85.7% (30/35例) 及びプラセボ群で36.8% (7/19例) であった。主な副作用は、インフリキシマブ投与群でDNA抗体陽性68.6% (24/35例) であった¹²⁾。

(2) 国内第Ⅲ相試験 (増量投与)

インフリキシマブ5mg/kg 8週間隔投与では効果が維持できない乾癬患者51例 (尋常性乾癬患者31例、乾癬性関節炎患者8例、膿疱性乾癬患者7例、乾癬性紅皮症患者5例) を対象とし、インフリキシマブ10mg/kg 8週間隔で32週まで投与した。PASIスコアはインフリキシマブ5mg/kg投与前のスコアを基準値とした。増量24週時点におけるPASIスコア75%改善率は尋常性乾癬患者では40.7% (11/27例)、乾癬性関節炎患者では42.9% (3/7例)、膿疱性乾癬患者では33.3% (2/6例)、乾癬性紅皮症患者では40.0% (2/5例) であった。

副作用発現頻度は、74.5% (38/51例) であった⁴²⁾。

(3) 海外第Ⅲ相試験 (IMPACT2試験)

乾癬性関節炎患者 (腫脹関節数及び疼痛関節数が5以上、かつCRPが1.5mg/dL以上又は朝のこわばりが45分以上) を対象とし、プラセボ及びインフリキシマブ5mg/kgを初回、2週後、6週後に投与し、引き続き8週間隔で46週後まで投与した。その結果、14週後のACR基準20%改善率はプラセボ群11.0% (11/100例) に対して、インフリキシマブ投与群58.0% (58/100例) であり、有意差が認められた (p<0.001)。関節破壊進展を手及び足のX線スコア (Modified Sharp Score) で評価した結果、24週後のスコア変化 (平均値±標準偏差) はプラセボ群0.82±2.62に対して、インフリキシマブ投与群-0.70±2.53であり、有意差が認められた (p<0.001) ⁴³⁾ ⁴⁴⁾。

副作用発現頻度は、インフリキシマブ投与群で48.2% (92/191例) 及びプラセボ群で26.5% (26/98例) であった (22週まではプラセボ、24週以降はインフリキシマブを投与した症例を含む)。主な副作用は、インフリキシマブ投与群で上気道感染11.0% (21/191例) であった⁴⁵⁾。

17.1.8 強直性脊椎炎

(1) 国内第Ⅲ相試験

既存治療で効果不十分な強直性脊椎炎患者を対象とし、インフリキシマブ5mg/kgを初回、2週後、6週後に投与し、引き続き6週間隔で投与した (非盲検下)。その結果、24週後、48週後のASAS (Assessment in Ankylosing Spondylitis) 基準20%以上改善率はそれぞれ97.0% (32/33例)、96.9% (31/32例) であった。

副作用発現頻度は、87.9% (29/33例) であった。主な副作用は、DNA抗体陽性48.5% (16/33例) であった¹⁶⁾。

(2) 海外第Ⅲ相試験 (ASSERT試験)

既存治療で効果不十分な強直性脊椎炎患者を対象とし、プラセボ及びインフリキシマブ5mg/kgを初回、2週後、6週後に投与し、引き続き6週間隔で投与した。その結果、24週後のASAS基準20%以上改善率はプラセボ群19.2% (15/78例) に対し、インフリキシマブ投与群では61.2% (123/201例) であり、有意差が認められた (p<0.001) ⁴⁶⁾ ⁴⁷⁾。

副作用発現頻度は、インフリキシマブ投与群で64.9% (131/202例) 及びプラセボ群で48.0% (36/75例) であった。主な副作用は、インフリキシマブ投与群で頭痛7.9% (16/202例) であった⁴⁸⁾。

17.1.9 潰瘍性大腸炎

(1) 国内第Ⅲ相試験

既存治療（ステロイド、アザチオプリン等）で効果不十分な潰瘍性大腸炎患者208例を対象とし、プラセボ及びインフリキシマブ5mg/kgを初回、2週後、6週後に投与し、引き続き8週間隔で2週後まで投与し、30週後まで有効性を評価した。その結果、主要有効性評価項目である8週後のMayoスコア改善率は、プラセボ群35.6% (37/104例) に対し、インフリキシマブ投与群54.8% (57/104例) であり、インフリキシマブは有意に高い改善率を示した (p=0.005)。

副作用発現頻度は、インフリキシマブ投与群で73.1% (76/104例) 及びプラセボ群で59.6% (62/104例) であった。主な副作用は、インフリキシマブ投与群でDNA抗体陽性51.9% (54/104例) であった49)。

(2) 海外第Ⅲ相試験 (ACT1試験)

既存治療（ステロイド、アザチオプリン等）で効果不十分な潰瘍性大腸炎患者242例に対し、プラセボ及びインフリキシマブ5mg/kgを初回、2週後、6週後に投与し、引き続き8週間隔で4週まで投与し、54週後まで有効性を評価した。その結果、主要有効性評価項目である8週後のMayoスコア改善率は、プラセボ群37.2% (45/121例) に対し、インフリキシマブ投与群69.4% (84/121例) であり、インフリキシマブは有意に高い改善率を示した (p<0.001) 50)。

副作用発現頻度は、インフリキシマブ投与群で48.8% (59/121例) 及びプラセボ群で42.1% (51/121例) であった。主な副作用は、インフリキシマブ投与群で頭痛9.9% (12/121例) であった51)。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

インフリキシマブはクローン病や関節リウマチの病態形成に密接に関与しているTNF α の作用を阻害する。その機序は可溶性TNF α の生物活性を中和するとともに、膜結合型TNF α 発現細胞をCDC (補体依存性細胞傷害) あるいはADCC (抗体依存性細胞傷害) により傷害すること、ならびに受容体に結合したTNF α を解離させることによりTNF α の作用を阻害すると考えられている。

(本剤)

18.2 可溶性TNF α 及び膜結合型TNF α 結合作用

本剤は、可溶性TNF α 及び膜結合型TNF α に対して、Remicade®又はREMICADE® (米国、日本又は韓国で承認されたインフリキシマブ (遺伝子組換え) 製剤) と同程度の結合活性を示した52) (*in vitro*)。

18.3 抗体依存性細胞傷害 (ADCC) 活性及び補体依存性細胞傷害 (CDC) 活性

本剤は、ヒトIgG1のFc領域を有することから、抗体依存性細胞傷害 (ADCC) 及び補体依存性細胞傷害 (CDC) により膜結合型TNF α を発現するTNF α 産生細胞を傷害し、そのADCC活性及びCDC活性はRemicade®又はREMICADE® (米国、日本又は韓国で承認されたインフリキシマブ (遺伝子組換え) 製剤) と同程度であった52) (*in vitro*)。

18.4 膜結合型TNF α 発現細胞に対するアポトーシス誘導活性

本剤の膜結合型TNF α 発現細胞に対するアポトーシス誘導活性は、Remicade®又はREMICADE® (米国、日本又は韓国で承認されたインフリキシマブ (遺伝子組換え) 製剤) と同程度であった52) (*in vitro*)。

18.5 TNF α 生物活性に対する中和作用

本剤は、Remicade®又はREMICADE® (米国、日本又は韓国で承認されたインフリキシマブ (遺伝子組換え) 製剤) と同程度のヒトTNF α トランスジェニックマウスに対する疾患進行抑制作用が認められた53)。

(レミケード®)

18.6 IL-6産生抑制作用

TNF α 刺激による線維芽細胞からのIL-6産生を抑制した54) (*in vitro*)。

18.7 膜結合型TNF α 発現細胞に対する傷害作用

ヒトIgG1のFc領域を有することから、CDC及びADCCにより膜結合型TNF α を発現するTNF α 産生細胞を傷害した55) (*in vitro*)。

18.8 受容体結合TNF α 解離作用

TNF α 受容体に結合したTNF α とも結合し、TNF α を受容体から解離させ、接着分子 (ICAM-1、VCAM-1) の発現を抑制した56) (*in vitro*)。

18.9 TNF α 生物活性に対する中和作用

ヒトTNF α トランスジェニックマウスの死亡率軽減作用が認められた55)。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般名：インフリキシマブ (遺伝子組換え) [インフリキシマブ後続2] Infliximab (Genetical Recombination) [Infliximab Biosimilar 2]

本質：インフリキシマブ (遺伝子組換え) [インフリキシマブ後続2] は、遺伝子組換えキメラモノクローナル抗体であり、マウス抗ヒト腫瘍壊死因子 α モノクローナル抗体の変異部及びヒトIgG1定常部からなる。インフリキシマブ (遺伝子組換え) [インフリキシマブ後続2] は、チャイニーズハムスター卵巣細胞により産生される。インフリキシマブ (遺伝子組換え) [インフリキシマブ後続2] は、450個のアミノ酸残基からなるH鎖 (γ 1鎖) 2本及び214個のアミノ酸残基からなるL鎖 (κ 鎖) 2本で構成される糖タンパク質 (分子量：約149,000) である。

21. 承認条件

医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。

22. 包装

100mg×1バイアル

23. 主要文献

- Westhovens,R. et al. : Arthritis Rheum. 2006 ; 54 (4) : 1075-1086
- あゆみ製薬 (株) 社内資料：国内臨床薬物動態試験
- Hibi T, Inflamm Bowel Dis 2012 ; 18 : 1480-7
- Suzuki Y, Inflamm Bowel Dis 2015 ; 21 : 2114-22
- レミケード点滴静注用100 申請資料概要：欧米人における成績 (2002年1月17日承認、へ.Ⅲ.2)
- レミケード点滴静注用100 申請資料概要：MTX効果不十分例を対象としたMTX併用下での第Ⅱ/Ⅲ相試験 (2003年7月17日承認、へ.Ⅲ.1. (1) .1) . (b))
- レミケード点滴静注用100 申請資料概要：MTX効果不十分例を対象としたMTX併用下での第Ⅱ/Ⅲ相試験 (2003年7月17日承認、ト.I.2. (2) .1))


- レミケード点滴静注用100 審査報告書：国内第Ⅲ相増量試験 (2009年7月7日承認、Ⅱ.2. (i) . (1))
- レミケード点滴静注用100 申請資料概要：ATTRACT試験 (試験番号：C0168T22) (2009年7月7日承認、2.7.6.2)
- レミケード点滴静注用100 審査報告書：長期投与試験 (2007年1月26日承認、Ⅱ.3. (i) . (2))
- レミケード点滴静注用100 申請資料概要：TA-650の網膜ぶどう膜炎を有するベーチェット病を対象とした長期投与試験 (2007年1月26日承認、2.7.6. (2))
- レミケード点滴静注用100 申請資料概要：検証的試験 (2010年1月20日承認、2.7.6.1)
- レミケード点滴静注用100 申請資料概要：継続投与試験 (2010年1月20日承認、2.7.6.8)
- レミケード点滴静注用100 申請資料概要：長期投与試験 (2010年1月20日承認、2.7.6.2)
- Torii H, J Dermatol. 2017 ; 44 (5) : 552-559
- レミケード点滴静注用100 申請資料概要：国内試験 (2010年4月16日承認、2.7.6.1)
- レミケード点滴静注用100 審査報告書：国内第Ⅲ相試験 (2010年6月7日承認、Ⅱ.4. (ii) . (2))
- レミケード点滴静注用100 審査報告書：海外第Ⅲ相試験 (ACT1) (2010年6月7日承認、Ⅱ.4. (ii) . (3))
- レミケード点滴静注用100 申請資料概要：動物における成績 (2002年1月17日承認、へ.Ⅱ)
- Tajiri H, PLoS One. 2018 ; 13 (8) : e0201956
- Tajiri H, BMC Pediatr. 2019 ; 19 (1) : 351
- Matsuno, H. et al. : Mod Rheumatol. 2019 ; 29 (6) : 919-927
- あゆみ製薬 (株) 社内資料：国内第Ⅲ相臨床試験
- Asakura, H. et al. : J Gastroenterol Hepatol. 2001 ; 16 (7) : 763-769
- レミケード点滴静注用100 申請資料概要：クローン病に対する臨床試験 (2002年1月17日承認、ト.Ⅱ.1)
- レミケード点滴静注用100 審査報告書：国内維持療法試験 (2007年10月25日承認、Ⅱ.3.1) . (4))
- レミケード点滴静注用100 審査報告書：国内増量試験 (2011年8月17日承認、Ⅱ.4. (iii) . (1))
- Targan, S.R. et al. : N Engl J Med. 1997 ; 337 (15) : 1029-1035
- レミケード点滴静注用100 申請資料概要：第Ⅱ/Ⅲ相二重盲検比較試験 [クローン病] (2002年1月17日承認、ト.Ⅰ.2. (1) .3))
- Hanauer, S.B. et al. : Lancet. 2002 ; 359 : 1541-1549
- レミケード点滴静注用100 審査報告書：海外第Ⅲ相試験 (ACCENT I) (2007年10月25日承認、Ⅱ.3.1) . (1))
- Present, D.H. et al. : N Engl J Med. 1999 ; 340 (18) : 1398-1405
- レミケード点滴静注用100 申請資料概要：排膿を示す外瘻を有するクローン病患者に対する試験 (2002年1月17日承認、ト.Ⅰ.2. (2))
- Sands, B.E. et al. : N Engl J Med. 2004 ; 350 (9) : 876-885
- レミケード点滴静注用100 審査報告書：海外第Ⅲ相試験 (ACCENT II) (2007年10月25日承認、Ⅱ.3.1) . (2))
- レミケード点滴静注用100 申請資料概要：第Ⅱ/Ⅲ相試験 (2003年7月17日承認、ト.Ⅰ.2. (2))
- レミケード点滴静注用100 申請資料概要：第Ⅱ/Ⅲ相試験 (2003年7月17日承認、ト.Ⅰ.2. (3))
- レミケード点滴静注用100 審査報告書：慢性関節リウマチを対象とした長期試験 (2003年7月17日承認、2.ト. (4) .4))
- レミケード点滴静注用100 申請資料概要：TA-650の関節リウマチを対象とした増量試験 (2009年7月7日承認、2.7.6.1)
- Takeuchi, T. et al. : Mod. Rheumatol. 2009 ; 19 (5) : 478-487
- レミケード点滴静注用100 申請資料概要：TA-650のベーチェット病における網膜ぶどう膜炎を対象とした臨床試験 (第Ⅲ相試験) (2007年1月26日承認、2.7.6. (3))
- レミケード点滴静注用100 審査報告書：国内試験 (2016年5月13日承認、7.1)
- Antoni, C. et al. : Ann Rheum Dis. 2005 ; 64 (8) : 1150-1157
- van der Heijde, D. et al. : Arthritis Rheum. 2007 ; 56 (8) : 2698-2707
- レミケード点滴静注用100 審査報告書：IMPACT2試験 (2010年1月20日承認、Ⅱ.3. (ii) . (2) .5))
- レミケード点滴静注用100 審査報告書：国内第Ⅲ相試験 (2010年4月16日承認、Ⅱ.3. (ii) . (1) .1))
- van der Heijde, D. et al. : Arthritis Rheum. 2005 ; 52 (2) : 582-591
- レミケード点滴静注用100 申請資料概要：ASSERT試験 (2010年4月16日承認、2.7.6.2)
- レミケード点滴静注用100 審査報告書：国内第Ⅲ相試験 (2010年6月7日承認、Ⅱ.4. (iii) . (1) .1))
- Rutgeerts, P. et al. : N Engl J Med. 2005 ; 353 (23) : 2462-2476
- レミケード点滴静注用100 審査報告書：海外第Ⅲ相試験 (ACT1試験) (2010年6月7日承認、Ⅱ.4. (iii) . (1) .2))
- あゆみ製薬 (株) 社内資料：in vitro薬効薬理試験
- あゆみ製薬 (株) 社内資料：in vivo薬効薬理試験
- Siegel, S.A. et al. : Cytokine. 1995 ; 7 (1) : 15-25
- Scallon, B.J. et al. : Cytokine. 1995 ; 7 (3) : 251-259
- レミケード点滴静注用100 申請資料概要：TNF α : TNF α 受容体複合体に対する解離作用に基づくヒト臍帯静脈内皮細胞 (HUVEC) における接着分子発現抑制作用 (2002年1月17日承認、ホ.Ⅰ.5. (4))

24. 文献請求先及び問い合わせ先

あゆみ製薬株式会社
〒104-0061 東京都中央区銀座四丁目12番15号
TEL : 0120-137-413
<受付時間>9 : 00-17 : 30 (土・日・祝日・当社休日を除く)

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

 あゆみ製薬株式会社
東京都中央区銀座四丁目12番15号