

貯法：室温保存
有効期間：3年

前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤
タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠

処方箋医薬品^(注)

タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」
TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE OD Tablets [SAWAI]

	OD錠0.1mg	OD錠0.2mg
承認番号	22300AMX00452000	22300AMX00453000
販売開始	2009年5月	2009年5月

注)注意 - 医師等の処方箋により使用すること

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)



2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

3. 組成・性状

3.1 組成

品名	タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg「サワイ」	タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「サワイ」
有効成分 [1錠中]	日局タムスロシン塩酸塩	
	0.1mg	0.2mg
添加剤	アクリル酸エチル・メタクリル酸メチルコポリマー、エチルセルロース、結晶セルロース、ステアリン酸Ca、セタノール、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、没食子酸プロピル、ポリオキシエチレンニルフェニルエーテル、ポリソルベート80、D-マンニトール、メタクリル酸コポリマーLD、メタケイ酸アルミン酸Mg、ラウリル硫酸Na	

3.2 製剤の性状

品名	タムスロシン塩酸塩OD錠 0.1mg「サワイ」	タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「サワイ」
外形		
剤形	素錠(徐放性粒を含む口腔内崩壊錠)	
性状	白色	
直径(mm)	7.5	8.5
厚さ(mm)	3.2	4.2
重量(mg)	約140	約240
本体表示	タムスロシン OD 0.1 サワイ	タムスロシン OD 0.2 サワイ

4. 効能又は効果

前立腺肥大症に伴う排尿障害

5. 効能又は効果に関連する注意

- 5.1 本剤による治療は原因療法ではなく、対症療法であることに留意し、本剤投与により期待する効果が得られない場合は、手術療法等、他の適切な処置を考慮すること。
- 5.2 前立腺肥大症の診断・診療については、国内外のガイドライン等の最新の情報を参考にすること。

6. 用法及び用量

通常、成人にはタムスロシン塩酸塩として0.2mgを1日1回食後に経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

7. 用法及び用量に関連する注意

高齢者で腎機能が低下している場合は0.1mgから投与を開始し、経過を十分に観察した後に0.2mgに増量すること。0.2mgで期待する効果が得られない場合にはそれ以上の増量は行わず、他の適切な処置を行うこと。[9.8参照]

8. 重要な基本的注意

- 8.1 本剤の過剰投与により血圧低下が予想されるので、投与量には注意すること。
- 8.2 立位血圧が低下することがあるので、体位変換による血圧変化に注意すること。[9.1.1参照]
- 8.3 めまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う作業に従事する場合には注意させること。

8.4 本剤投与開始時に降圧剤投与の有無について問診を行い、降圧剤が投与されている場合には血圧変化に注意し、血圧低下がみられたときには、減量又は中止するなど適切な処置を行うこと。[10.2参照]

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 起立性低血圧のある患者

症状が悪化するおそれがある。[8.2参照]

9.2 腎機能障害患者

9.2.1 重篤な腎機能障害のある患者

血漿中濃度が上昇するおそれがある。[16.6.1参照]

9.3 肝機能障害患者

9.3.1 重篤な肝機能障害のある患者

血漿中濃度が上昇するおそれがある。

9.8 高齢者

腎機能が低下していることがある。[7.、16.6.1参照]

10. 相互作用

10.2 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
降圧剤 [8.4参照]	起立性低血圧が起こるおそれがあるので、減量するなど注意すること。	降圧剤服用中の患者は起立時の血圧調節力が低下している場合がある。
ホスホジエステラーゼ5阻害作用を有する薬剤 シルデナフィルクエン酸塩 バルデナフィル塩酸塩水和物 等	併用により症候性低血圧があらわれるとの報告がある。	本剤はα遮断作用を有するこれらの血管拡張作用による降圧作用を増強するおそれがある。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 失神・意識喪失(頻度不明)

血圧低下に伴う一過性の意識喪失等があらわれることがある。

11.1.2 肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)

AST上昇、ALT上昇、黄疸等があらわれることがある。

11.2 その他の副作用

	0.1~5%未満	頻度不明
精神神経系	めまい、ふらふら感	立ちくらみ、頭痛、眠気、いらいら感、しびれ感
循環器	頻脈	血圧低下、起立性低血圧、動悸、不整脈
過敏症	発疹	そう痒感、蕁麻疹、多形紅斑、血管浮腫
消化器	胃不快感、嘔気、嘔吐、胃重感、胃痛、食欲不振、嚥下障害	口渇、便秘、下痢
** その他	咽頭灼焼感、全身倦怠感	鼻閉、浮腫、尿失禁、味覚異常、女性化乳房、持続勃起症、射精障害、術中虹彩緊張低下症候群、霧視、視力障害、ほてり、熱感、灼熱感、胸部不快感

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

14.1.1 PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

14.1.2 本剤は噛み砕かずに服用させること。本剤はタムスロシン塩酸塩の徐放性粒を含有しており、噛み砕いた際に徐放性粒が壊れ、薬物動態が変わる可能性がある。

14.1.3 本剤は舌の上のせて唾液を浸潤させると崩壊するため、水なしで服用可能である。また、水で服用することもできる。

14.1.4 本剤は寝たままの状態では、水なしで服用させないこと。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

α_1 遮断薬を服用中又は過去に服用経験のある患者において、 α_1 遮断作用によると考えられる術中虹彩緊張低下症候群 (Intraoperative Floppy Iris Syndrome) があらわれるとの報告がある。

16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 単回投与

健康成人にタムスロシン塩酸塩カプセルを0.1~0.6mg⁽²⁾経口投与したとき、血漿中未変化体濃度は投与後7~8時間にピークを示し、半減期は9.0~11.6時間であった⁽¹⁾。Cmax及びAUCは投与量にほぼ比例して上昇した。タムスロシン塩酸塩カプセルを7日間連続経口投与したとき、半減期はやや延長したが、血漿中未変化体濃度推移は4日目で定常状態に達した⁽²⁾。

タムスロシン塩酸塩カプセルの臨床用量での値

用量 ⁽²⁾ (mg)	Tmax (h)	Cmax (ng/mL)	t _{1/2} (h)
0.1	7.0	3.2	11.6
0.2	8.0	5.7	9.0
0.4	7.0	15.6	10.8
0.6	7.5	15.6	9.8

16.1.2 生物学的同等性試験

健康成人29名にハルナルD錠0.2mgあるいはハルナル0.2mgカプセルをそれぞれクロスオーバー法で単回経口投与した場合、タムスロシン塩酸塩の血漿中未変化体の薬物動態パラメータは以下のとおりである⁽³⁾。ハルナルD錠とハルナルカプセルは生物学的に同等であった⁽³⁻⁵⁾。

製剤	投与量	Cmax (ng/mL)	AUCt (ng·h/mL)	Tmax (h)
ハルナルD錠0.2mg	0.2mg	4.34±1.32	63.5±22.9	7.00±2.04
ハルナル0.2mgカプセル	0.2mg	4.71±1.81	62.0±20.8	7.83±2.42

(Mean±S. D.)

16.1.3 生物学的同等性試験



<タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」>

タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」とハルナルD錠0.2mgを健康成人男子にそれぞれ1錠(タムスロシン塩酸塩として0.2mg)空腹時及び食後単回経口投与(クロスオーバー法)し、血漿中タムスロシン濃度を測定した。得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された⁽⁶⁾。

タムスロシン塩酸塩として0.2mg投与時の薬物動態パラメータ

水なし	空腹時 (n=24)	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T _{1/2} (hr)	AUC _{0-36hr} (ng·hr/mL)
			7.08±2.17	4.1±1.0	8.3±1.6	71.24±26.58
水あり	食後 (n=28)	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	6.73±1.51	4.0±0.8	8.6±1.5	67.09±21.19
			6.53±2.01	5.2±1.1	8.5±1.6	73.50±30.22
水あり	空腹時 (n=24)	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	5.71±1.87	6.3±1.6	8.6±2.1	71.22±25.85
			6.73±2.23	4.4±0.9	8.8±1.6	67.61±25.53
	食後 (n=23)	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	6.79±1.70	4.6±1.2	8.1±1.2	71.52±26.07
			4.61±1.83	4.7±1.5	10.4±2.7	57.31±30.93
水あり	食後 (n=23)	ハルナルD錠0.2mg	4.66±2.21	5.8±1.0	10.6±3.5	56.85±29.84

(Mean±S. D.)



血漿中濃度ならびにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

16.5 排泄

健康成人にタムスロシン塩酸塩カプセルを0.1~0.6mg⁽²⁾経口投与したとき、投与後30時間までの未変化体の尿中排泄率は12~14%とほぼ一定であった⁽¹⁾。また、連続経口投与したときも尿中排泄率に大きな変動は認められなかった⁽²⁾。

16.6 特定の背景を有する患者

16.6.1 腎機能障害患者

腎機能障害患者11名にタムスロシン塩酸塩カプセル0.2mgを経口投与したとき、タムスロシン塩酸塩の血漿中薬物濃度の上昇がみられた。この血漿中薬物濃度の上昇は、血漿中 α_1 -AGP (α_1 酸性糖蛋白)との蛋白結合による可能性があり、血漿中薬物濃度と α_1 -AGP濃度の間には高い相関が認められた。[9.2.1、9.8参照]

なお、タムスロシン塩酸塩の薬効あるいは副作用発現に直接関与すると考えられる非結合型薬物濃度は、血漿中 α_1 -AGP濃度にかかわらず腎機能正常者のそれとほぼ同様であった⁽⁷⁾。

16.8 その他

<タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」>

タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」は溶出挙動に基づき、タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」と生物学的に同等とみなされた⁽⁸⁾。

注)本剤の承認された1日用量は、0.2mgである。なお、年齢、症状により適宜増減する。

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

17.1.1 国内第Ⅱ及びⅢ相試験

前立腺部の尿道内圧を有意に減少させ⁽⁹⁾、用量依存的な尿流率及び残尿量の改善が認められた^{(10)、(11)}。全般改善度の解析対象236例の成績を次に示した。また、二重盲検比較試験の結果、タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg1日1回投与において有用性が認められた⁽¹⁰⁻¹²⁾。

投与方法	中等度改善以上
0.1mg1日1回投与	28.3%(15/53)
0.2mg1日1回投与	34.1%(43/126)
0.4mg1日1回投与	38.6%(22/57)

注)本剤の承認された1日用量は、0.2mgである。なお、年齢、症状により適宜増減する。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

尿道及び前立腺部の α_1 受容体を遮断することにより、尿道内圧曲線の前立腺部圧を低下させ、前立腺肥大症に伴う排尿障害を改善する。

18.2 ヒトでの作用

ヒト前立腺標本での受容体結合実験において、プラゾシン塩酸塩より2.2倍、フェントラミンメシル酸塩より40倍強い α_1 受容体遮断作用を示した⁽¹³⁾ (*in vitro*試験)。

18.3 動物での作用

18.3.1 交感神経 α 受容体遮断作用

ラット脳膜標本での受容体結合実験及びウサギ大動脈標本での摘出実験において、 α_1 受容体を選択的かつ競合的に遮断し、その作用はプラゾシン塩酸塩及びフェントラミンメシル酸塩より強力であった^{(14)、(15)}。なお、ウサギ大動脈、ラット輸精管及びモルモット腸管標本での摘出

実験において、本薬は α_2 受容体よりも α_1 受容体に対して高い選択性を示した¹⁴⁾、¹⁵⁾ (*in vitro*試験)。

18.3.2 下部尿路(尿道・膀胱)及び前立腺に対する作用

ウサギ尿道、前立腺及び膀胱基部平滑筋標本での摘出実験において、プラゾシン塩酸塩より23~98倍、フェントラミンメシル酸塩より87~320倍強い α_1 受容体遮断作用を示した¹⁶⁾~¹⁸⁾ (*in vitro*試験)。

また、麻酔イヌにおいて、 α_1 受容体刺激薬による尿道内圧上昇を拡張期血圧上昇よりも13倍強く抑制した¹⁹⁾。

18.3.3 排尿障害改善作用

麻酔雄性イヌにおいて、尿道内圧曲線の前立腺部圧を低下させた²⁰⁾。一方、麻酔ラットにおいて、律動的膀胱収縮及び膀胱内圧曲線に影響を及ぼさなかった²¹⁾。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般名：タムスロシン塩酸塩(Tamsulosin Hydrochloride)


化学名：5-[(2*R*)-2-[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethylamino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide monohydrochloride

分子式：C₂₀H₂₈N₂O₅S · HCl

分子量：444.97

融点：約230℃(分解)

構造式：



性状：白色の結晶である。ギ酸に溶けやすく、水にやや溶けにくく、酢酸(100)に溶けにくく、エタノール(99.5)に極めて溶けにくい。

20. 取扱い上の注意

開封後は湿気を避けて保存すること。

22. 包装

〈タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サイ」〉

PTP[乾燥剤入り]：140錠(14錠×10)

〈タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サイ」〉

PTP[乾燥剤入り]：140錠(14錠×10)、700錠(14錠×50)

バラ[乾燥剤入り]：300錠

23. 主要文献

- 1) 角尾道夫他：臨床医薬, 1990; 6(12): 2529-2551
- 2) 角尾道夫他：臨床医薬, 1991; 7(1): 63-83
- 3) 横山修他：薬理と治療, 2005; 33(6): 521-526
- 4) 横山修他：薬理と治療, 2005; 33(6): 535-540
- 5) 横山修他：薬理と治療, 2005; 33(6): 527-533
- 6) 陶易王他：医学と薬学, 2009; 61(3): 367-375
- 7) Koiso, K. et al.: J. Clin. Pharmacol., 1996; 36(11): 1029-1038
- 8) 社内資料：生物学的同等性試験(OD錠0.1mg)
- 9) Kawachi, Y.: Curr. Ther. Res., 1998; 59(3): 149-161
- 10) 河邊香月他：泌尿器外科, 1990; 3(10): 1247-1259
- 11) Kawabe, K. et al.: J. Urol., 1990; 144(4): 908-912
- 12) 河邊香月他：泌尿器外科, 1991; 4(2): 231-242
- 13) Yamada, S. et al.: J. Pharmacol. Exp. Ther., 1987; 242(1): 326-330
- 14) Honda, K. et al.: Naunyn-Schmiedeberg's Arch. Pharmacol., 1985; 328(3): 264-272
- 15) Honda, K. et al.: Naunyn-Schmiedeberg's Arch. Pharmacol., 1987; 336(3): 295-302
- 16) Honda, K. et al.: J. Pharmacol. Exp. Ther., 1986; 239(2): 512-516
- 17) Honda, K. et al.: Naunyn-Schmiedeberg's Arch. Pharmacol., 1985; 330(1): 16-21
- 18) 宮田桂司：日薬理誌, 2005; 126: 341-345
- 19) Shibasaki, M. et al.: J. Auton. Pharmacol., 1992; 12(4): 263-268
- 20) Sudoh, K. et al.: J. Auton. Pharmacol., 1996; 16(3): 147-154
- 21) Sudoh, K. et al.: Gen. Pharmacol., 1997; 28(4): 521-524

* 24. 文献請求先及び問い合わせ先

沢井製薬株式会社 医薬品情報センター
〒532-0003 大阪市淀川区宮原5丁目2-30
TEL: 0120-381-999 FAX: 06-7708-8966

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

沢井製薬株式会社
大阪市淀川区宮原5丁目2-30