

【**禁忌**】(次の部位には使用しないこと)
損傷皮膚及び粘膜[損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。]

【**組成・性状**】

組成: 100mL中 日局 イソプロパノール 18.0g
メタノール変性アルコール 54.2mL
添加物: 青色1号、青色2号

性状: 微かに青色を帯びた澄明の液で特異なおいがある。
比重 d_{20}^{20} : 0.870~0.880

【**効能・効果**】 手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒。

【**用法・用量**】 そのまま塗擦、清浄用として用いる。

【**使用上の注意**】

1. **重要な基本的注意**

- (1) 本剤が眼に入らないように注意すること。眼に入った場合には直ちによく水洗すること。
- (2) 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
[イソプロパノール及びエタノール蒸気に大量に又は繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。]



販売名:
消毒用昭和アルコール

調剤用<調剤包装単位用コード>
GTIN: 04950498801268



流通用<販売包装単位用コード>
共通商品コード 4950498032211

GS1-RSS



TRADE MARK

日本標準商品分類番号: 872015 外用殺菌消毒剤
承認番号 (販薬)第7888号 薬価基準収載

消毒用 昭和アルコール 500mL

昭和製薬株式会社
大阪府守口市南寺方東通1-4-12

2. **副作用** 本剤は、使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類\頻度	頻度不明
過敏症 ^(注)	発疹等
皮膚 ^(注)	刺激症状

注)このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

3. **臨床検査結果に及ぼす影響** 注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテストの判断を妨害することがある。

4. **使用上の注意**

投与経路: 外用にのみ使用すること。

使用時:

- (1) 同一部位(皮膚面)に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- (2) 本剤は血清、膿汁等の蛋白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。
- (3) 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル等には変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。
- (4) 本剤は引火性、爆発性があるため、火気(電気メス使用等も含む)には十分注意すること。

貯法: 火気を避けて保存



注意: **飲用不可**

火気厳禁

第4類アルコール類
危険等級II 水溶性