

貯法：室温保存
有効期間：3年

| | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|
| | 2.5mg | 5mg | 10mg |
| 承認番号 | 22100AMX02195000 | 22100AMX02196000 | 22500AMX01595000 |
| 販売開始 | 2009年11月 | 2009年11月 | 2013年12月 |

高血圧症・狭心症治療薬
持続性Ca拮抗薬
日本薬局方 アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠

アムロジピンOD錠2.5mg「フソー」
アムロジピンOD錠5mg「フソー」
アムロジピンOD錠10mg「フソー」

劇薬、処方箋医薬品^注

注）注意—医師等の処方箋により使用すること

Amlodipine OD Tablets "FUSO"

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）




ジヒドロピリジン系化合物に対し過敏症の既往歴のある患者

3. 組成・性状

3.1 組成

| 販売名 | アムロジピンOD錠2.5mg「フソー」 | アムロジピンOD錠5mg「フソー」 | アムロジピンOD錠10mg「フソー」 |
|------|---|---|--|
| 有効成分 | 1錠中 日局 アムロジピンベシル酸塩 3.47mg (アムロジピンとして2.5mg) | 1錠中 日局 アムロジピンベシル酸塩 6.93mg (アムロジピンとして5mg) | 1錠中 日局 アムロジピンベシル酸塩 13.87mg (アムロジピンとして10mg) |
| 添加剤 | D-マンニトール、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、無水リン酸水素カルシウム、タルク、酸化チタン、アルファー化デンプン、クロスポビドン、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、ステアリン酸マグネシウム、香料、1-メントール、その他4成分 | D-マンニトール、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、無水リン酸水素カルシウム、タルク、酸化チタン、アルファー化デンプン、クロスポビドン、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、タウマチン、ステアリン酸マグネシウム、香料、1-メントール、その他4成分 | D-マンニトール、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、無水リン酸水素カルシウム、タルク、酸化チタン、クロスポビドン、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、タウマチン、ステアリン酸マグネシウム、香料、1-メントール、その他4成分 |

3.2 製剤の性状

| 販売名 | アムロジピンOD錠2.5mg「フソー」 | アムロジピンOD錠5mg「フソー」 | アムロジピンOD錠10mg「フソー」 |
|-------|---|---|---|
| 色・剤形 | 白色～微黄白色の素錠 | 白色～微黄白色の片面割線入りの素錠 | |
| 外形 | 表面 裏面 側面  | 表面 裏面 側面  | 表面 裏面 側面  |
| 規格 | 直径 厚さ 重量 6.0mm 3.0mm 90mg | 直径 厚さ 重量 8.0mm 3.6mm 180mg | 直径 厚さ 重量 10mm 4.5mm 360mg |
| 識別コード | FS2 | FS5 | FS10 |

4. 効能又は効果

- 高血圧症
○狭心症

5. 効能又は効果に関連する注意

本剤は効果発現が緩徐であるため、緊急な治療を要する不安定狭心症には効果が期待できない。

6. 用法及び用量

〈OD錠2.5mg、OD錠5mg〉

高血圧症

通常、成人にはアムロジピンとして2.5～5mgを1日1回経口投与する。なお、症状に応じ適宜増減するが、効果不十分な場合には1日1回10mgまで増量することができる。

通常、6歳以上の小児には、アムロジピンとして2.5mgを1日1回経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

狭心症

通常、成人にはアムロジピンとして5mgを1日1回経口投与する。なお、症状に応じ適宜増減する。

〈OD錠10mg〉

高血圧症

通常、成人にはアムロジピンとして2.5～5mgを1日1回経口投与する。なお、症状に応じ適宜増減するが、効果不十分な場合には1日1回10mgまで増量することができる。

狭心症

通常、成人にはアムロジピンとして5mgを1日1回経口投与する。なお、症状に応じ適宜増減する。

7. 用法及び用量に関連する注意

〈OD錠2.5mg、OD錠5mg〉

6歳以上の小児への投与に際しては、1日5mgを超えないこと。

8. 重要な基本的注意

8.1 降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。

8.2 本剤は血中濃度半減期が長く投与中止後も緩徐な降圧効果が認められるので、本剤投与中止後に他の降圧剤を使用するときは、用量並びに投与間隔に留意するなど慎重に投与すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 過度に血圧の低い患者

さらに血圧が低下するおそれがある。

*9.1.2 心不全のある患者

非虚血性心筋症による重度心不全患者^注を対象とした海外臨床試験において、プラセボ群と比較して本剤投与群で肺水腫の発現頻度が高かったとの報告がある¹⁾。

注）本剤の承認された効能又は効果は「高血圧症」及び「狭心症」である。

9.2 腎機能障害患者

9.2.1 重篤な腎機能障害のある患者

降圧に伴い腎機能が低下することがある。

9.3 肝機能障害患者

増量時には慎重に投与すること。高用量（10mg）において副作用の発現頻度が高くなる可能性がある。本剤は主として肝臓で代謝されるため、血中濃度半減期の延長及び血中濃度-時間曲線下面積（AUC）が増大することがある。[11.2、16.6.1 参照]

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性に投与する場合には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。動物実験で妊娠末期に投与すると妊娠期間及び分娩時間が延長することが認められている²⁾。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。ヒト母乳中へ移行することが報告されている³⁾。

9.7 小児等

低出生体重児、新生児、乳児又は6歳未満の幼児を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

低用量（2.5mg/日）から投与を開始するなど慎重に投与すること。一般に過度の降圧は好ましくないとされている。体内動態試験で血中濃度が高く、血中濃度半減期が長くなる傾向が認められている⁴⁾。[16.6.2 参照]

10. 相互作用

本剤の代謝には主として薬物代謝酵素CYP3A4が関与していると考えられている。

10.2 併用注意（併用に注意すること）

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
|---|--|--|
| 降圧作用を有する薬剤 | 降圧作用が増強されるおそれがある。 | 相互に作用を増強するおそれがある。 |
| CYP3A4阻害剤 エリスロマイシン ジルチアゼム リトナビル イトラコナゾール等 | エリスロマイシン及びジルチアゼムとの併用により、本剤の血中濃度が上昇したとの報告がある。 | 本剤の代謝が競合的に阻害される可能性が考えられる。 |
| CYP3A4誘導剤 リファンピシン等 | 本剤の血中濃度が低下するおそれがある。 | 本剤の代謝が促進される可能性が考えられる。 |
| グレープフルーツジュース | 本剤の降圧作用が増強されるおそれがある。 | グレープフルーツに含まれる成分が本剤の代謝を阻害し、本剤の血中濃度が上昇する可能性が考えられる。 |
| シンバスタチン | シンバスタチン80mg（国内未承認の高用量）との併用により、シンバスタチンのAUCが77%上昇したとの報告がある。 | 機序は不明である。 |
| タクロリムス | 併用によりタクロリムスの血中濃度が上昇し、腎障害等のタクロリムスの副作用が発現するおそれがある。併用時にはタクロリムスの血中濃度をモニターし、必要に応じてタクロリムスの用量を調整すること。 | 本剤とタクロリムスは、主としてCYP3A4により代謝されるため、併用によりタクロリムスの代謝が阻害される可能性が考えられる。 |

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 劇症肝炎（頻度不明）、肝機能障害、黄疸（0.1%未満）

AST、ALT、 γ -GTPの上昇等を伴う肝機能障害があらわれることがある。

11.1.2 無顆粒球症（頻度不明）、白血球減少（0.1%未満）、血小板減少（頻度不明）

11.1.3 房室ブロック（0.1%未満）

徐脈、めまい等の初期症状があらわれることがある。

11.1.4 横紋筋融解症（頻度不明）

筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇等があらわれた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、横紋筋融解症による急性腎障害の発症に注意すること。

11.2 その他の副作用

| | 0.1～1%未満 ^{注2)} | 0.1%未満 ^{注2)} | 頻度不明 |
|--------|--|------------------------------------|----------------|
| 肝臓 | ALT、ASTの上昇、肝機能障害、ALP、LDHの上昇 | γ -GTP上昇、黄疸 | 腹水 |
| 循環器 | 浮腫 ^{注1)} 、ほてり（熱感、顔面潮紅等）、動悸、血圧低下 | 胸痛、期外収縮、洞房又は房室ブロック、洞房停止、心房細動、失神、頻脈 | 徐脈 |
| 精神・神経系 | めまい・ふらつき、頭痛・頭重 | 眠気、振戦、末梢神経障害 | 気分動揺、不眠、錐体外路症状 |

| | 0.1～1%未満 ^{注2)} | 0.1%未満 ^{注2)} | 頻度不明 |
|--------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 消化器 | 心窩部痛、便秘、嘔気・嘔吐 | 口渇、消化不良、下痢・軟便、排便回数増加、口内炎、腹部膨満、胃腸炎 | 膣炎 |
| 筋・骨格系 | | 筋緊張亢進、筋痙攣、背痛 | 関節痛、筋肉痛 |
| 泌尿・生殖器 | BUN上昇 | クレアチニン上昇、頻尿・夜間頻尿、尿管結石、尿潜血陽性、尿中蛋白陽性 | 勃起障害、排尿障害 |
| 代謝異常 | | 血清コレステロール上昇、CK上昇、高血糖、糖尿病、尿中ブドウ糖陽性 | |
| 血液 | | 赤血球、ヘモグロビン、白血球の減少、白血球増加、紫斑 | 血小板減少 |
| 過敏症 | 発疹 | そう痒、じん麻疹、光線過敏症 | 多形紅斑、血管炎、血管浮腫 |
| 口腔 | | （連用により）歯肉肥厚 | |
| その他 | 全身倦怠感 | しびれ、脱力感、耳鳴、鼻出血、味覚異常、疲労、咳、発熱、視力異常、呼吸困難、異常感覚、多汗、血中カリウム減少 | 女性化乳房、脱毛、鼻炎、体重増加、体重減少、疼痛、皮膚変色 |

注1) 増量して10mgを投与した場合に、高い頻度で認められた。[9.3、17.1.1 参照]

注2) 発現頻度は使用成績調査を含む。

13. 過量投与

*13.1 症状

過度の末梢血管拡張により、ショックを含む著しい血圧低下と反射性頻脈を起こすことがある。

また、非心原性肺水腫が、本剤の過量投与の24～48時間後に発現することがある。なお、循環動態、心拍出量維持を目的とした救急措置（輸液の過負荷等）が要因となる可能性もある。

13.2 処置

特異的な解毒薬はない。本剤は蛋白結合率が高いため、透析による除去は有効ではない。

また、本剤服用直後に活性炭を投与した場合、本剤のAUCは99%減少し、服用2時間後では49%減少したことから、本剤過量投与時の吸収抑制処置として活性炭投与が有効であると報告されている⁵⁾。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤調製時の注意

分割後は早めに使用すること。分割後やむを得ず保存する場合には、湿気、光を避けて保存すること。

14.2 薬剤交付時の注意

14.2.1 PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

14.2.2 本剤をPTPシートから取り出して保存する場合は、湿気、光を避けて保存するよう指導すること。

14.2.3 本剤は舌の上のせて唾液を浸潤させると崩壊するため、水なしで服用可能である。また、水で服用することもできる。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

因果関係は明らかでないが、本剤による治療中に心筋梗塞や不整脈（心室性頻拍を含む）がみられたとの報告がある。

16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 生物学的同等性試験


〈アムロジピンOD錠2.5mg「フソー」〉

アムロジピンOD錠2.5mg「フソー」とノルバスク錠2.5mgを、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠（アムロジピンとして2.5mg）健康成人男子に絶食後、水あり及び水なし単回経口投与して血漿中アムロジピン濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、C_{max}）について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log（0.80）～log（1.25）の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された⁶⁾。

水あり服用

| | n | 判定パラメータ | | 参考パラメータ | |
|-------------------------|----|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | AUC ₀₋₇₂ (ng·h/mL) | C _{max} (ng/mL) | T _{max} (h) | T _{1/2} (h) |
| アムロジピンOD錠 2.5mg「フソー」 | 16 | 51.8±12.3 | 1.47± 0.38 | 7.1±1.1 | 33.6±6.7 |
| ノルバスク錠2.5mg | 16 | 52.8±15.9 | 1.48± 0.44 | 7.6±1.5 | 32.6±5.5 |


Mean ± S. D.



水なし服用（ノルバスク錠2.5mgは水で服用）

| | n | 判定パラメータ | | 参考パラメータ | |
|-------------------------|----|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | AUC ₀₋₇₂ (ng·h/mL) | C _{max} (ng/mL) | T _{max} (h) | T _{1/2} (h) |
| アムロジピンOD錠 2.5mg「フソー」 | 16 | 67.8±9.2 | 1.88± 0.31 | 6.9±1.1 | 34.7±4.5 |
| ノルバスク錠2.5mg | 16 | 61.4±10.5 | 1.74± 0.32 | 6.7±0.8 | 37.5±5.4 |

Mean ± S. D.



血漿中濃度並びにAUC、C_{max}等のパラメータは、被験者の選択、
体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。


〈アムロジピンOD錠5mg「フソー」〉

アムロジピンOD錠5mg「フソー」とノルバスク錠5mgを、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠（アムロジピンとして5mg）健康成人男子に絶食後、水あり及び水なし単回経口投与して血漿中アムロジピン濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、C_{max}）について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log（0.80）～log（1.25）の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された⁶⁾。

水あり服用

| | n | 判定パラメータ | | 参考パラメータ | |
|-----------------------|----|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | AUC ₀₋₇₂ (ng·h/mL) | C _{max} (ng/mL) | T _{max} (h) | T _{1/2} (h) |
| アムロジピンOD錠 5mg「フソー」 | 16 | 119.3±27.8 | 3.56± 0.75 | 6.9±1.1 | 34.7±6.5 |
| ノルバスク錠5mg | 16 | 114.0±24.5 | 3.47± 0.65 | 6.6±0.7 | 35.3±6.3 |


Mean ± S. D.



水なし服用（ノルバスク錠5mgは水で服用）

| | n | 判定パラメータ | | 参考パラメータ | |
|-----------------------|----|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | AUC ₀₋₇₂ (ng·h/mL) | C _{max} (ng/mL) | T _{max} (h) | T _{1/2} (h) |
| アムロジピンOD錠 5mg「フソー」 | 16 | 121.3±28.0 | 3.30± 0.67 | 7.8±1.5 | 36.6± 11.7 |
| ノルバスク錠5mg | 16 | 116.4±28.1 | 3.36± 0.77 | 7.3±0.9 | 34.0±6.5 |

Mean ± S. D.




血漿中濃度並びにAUC、C_{max}等のパラメータは、被験者の選択、
体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

16.6 特定の背景を有する患者

16.6.1 肝機能障害患者

成人肝硬変患者（Child分類A、B）5例にアムロジピンとして2.5mgを単回投与した場合の血中濃度推移並びに薬物動態パラメータは図及び表の通りである。健康成人に比し、投与72時間後の血中濃度が有意に上昇し、T_{1/2}、AUCはやや高値を示した⁷⁾。[9.3 参照]



| | T _{max} (h) | C _{max} (ng/mL) | AUC _{0-∞} (ng·h/mL) | T _{1/2} (h) |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 肝機能障害患者 ⁷⁾ | 7.2±1.2 | 1.9±0.2 | 104.0±15.5 | 43.0±8.0 |
| 健康成人 ⁸⁾ | 7.3±0.4 | 1.64±0.07 | 68.1±5.4 | 33.3±2.2 |

有意差検定：n.s.

Mean ± S. E.

16.6.2 高齢者

老年高血圧症患者6例（男2、女4、平均年齢79.7歳）にアムロジピンとして5mgを単回、及び8日間反復投与した場合の薬物動態パラメータは表の通りである。単回投与した場合、若年健康成

人（男6、平均年齢22.3歳）に比し、C_{max}、AUCは有意に高値を示したが、T_{1/2}に有意差は認められなかった。反復投与時には老年者の血清中アムロジピン濃度は若年者よりも高く推移したが、そのパターンは若年者に類似しており、老年者でその蓄積が増大する傾向は認められなかった⁴⁾。[9.8 参照]

| | 老年高血圧症患者 | | 若年健康成人 | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| | 単回投与時 | 反復投与時 | 単回投与時 | 反復投与時 |
| C _{max} (ng/mL) | 4.24±0.08 ^{b)} | 14.9±2.2 ^{a)} | 2.63±0.35 | 7.51±0.32 |
| T _{max} (h) | 7.2±0.49 | 8.0±1.8 | 6.7±0.42 | 8.0±0.7 |
| T _{1/2} (h) | 37.5±6.0 | 47.4±11.3 | 27.7±4.6 | 34.7±2.7 |
| AUC (ng·h/mL) | 116.9±8.4 ^{b)} | — | 63.2±5.5 | — |

Mean±S.E.、AUC：0～48時間値

a) p<0.05、b) p<0.01 (vs健康者)

16.8 その他

アムロジピンOD錠10mg「フソー」は「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン（平成12年2月14日、医薬審第64号及び平成18年11月24日、薬食審査発第1124004号）」に基づき、アムロジピンOD錠5mg「フソー」を標準製剤としたとき、溶出挙動が等しく、生物学的に同等とみなされた⁶⁾。

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

〈高血圧症〉

17.1.1 国内第Ⅲ相試験

アムロジピンとして5mgを1日1回8週間投与後に、収縮期血圧が140mmHg以上を示す患者305例を二群に分けて、アムロジピンとして10mg又は5mgを1日1回8週間投与したときの収縮期血圧のベースラインからの変化量の平均値は、10mg群で13.7mmHgの低下、5mg群で7.0mmHgの低下であり、両群間に統計的に有意な差がみられた。

臨床検査値異常を含む副作用の発現率は、5mg群では3.9%（6/154例）に、10mg群では9.9%（15/151例）に認められた。高用量（10mg）投与時に浮腫が高い頻度で認められ、10mg群で3.3%であった⁹⁾。[11.2 参照]

さらに、継続試験として実施した長期投与試験でアムロジピンとして10mgを1日1回通算して52週間投与した際、収縮期血圧のベースラインからの変化量の平均値は、15.6mmHgの低下を示した¹⁰⁾。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序


細胞膜の膜電位依存性カルシウムチャンネルに特異的に結合し、細胞内へのCa²⁺の流入を減少させることにより、冠血管や末梢血管の平滑筋を弛緩させる。

カルシウム拮抗作用の発現は緩徐であり、持続的である。また、心抑制作用は弱く、血管選択性が認められている^{11,12)}。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般名：アムロジピンベシル酸塩（Amlodipine Besilate）

構造式：



分子式：C₂₀H₂₅ClN₂O₅ · C₆H₆O₃S

分子量：567.05

化学名：3-Ethyl 5-methyl(4*RS*)-2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate monobenzenesulfonate

融点：約198℃（分解）

性状：白色～帯黄白色の結晶性の粉末である。

メタノールに溶けやすく、エタノール（99.5）にやや溶けにくく、水に溶けにくい。

メタノール溶液（1→100）は旋光性を示さない。

20. 取扱い上の注意

アルミピロー開封後は湿気を避けて保存すること。

22. 包装

〈アムロジピンOD錠2.5mg「フソー」〉

100錠 [10錠 (PTP) ×10]、700錠 [14錠 (PTP) ×50]

〈アムロジピンOD錠5mg「フソー」〉

100錠 [10錠 (PTP) ×10]、700錠 [14錠 (PTP) ×50]

〈アムロジピンOD錠10mg「フソー」〉

100錠 [10錠 (PTP) ×10]

23. 主要文献

- 1) Packer M, et al. : JACC. Heart Fail. 2013 ; 1 (4) : 308-314
- 2) 堀本 政夫他 : 応用薬理. 1991 ; 42 (2) : 167-176
- 3) Naito T, et al. : J. Hum. Lact. 2015 ; 31 (2) : 301-306
- 4) 桑島 巖他 : Geriatric. Medicine. 1991 ; 29 (6) : 899-902
- 5) Laine K, et al. : Br. J. Clin. Pharmacol. 1997 ; 43 (1) : 29-33
- 6) 社内資料：生物学的同等性試験
- 7) 足立 幸彦他 : 薬理と治療. 1991 ; 19 (7) : 2923-2932
- 8) 中島 光好他 : 臨床医薬. 1991 ; 7 (7) : 1407-1435
- 9) Fujiwara T, et al. : J Hum Hypertens. 2009 ; 23 (8) : 521-529
- 10) アムロジピン5mgで効果不十分な患者に対するアムロジピン10mgの長期投与時の安全性及び有効性（ノルバスク錠/OD錠2.5/5mg、アムロジピン錠/OD錠2.5/5mg：2009年2月23日承認、審査報告書）
- 11) 山中 教造他 : 日本薬理学雑誌. 1991 ; 97 (3) : 167-178
- 12) 第十八改正日本薬局方解説書. 2021 : C-306-C311

24. 文献請求先及び問い合わせ先

シオノケミカル株式会社 学術情報本部

〒104-0028 東京都中央区八重洲2丁目10番10号

TEL 03-5202-0213

FAX 03-5202-0230

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

SHIONO シオノケミカル株式会社

東京都中央区八重洲2丁目10番10号

26.2 販売元

扶桑薬品工業株式会社

大阪市城東区森之宮二丁目3番11号