

** 2024年 8月改訂 (第2版)
* 2023年12月改訂 (第1版)

日本標準商品分類番号

872149

貯 法：室温保存
有効期間：3年

持続性Ca拮抗剤
処方箋医薬品[※]

	8mg	16mg
承認番号	22500AMX00299000	22500AMX00300000
販売開始	2013年6月	2013年6月

日本薬局方 **アゼルニジピン錠**
アゼルニジピン錠8mg「ケミファ」
アゼルニジピン錠16mg「ケミファ」
Azelnidipine Tablets 8mg・16mg “Chemiphar”

(注)注意-医師等の処方箋により使用すること

2. 禁忌 (次の患者には投与しないこと)







- 2.1 妊婦又は妊娠している可能性のある女性 [9.5参照]
2.2 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2.3 イトラコナゾール、ミコナゾール (経口剤、注射剤)、フルコナゾール、ホスフルコナゾール、ポリコナゾール、ボサコナゾール、HIVプロテアーゼ阻害剤 (リトナビル含有製剤、アタザナビル硫酸塩、ホスアンブレナビルカルシウム水和物、ダルナビル含有製剤)、コピシスタット含有製剤、抗ウイルス剤 (ニルマトレルビル・リトナビル)、エンシトレルビル フマル酸を投与中の患者 [10.1、16.7.1参照]

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	アゼルニジピン錠 8mg「ケミファ」	アゼルニジピン錠 16mg「ケミファ」
有効成分 (1錠中)	(日局)アゼルニジピン 8.0mg	(日局)アゼルニジピン 16.0mg
添加剤	結晶セルロース、カルメロースカルシウム、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、メグルミン、ポリソルベート80、軽質無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム	

3.2 製剤の性状

販売名	アゼルニジピン錠 8mg「ケミファ」	アゼルニジピン錠 16mg「ケミファ」	
性状	淡黄白色の割線入りの素錠		
外形	表		
	裏		
	側面		
直径	7.1mm	9.1mm	
厚さ	3.3mm	4.1mm	
重量	140.0mg	280.0mg	
識別コード	NC A8	NCP A16	

**4. 効能又は効果
高血圧症**

6. 用法及び用量

通常、成人にはアゼルニジピンとして8~16mgを1日1回朝食後経口投与する。なお、1回8mgあるいは更に低用量から投与を開始し、症状により適宜増減するが、1日最大16mgまでとする。

8. 重要な基本的注意

- 8.1 カルシウム拮抗剤の投与を急に中止したとき、症状が悪化した症例が報告されているので、本剤の休薬を要する場合は徐々に減量すること。また、患者に医師の指示なしに服薬を中止しないように注意すること。
8.2 まれに過度の血圧低下を起こすおそれがあるので、そのような場合には減量又は休薬するなど適切な処置を行うこと。
8.3 降圧作用に基づくめまい等があらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.2 腎機能障害患者

9.2.1 重篤な腎機能障害のある患者

降圧に伴い腎機能が低下する可能性がある。

9.3 肝機能障害患者

9.3.1 重篤な肝機能障害のある患者

重篤な肝機能障害のある患者を対象とした臨床試験は実施していない。

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。動物実験 (ラット) で妊娠前~初期の投与において着床前及び着床後胚死亡率の増加、出生児の体重低下、妊娠期間及び分娩時間の延長が認められている。妊娠末期の投与において妊娠期間及び分娩時間の延長が認められている。 [2.1参照]

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。動物実験 (ラット) で乳汁中へ移行することが報告されている。

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

8mgあるいは更に低用量から投与を開始し、慎重に投与すること。一般に過度の降圧は好ましくないとされている。脳梗塞等が起こるおそれがある。

10. 相互作用

本剤は、主としてチトクロームP450 3A4 (CYP3A4) で代謝される。 [16.4参照]

10.1 併用禁忌 (併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
** 以下のアゾール系抗真菌剤 イトラコナゾール (イトリゾール)、ミコナゾール (フロリド) (経口剤、注射剤)、フルコナゾール (ジフルカン)、ホスフルコナゾール (プロジフ)、ポリコナゾール (ブイフェンド)、ボサコナゾール (ノクサフィル) [2.3、16.7.1参照]	アゼルニジピン8mgとイトラコナゾール50mg ^(註) との併用により本剤のAUCが2.8倍に上昇することが報告されている。	これらの薬剤がCYP3A4を阻害し、本剤のクリアランスが低下すると考えられる。
** HIVプロテアーゼ阻害剤 リトナビル含有製剤 (ノービア、カレトラ)、アタザナビル硫酸塩 (レイアタツ)、ホスアンブレナビルカルシウム水和物 (レクシヴァ)、ダルナビル含有製剤 (プリジスタ、プレジコビックス) コピシスタット含有製剤 スタリビルド、ゲンボイヤ、プレジコビックス 抗ウイルス剤 ニルマトレルビル・リトナビル (パキロビッド) [2.3参照]	本剤の作用が増強されるおそれがある。	

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
* * エンシトレルビル マル酸 (ゾコーバ) [2.3参照]	本剤の作用が増強され るおそれがある。	これらの薬剤がCYP3A4 を阻害し、本剤のクリア ランスが低下すると考え られる。

注) 低用量のイトラコナゾールとの併用試験結果に基づく。イトラコ
ゾールの用量は、イトラコナゾールの電子添文を参照すること。

10.2 併用注意 (併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
他の降圧剤	過度の降圧が起こる おそれがある。必要 があれば他の降圧剤 あるいは本剤を減量 すること。	作用メカニズムの異なる 降圧剤の併用により薬理 作用が増強される。
ジゴキシシン	ジゴキシシンのCmax が1.5倍、AUCが1.3 倍に上昇することが 報告されている。必要 があればジゴキシ シンを減量すること。	ジゴキシシンの腎排泄 (尿 細管分泌) 及び腎外から の排泄を阻害するためと 考えられる。
* * アゾール系抗真菌剤 (併用禁忌の薬剤を除 く) ホスラプロナゾール 等	本剤の作用が増強され るおそれがある。必要 があれば本剤を減量又 は中止、あるいはこれ らの薬剤の投与を中止 すること。	これらの薬剤がCYP3A4 を阻害し、本剤のクリア ランスが低下すると考え られる。
シメチジン イマチニブメシル酸塩 マクロライド系抗生物質 エリスロマイシン、 クラリスロマイシン 等	本剤の作用が増強され るおそれがある。必要 があれば本剤を減量あ るいはこれらの薬剤の 投与を中止すること。	これらの薬剤がCYP3A4 を阻害し、本剤のクリア ランスが低下すると考え られる。
シンバスタチン [16.7.2参照]	シンバスタチンの AUCが2.0倍に上昇す ることが報告されてい る。必要があれば本剤 又はシンバスタチンの 投与を中止すること。	これらの薬剤がCYP3A4 を競合的に阻害すること により、相互のクリアラ ンスが低下すると考えら れる。 腎機能障害のある患者は 特に注意すること。
シクロスポリン	本剤又はこれらの薬 剤の作用が増強され るおそれがある。必要 があれば本剤又は これらの薬剤を減量 すること。	これらの薬剤がCYP3A4 を競合的に阻害すること により、相互のクリアラ ンスが低下すると考えら れる。
ベンゾジアゼピン系薬剤 ジアゼパム、 ミダゾラム、 トリアゾラム等 経口黄体・卵胞ホルモン 経口避妊薬等	本剤又はこれらの薬 剤の作用が増強され るおそれがある。必要 があれば本剤又は これらの薬剤を減量 すること。	これらの薬剤がCYP3A4 を競合的に阻害すること により、相互のクリアラ ンスが低下すると考えら れる。
タンドスピロンクエン 酸塩	本剤の作用が増強され るおそれがある。必要 があれば本剤を減量あ るいはタンドスピロ ンクエン酸塩の投与を中 止すること。	セロトニン受容体を介し た中枢性の血圧降下 作用が増強作用を増強 する。
リファンピシン フェニトイン フェノバルビタール	本剤の作用が減弱さ れるおそれがある。	これらの薬剤の代謝酵 素誘導作用により、本 剤のクリアランスが上 昇すると考えられる。
グレープフルーツジュ ース [16.7.3参照]	本剤の血中濃度が上 昇することが報告され ている。降圧作用が増 強されるおそれがある ことから、本剤の服用 中はグレープフルーツ ジュースを飲用しない よう注意すること。	グレープフルーツジュ ースに含まれる成分が CYP3A4による本剤の代 謝を阻害し、クリアラ ンスを低下させるためと 考えられる。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行
い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な
処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 肝機能障害 (頻度不明)、黄疸 (頻度不明)

AST、ALT、 γ -GTPの上昇等を伴う肝機能障害があ
らわれることがある。

11.1.2 房室ブロック (頻度不明)、洞停止 (頻度不明)、徐脈 (頻 度不明)

めまい、ふらつき等の症状があらわれることがある。

11.2 その他の副作用

	1~3%未満	1%未満	頻度不明
過敏症		そう痒、発疹	血管浮腫、光線過敏性 反応
精神 神経系	頭痛・頭重感	立ちくらみ、ふらつ き、めまい	眠気
消化器		便秘	胃部不快感、悪心、腹 痛、下痢、歯肉肥厚、 口内炎

	1~3%未満	1%未満	頻度不明
循環器		動悸、顔面潮紅、ほ てり	
血液		好酸球増多	
肝臓	ALT上昇、AST 上昇、LDH上昇	ALP上昇、総ビリル ビン上昇	γ -GTP上昇、肝機能 異常
泌尿器		BUN上昇、尿硝子 柱増加	クレアチニン上昇、頻尿
その他	尿酸上昇	総コレステロール上 昇、CK上昇、カリウム上 昇、カリウム低下	倦怠感、異常感 (浮遊 感、気分不良等)、浮腫、 しびれ、乳び腹水 ^(注)

注) 低アルブミン血症の患者で起こりやすい。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよ
う指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部
が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等
の重篤な合併症を併発することがある。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

15.1.1 因果関係は明らかではないが、本剤による治療中に心筋
梗塞、心不全や不整脈 (心房細動等) がみられたとの報
告がある。

15.1.2 CAPD (持続的外来腹膜透析) 施行中の患者の透析排
液が白濁することが報告されているので、腹膜炎等と
の鑑別に留意すること。

16. 薬物動態

16.1 血中濃度

16.1.1 反復投与

健康な成人男性6例にアゼルニジピン錠8mgを1日1回7
日間連続経口投与したところ、最高血漿中濃度に到達
する時間は2~3時間であり、半減期は19~23時間であ
った。投与後24時間の血漿中濃度は、投与2日目からほぼ
一定の値を示し、速やかに定常状態に達した¹⁾。

アゼルニジピン錠8mgを1日1回7日間連続経口投与 (食後投与)
した場合の血漿中未変化体濃度

投与量	投与日数	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} α (hr)	t _{1/2} β (hr)	AUC ₀₋₂₄ (ng・hr/mL)
8mg	1日目	11.8±1.4	3.2±0.3	1.3±0.2	23.1±8.1	59.7±6.9
	7日目	14.7±1.6	2.2±0.3	1.0±0.1	19.2±2.2	81.6±13.4

n=6, mean±SE

16.1.2 単回投与

軽症・中等症本態性高血圧症患者6例にアゼルニジピン
錠8mgを朝食後単回経口投与したところ、最高血漿中
濃度に到達する時間は3.7時間、Cmaxは9.4ng/mL、
半減期 (一相性) は6.1時間、AUC₀₋₂₄は66.5ng・hr/
mLであった。血漿中濃度は健康な成人と同様のレベル
と考えられた^{1,2)}。


16.1.3 生物学的同等性試験

〈アゼルニジピン錠8mg「ケミファ」〉

アゼルニジピン錠8mg「ケミファ」とカルブロック錠
8mgを、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠 (アゼル
ニジピンとして8mg) 健康成人男性に絶食単回経口投
与して血漿中アゼルニジピン濃度を測定し、得られた
薬物動態パラメータ (AUC、Cmax) について90%信
頼区間法にて統計解析を行った結果、log (0.80) ~
log (1.25) の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が
確認された³⁾。

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀₋₄₈ (ng・hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
アゼルニジピン 錠8mg 「ケミファ」	40.935±12.250	5.515±2.460	2.67±0.73	9.82±2.49
カルブロック 錠8mg	37.558±11.166	4.852±1.793	2.81±0.55	9.87±3.45

n=18, mean±SD




＜アゼルニジピン錠16mg「ケミファ」＞

アゼルニジピン錠16mg「ケミファ」とカルブロク錠16mgを、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠（アゼルニジピンとして16mg）健康成人男性に絶食単回経口投与して血漿中アゼルニジピン濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、Cmax）について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log (0.80) ~ log (1.25) の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された³⁾。

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀₋₄₈ (ng·hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
アゼルニジピン錠16mg「ケミファ」	91.341±24.391	11.510±4.654	3.15±0.89	10.38±2.69
カルブロク錠16mg	84.421±22.292	10.196±4.160	3.05±0.63	10.86±3.19

n=20, mean±SD



血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

16.2 吸収

16.2.1 食事の影響

健康な成人男性6例にアゼルニジピン10mgを空腹時投与したときCmax及びAUC_{0-∞}は食後投与と比較してそれぞれ38%及び69%であった⁴⁾。

16.3 分布

16.3.1 蛋白結合率

アゼルニジピンの*in vitro*の血漿蛋白結合率は90~91%で、主にリポ蛋白に非特異的に結合する⁵⁾。

16.4 代謝

主な代謝部位は小腸及び肝臓であり、CYP3A4によりジヒドロピリジン環が酸化される^{6,7)}。[10. 参照]

16.5 排泄

健康な成人男性4例に¹⁴C-アゼルニジピン4mgを単回経口投与したところ、投与後7日までの尿及び糞中への総投与放射能排泄率は、尿中が26%、糞中が63%であった⁸⁾（外国人データ）。

注）本剤の承認用量は1日に8~16mgである。

16.6 特定の背景を有する患者

16.6.1 腎機能障害患者

腎機能低下を伴う高血圧症患者6例（血清クレアチニン1.5~5.3mg/dL）にアゼルニジピン錠8mgを1日1回朝食後7日間連続経口投与したところ、投与1日目及び投与7日目の最高血漿中濃度は8.6ng/mL及び17.1ng/mL、AUC₀₋₂₄は67.3ng·hr/mL及び154.5ng·hr/mLと、7日目で有意に大きな値を示したが、投与24時間後の血漿中濃度は6日目以降はほぼ一定の値を示し定常状態に達した⁹⁾。

投与日数	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)	AUC ₀₋₂₄ (ng·hr/mL)
1日目	8.6±0.87	4.7±0.67	9.1±1.34	67.3±5.81
7日目	17.1±2.08 ^{#1)}	3.5±0.56	19.7±4.86	154.5±17.79 ^{#1)}

n=6, mean±SE, #1) p<0.01 (paired t-test)

16.6.2 肝機能障害患者

軽度・中等度の肝機能障害患者及び健康人各8例にアゼルニジピン錠8mgを単回経口投与したところ、ほぼ同様の血漿中濃度推移を示した¹⁰⁾（外国人データ）。

対象	Cmax ^{注)} (ng/mL)	AUC _{0-∞} ^{注)} (ng·hr/mL)	CL/F (mL/min)
肝機能障害患者	6.0	52.8	3152.5±2342.2
健康人	8.2	68.0	2345.2±1449.1

n=8, mean±SD, 注) 幾何平均

16.6.3 高齢者

高齢高血圧症患者（65~84歳）5例にアゼルニジピン錠8mgを1日1回朝食後7日間連続経口投与したところ、投与1日目及び投与7日目の最高血漿中濃度到達時間はそれぞれ4.4時間及び3.2時間、半減期はそれぞれ6.4時間及び8.6時間、AUC₀₋₂₄はそれぞれ107.0ng·hr/mL及び242.8ng·hr/mLであり、最高血漿中濃度、半減期及びAUC₀₋₂₄は7日目に有意に大きな値を示したが、投与24時間後の血漿中濃度は7日目までにほぼ一定の値を示し定常状態に達した¹¹⁾。

投与日数	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)	AUC ₀₋₂₄ (ng·hr/mL)
1日目	15.8±2.1	4.4±1.0	6.4±1.7 ^{#1)}	107.0±16.9
7日目	25.7±3.6 ^{#2)}	3.2±0.5	8.6±1.6 ^{#2)}	242.8±48.8 ^{#2)}

n=5 (#1) n=4, mean±SE, #2) p<0.05 (paired t-test)

16.7 薬物相互作用

16.7.1 イトラコナゾールとの相互作用

健康な成人男性8例にアゼルニジピン錠8mg及びイトラコナゾール50mgを併用投与したところ、血漿中アゼルニジピンのCmax及びAUCは単独投与と比較してそれぞれ1.6倍、2.8倍に増加した¹²⁾。[2.3, 10.1参照]

投与方法	Cmax ^{注)} (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)	AUC ₀₋₁₂ ^{注)} (ng·hr/mL)
アゼルニジピン錠単独	12.3 (0.4)	2.9±0.6	8.7±1.9	61.0 (0.4)
アゼルニジピン錠+イトラコナゾール併用	19.7 (0.2)	3.6±1.3	10.0±1.6	170.9 (0.2)

n=8, mean±SD, 注) 幾何平均 (対数変換後の標準偏差)

16.7.2 HMG-CoA還元酵素阻害剤との相互作用

健康な成人男性8例にアゼルニジピン錠8mg及びシンバスタチン10mgを併用投与したところ、単独投与と比較して血漿中アゼルニジピン濃度はほとんど変化しなかったが、血漿中シンバスタチン濃度はCmax及びAUCがそれぞれ1.9倍、2.0倍に増加した¹³⁾。

投与方法	Cmax ^{注)} (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)	AUC ₀₋₁₂ ^{注)} (ng·hr/mL)
シンバスタチン単独	1.5 (0.5)	1.4±0.9	2.3±0.6	4.6 (0.6)
シンバスタチン+アゼルニジピン錠併用	2.8 (0.4)	1.9±1.1	2.7±0.9	9.2 (0.4)

n=8, mean±SD, 注) 幾何平均 (対数変換後の標準偏差)

なお、アゼルニジピン8mgとアトルバスタチン10mg又はプラバスタチン10mgの併用投与では、血漿中アゼルニジピン濃度にほとんど変化はなく、血漿中アトルバスタチン濃度はCmax及びAUC_{0-∞}がそれぞれ1.0倍、0.8倍、血漿中プラバスタチン濃度は同じく0.9倍、1.0倍であった¹⁴⁾。[10.2 参照]

16.7.3 グレープフルーツジュースとの相互作用

健康な成人男性8例（23~40歳）にアゼルニジピン錠8mgをグレープフルーツジュースとともに単回経口投与したところ、水で服用した場合と比較してCmax及びAUCはそれぞれ2.5倍、3.3倍に増加した¹⁵⁾。[10.2 参照]

健康な成人男性にアゼルニジピン錠8mgを水又はグレープフルーツジュースで単回経口投与した場合の血漿中未変化体濃度

服用法	Cmax ^{注)} (ng/mL)	Tmax (hr)	AUC ₀₋₂₄ ^{注)} (ng·hr/mL)
水	6.3 (5.6~7.0)	2.1 (1.8~2.4)	45.1 (39.0~52.0)
グレープフルーツジュース	15.7 ^{#1)} (12.8~19.2)	3.9 ^{#1)} (3.0~4.7)	147.9 ^{#1)} (120.6~181.4)

n=8, mean (95%信頼区間), #1) p<0.01 (分散分析), 注) 幾何平均

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

17.1.1 国内第Ⅲ相試験

軽症・中等症本態性高血圧症患者208例にアゼルニジピン錠8～16mgを二重盲検比較法により1日1回12週間連続経口投与した時の降圧率（下降例数^{#1)}/評価例数は72.6%（判定不能を除く場合83.4%）であった¹⁶⁾。アゼルニジピン錠投与と群での副作用発現頻度は、自他覚症状が10.6%（22/208例）、臨床検査値異常が6.7%（14/208例）であった。主な副作用は、ALT上昇3.4%（7/208例）、AST上昇2.9%（6/208例）、頭痛・頭重感2.9%（6/208例）であった。

- #1) 下降：収縮期血圧（ ≥ 20 mmHg以上）及び拡張期血圧（ ≥ 10 mmHg以上）を満たす場合、平均血圧（ ≥ 13 mmHg以上）を満たす場合、あるいは下降傾向^{#2)}であっても150/90mmHg未満に降圧した場合
#2) 下降傾向：収縮期血圧（ ≥ 10 mmHg以上）及び拡張期血圧（ ≥ 5 mmHg以上）を満たす場合、あるいは平均血圧（ ≥ 7 mmHg以上）を満たす場合

17.1.2 国内臨床試験

二重盲検比較試験を含め軽症・中等症本態性高血圧症患者を対象とした試験において、アゼルニジピン錠8～16mgを投与された756例の降圧率は73.7%であった（判定不能を含む）¹⁷⁾。

17.1.3 国内第Ⅲ相試験

重症高血圧症患者を対象とした臨床試験成績での判定不能を含む降圧率は86.7%（26/30例）であり、判定不能を除く場合は92.9%（26/28例）であった¹⁸⁾。副作用発現頻度は、自他覚症状が6.7%（2/30例）、臨床検査値異常が16.7%（5/30例）であった。認められた副作用は、便秘、眠気、全身倦怠感、ふらつき感等が各3.3%（1/30例）であった。

17.1.4 国内第Ⅱ相試験

腎機能障害を伴う高血圧症患者を対象とした臨床試験成績での判定不能を含む降圧率は69.0%（20/29例）であり、判定不能を除く場合は74.1%（20/27例）であった¹⁹⁾。副作用発現頻度は、自他覚症状が10.3%（3/29例）、臨床検査値異常が3.4%（1/29例）であった。認められた副作用は、下痢、心窩部重圧感等が各3.4%（1/29例）であった。

17.1.5 国内第Ⅱ相試験（長期投与）

軽症・中等症本態性高血圧症患者を対象に、1日1回52週間アゼルニジピン錠を単独投与した結果、安定した降圧効果が得られた²⁰⁾。判定不能を含む降圧率は87.4%（83/95例）、判定不能を除く場合は91.2%（83/91例）であった。副作用発現頻度は、自他覚症状が9.5%（9/95例）、臨床検査値異常が6.3%（6/95例）であった。主な副作用は総コレステロール上昇3.2%（3/95例）であった。

17.1.6 国内第Ⅱ相試験（長期投与）

軽症・中等症本態性高血圧症患者を対象に、1日1回52週間アゼルニジピン錠とカルシウム拮抗剤以外の降圧剤を併用投与した結果、安定した降圧効果が得られた²¹⁾。判定不能を含む降圧率は76.7%（132/172例）、判定不能を除く場合は85.2%（132/155例）であった。副作用発現頻度は、自他覚症状が3.5%（8/228例）、臨床検査値異常が14.5%（33/228例）であった。主な副作用はLDH上昇3.5%（8/228例）、尿酸上昇3.5%（8/228例）、ALT上昇2.6%（6/228例）であった。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

アゼルニジピンは、L型Caチャンネル拮抗作用に基づき、血管を拡張させることにより降圧作用を発現する。ブタ心臓ミクロソームを用いた受容体結合実験において、³H-ニトレンジピンの特異的結合に対する50%阻害濃度（IC₅₀値）及び阻害定数（Ki値）はそれぞれ3.1nM、2.1nMであった²²⁾（*in vitro*）。また、アゼルニジピンは肝初回通過効果を受けにくい²³⁾（イヌ）。

18.2 降圧作用

高血圧モデル動物（高血圧自然発症ラット、DOCA食塩高血圧ラット、腎性高血圧ラット、腎周囲炎性腎性高血圧犬）への0.1ないし1～3mg/kgの単回経口投与により血圧は用量依存的に下降し、その作用は緩徐に発現しかつ持続的であり、類薬に比べて心拍数にほとんど影響を及ぼさなかった。また、高血圧自然発症ラット又は腎性高血圧犬への反復経口投与においても安定した降圧作用を示した²⁴⁾。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：アゼルニジピン（Azelnidipine）


化学名：3-[1-(Diphenylmethyl)azetidino-3-yl]-5-(1-methylethyl)(4R)-2-amino-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate

分子式：C₃₃H₃₄N₄O₆

分子量：582.65

性状：淡黄色～黄色の結晶性の粉末又は塊を含む粉末である。エタノール（99.5）又は酢酸（100）に溶けやすく、水にほとんど溶けない。エタノール（99.5）溶液（1→100）は旋光性を示さない。結晶多形が認められる。

化学構造式：



20. 取扱い上の注意

本剤は光により着色するので、アルミピロー開封後は遮光して保存すること。

* 22. 包装

〈アゼルニジピン錠8mg「ケミファ」〉

100錠 [10錠 (PTP) × 10]

〈アゼルニジピン錠16mg「ケミファ」〉

100錠 [10錠 (PTP) × 10]

23. 主要文献

- 1) 中島光好ほか：臨床医薬 2000；16（2）：191-205
- 2) 本態性高血圧症患者における薬物動態（カルブロック錠：2003年1月31日承認、申請資料概要へⅢ-2）
- 3) 日本ケミファ株式会社：生物学的同等性に関する資料（社内資料）
- 4) 中島光好ほか：臨床医薬 2000；16（2）：179-190
- 5) アゼルニジピンの血漿蛋白結合率（カルブロック錠：2003年1月31日承認、申請資料概要へⅡ-2）
- 6) チトクロームP450分子種（カルブロック錠：2003年1月31日承認、申請資料概要へⅡ-3）
- 7) 代謝に及ぼすグレープフルーツジュースの影響（カルブロック錠：2003年1月31日承認、申請資料概要へⅡ-5）
- 8) アゼルニジピンの排泄（カルブロック錠：2003年1月31日承認、申請資料概要へⅢ-1）
- 9) 小口寿夫ほか：臨床医薬 1999；15（5）：765-777
- 10) 肝機能障害患者における薬物動態（カルブロック錠：2003年1月31日承認、申請資料概要へⅢ-1）
- 11) 桑島 巖ほか：臨床医薬 2000；16（3）：375-387
- 12) イトラコナゾール併用投与時の薬物動態（カルブロック錠：2003年1月31日承認、申請資料概要へⅢ-6）
- 13) シンバスタチン併用投与時の薬物動態（カルブロック錠：2003年1月31日承認、申請資料概要へⅢ-6）
- 14) アトルバスタチン及びプラバスタチン併用投与時の薬物動態（カルブロック錠：2012年12月19日、再審査報告書）
- 15) Hirashima H, et al.：臨床薬理 2006；37（3）：127-133
- 16) 吉永 馨ほか：臨床医薬 2000；16（5）：671-739
- 17) 全評価患者における有効性のまとめ（カルブロック錠：2003年1月31日承認、申請資料概要ト-Ⅱ-12）
- 18) 荻原俊男ほか：臨床医薬 1999；15（6）：985-1004
- 19) 猿田享男ほか：臨床医薬 1999；15（6）：1005-1031
- 20) 吉永 馨ほか：臨床医薬 1999；15（6）：943-983
- 21) 平井愛山ほか：臨床医薬 1999；15（9）：1505-1545
- 22) アゼルニジピンの作用機序（カルブロック錠：2003年1月31日承認、申請資料概要ホ-I-2）
- 23) アゼルニジピンの初回通過効果（カルブロック錠：2003年1月31日承認、申請資料概要へⅡ-1）
- 24) アゼルニジピンの降圧作用（カルブロック錠：2003年1月31日承認、申請資料概要ホ-I-1）

24. 文献請求先及び問い合わせ先

日本ケミファ株式会社 安全管理部
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目2-3
TEL 0120-47-9321 03-3863-1225
FAX 03-3861-9567

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

 日本ケミファ株式会社
東京都千代田区岩本町2丁目2-3