

貯法：室温保存
有効期間：2年

	承認番号	販売開始
テープ 15mg	22100AMX02055000	2009年11月
テープ 30mg	22100AMX01928000	2009年11月

経皮鎮痛消炎剤
ジクロフェナクナトリウムテープ
ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「JG」
ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「JG」
Diclofenac Sodium Tape

2. 禁忌 (次の患者には投与しないこと)

- 2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2.2 アスピリン喘息 (非ステロイド性消炎鎮痛剤等により誘発される喘息発作) 又はその既往歴のある患者 [重症喘息発作を誘発するおそれがある。] [9.1.1 参照]

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	有効成分	添加剤
ジクロフェナクナトリウムテープ 15mg 「JG」	1枚 10cm×7cm (膏体 1.5g/70cm ²) 中に日局ジクロフェナクナトリウム 15mg を含有する。	トメントール、ジブチルヒドロキシトルエン、N-メチル-2-ピロリドン、ステレン・イソブレン・ステレンブロック共重合体、エステルガム、流動パラフィン その他 1成分
ジクロフェナクナトリウムテープ 30mg 「JG」	1枚 14cm×10cm (膏体 3g/140cm ²) 中に日局ジクロフェナクナトリウム 30mg を含有する。	トメントール、ジブチルヒドロキシトルエン、N-メチル-2-ピロリドン、ステレン・イソブレン・ステレンブロック共重合体、エステルガム、流動パラフィン その他 1成分

3.2 製剤の性状

販売名	色・剤形	1枚の大きさ	識別コード
ジクロフェナクナトリウムテープ 15mg 「JG」	無色～淡黄色透明で、わずかに芳香のある膏体を支持体に均一に展延し、膏体表面をプラスチックフィルムで被覆したテープ剤	10cm×7cm	JG E88
ジクロフェナクナトリウムテープ 30mg 「JG」	無色～淡黄色透明で、わずかに芳香のある膏体を支持体に均一に展延し、膏体表面をプラスチックフィルムで被覆したテープ剤	14cm×10cm	JG E89

4. 効能又は効果

下記疾患並びに症状の鎮痛・消炎

変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎 (テニス肘等)、筋肉痛 (筋・筋膜性腰痛症等)、外傷後の腫脹・疼痛

6. 用法及び用量

1日1回患部に貼付する。

8. 重要な基本的注意

- 8.1 消炎鎮痛剤による治療は原因療法ではなく対症療法であることに留意すること。
8.2 慢性疾患 (変形性関節症等) に対し本剤を用いる場合には、薬物療法以外の療法も考慮すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 気管支喘息のある患者 (アスピリン喘息又はその既往歴のある患者を除く)

アスピリン喘息ではないことを十分に確認すること。気管支喘息の患者の中にはアスピリン喘息患者も含まれている可能性があり、それらの患者では重症喘息発作を誘発するおそれがある。 [2.2 参照]

9.1.2 皮膚感染症のある患者

感染を伴う炎症に対して用いる場合には適切な抗菌剤又は抗真菌剤を併用し、観察を十分に行い慎重に使用すること。皮膚の感染症を不顕性化するおそれがある。

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性に対しては治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。他の非ステロイド性消炎鎮痛剤の外皮用剤を妊娠後期の女性に使用し、胎児動脈管収縮が起きたとの報告がある。また、シクロオキシゲナーゼ阻害剤 (経口剤、坐剤) を妊婦に使用し、胎児の腎機能障害及び尿量減少、それに伴う羊水過少症が起きたとの報告がある。

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

10. 相互作用

10.2 併用注意 (併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ニューキノロン系抗菌剤 レボフロキサシン等	痙攣を起こすおそれがある。痙攣が発現した場合には、気道を確保し、ジアゼパムの静注等を行う。	ニューキノロン系抗菌剤が脳内の抑制性神経伝達物質である GABA の受容体結合を濃度依存的に阻害し、ある種の非ステロイド性抗炎症剤との共存下ではその阻害作用が増強されることが動物で報告されている。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 ショック、アナフィラキシー (いずれも頻度不明)

ショック、アナフィラキシー (蕁麻疹、血管浮腫、呼吸困難等) があらわれることがある。

11.1.2 接触皮膚炎 (頻度不明)

使用部位に発赤、紅斑、発疹、そう痒感、疼痛の皮膚症状があらわれ、腫脹、浮腫、水疱・びらん等に悪化し、さらに全身に拡大し重篤化することがある。

11.2 その他の副作用

	0.1～5%未満	0.1%未満	頻度不明
皮膚	皮膚炎、そう痒感、発赤、皮膚のあれ、刺激感	水疱、色素沈着	光線過敏症、浮腫、腫脹、皮膚剥脱

注) 1%ジクロフェナクナトリウム軟膏における発現頻度

14. 適用上の注意

14.1 薬剤使用時の注意

- 14.1.1 損傷皮膚及び粘膜に使用しないこと。
14.1.2 湿疹又は発疹の部位に使用しないこと。

16. 薬物動態

16.3 分布

16.3.1 生物学的同等性試験

ジクロフェナクナトリウムテープ 15mg 「JG」 とボルタレンテープ 15mg を健康成人男性 6 名の背部皮膚に貼付し、貼付後の製剤に残存するジクロ

フェナクナトリウムの量より皮膚への移行量を算出した。得られた値について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log (0.70) ~log (1.43) の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された¹⁾。

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

17.1.1 国内臨床試験

1%ジクロフェナクナトリウム軟膏における二重盲検試験を含む935例の臨床試験結果より得られた改善率は以下のとおりであった²⁾⁻¹⁷⁾。

疾患名	症例数	中等度改善以上 (%)
変形性関節症	212	135 (63.7)
肩関節周囲炎	135	81 (60.0)
腱・腱鞘炎、腱周囲炎	127	85 (66.9)
上腕骨上顆炎	106	70 (66.0)
筋肉痛	220	161 (73.2)
外傷後の腫脹・疼痛	150	117 (78.0)

(1%ジクロフェナクナトリウム軟膏の臨床成績)

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

プロスタグランジン合成阻害作用による抗炎症、鎮痛作用等が考えられている¹⁸⁾。

18.2 抗炎症作用

18.2.1 急性炎症

1%ジクロフェナクナトリウム軟膏は、カラゲニン足蹠浮腫(ラット)、紫外線紅斑(モルモット)で、1%インドメタシン軟膏と同程度の抗炎症作用を示す。また、カラゲニン誘発炎症足中(ラット)のプロスタグランジンE₂の産生を有意に抑制する¹⁹⁾。

18.2.2 亜急性・慢性炎症

1%ジクロフェナクナトリウム軟膏は、マスタード足蹠浮腫(ラット)、ペーパーディスク試験(ラット)、アジュバント関節炎(ラット)で、1%インドメタシン軟膏と同程度の抗炎症作用を示す²⁰⁾。

18.3 鎮痛作用

1%ジクロフェナクナトリウム軟膏は、酢酸ライジング疼痛試験(マウス)、イースト疼痛試験(ラット)で、1%インドメタシン軟膏と同程度の疼痛抑制作用を示す²¹⁾。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般名：ジクロフェナクナトリウム (Diclofenac Sodium)

化学名：Monosodium 2-(2,6-dichlorophenylamino)phenylacetate

分子式：C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂


分子量：318.13

性状：白色～微黄白色の結晶又は結晶性の粉末である。

メタノール又はエタノール(95)に溶けやすく、水又は酢酸(100)にやや溶けにくく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。

吸湿性である。

構造式：



22. 包装

〈ジクロフェナクナトリウムテープ 15mg [JG]〉

70枚 [7枚(アルミ袋)×10]

700枚 [7枚(アルミ袋)×100]

〈ジクロフェナクナトリウムテープ 30mg [JG]〉

70枚 [7枚(アルミ袋)×10]

23. 主要文献

- 社内資料：生物学的同等性試験
- 変形性膝関節症に対する用量設定試験(後期第Ⅱ相)(ボルタレンゲル：2000年1月18日承認、申請資料概要ト.2.2-3)
- 宗広忠平 他：臨床医薬 2000；16(4)：407-417
- 真鍋等 他：臨床医薬 2000；16(4)：419-426
- 青木虎吉 他：臨床医薬 2000；16(4)：427-443
- 青木虎吉 他：臨床医薬 2000；16(4)：445-467
- 青木虎吉 他：臨床医薬 2000；16(4)：469-488
- 青木虎吉 他：臨床医薬 2000；16(4)：489-503
- 長屋郁郎 他：臨床医薬 2000；16(4)：505-519
- 竹光義治 他：臨床医薬 2000；16(4)：521-527
- 渡辺好博 他：臨床医薬 2000；16(4)：529-538
- 小野啓郎 他：臨床医薬 2000；16(4)：539-555
- 岩崎勝郎 他：臨床医薬 2000；16(4)：557-566
- 高橋栄明 他：臨床医薬 2000；16(4)：567-576
- 山野慶樹 他：臨床医薬 2000；16(4)：577-585
- 井形高明 他：臨床医薬 2000；16(4)：587-594
- 杉岡洋一 他：臨床医薬 2000；16(4)：595-609

18) 第十八改正 日本薬局方解説書 廣川書店 2021；C2173-C2181

19) 急性炎症(ボルタレンゲル：2000年1月18日承認、申請資料概要イ.1)

20) 亜急性・慢性炎症(ボルタレンゲル：2000年1月18日承認、申請資料概要ホ.1.1)

21) 鎮痛作用(ボルタレンゲル：2000年1月18日承認、申請資料概要ホ.1.2)

* 24. 文献請求先及び問い合わせ先

日本ジェネリック株式会社 お客さま相談室
〒108-0014 東京都港区芝五丁目33番11号
TEL 0120-893-170 FAX 0120-893-172

26. 製造販売業者等

* 26.1 製造販売元



日本ジェネリック株式会社
東京都港区芝五丁目33番11号