

貯 法：室温保存
有効期間：3年承認番号 22000AMX01503000
販売開始 1992年7月外用消毒剤
ポビドンヨード液イソジン®フィールド液 10%
ISODINE® FIELD SOLUTION 10%

シオノギ製薬

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	イソジンフィールド液10%
成分・含量 (1mL中)	ポビドンヨード100mg (有効ヨウ素として10mg)
添加剤	クエン酸水和物、無水リン酸一水素ナトリウム、濃グリセリン、エタノール、pH調整剤

3.2 製剤の性状

性状	溶剤として日局エタノールを含有し、速乾性を有する黒褐色の液剤で、特異なおいがある。本剤は無菌製剤である（開栓までの無菌を保証）。
----	--

4. 効能・効果

手術部位（手術野）の皮膚の消毒

6. 用法・用量

本剤を塗布する。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 本剤又はヨウ素に対し過敏症の既往歴のある患者

9.1.2 甲状腺機能に異常のある患者

血中ヨウ素の調節ができず甲状腺ホルモン関連物質に影響を与えるおそれがある。

9.7 小児等

ポビドンヨード製剤を新生児に使用し、一過性の甲状腺機能低下を起こしたとの報告がある¹⁾。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 ショック（0.1%未満）、アナフィラキシー（0.1%未満）

呼吸困難、不快感、浮腫、潮紅、蕁麻疹等があらわれることがある。

11.2 その他の副作用

	0.1%未満
過敏症	発疹
皮膚	接触皮膚炎、そう痒感、灼熱感、皮膚潰瘍、皮膚変色
甲状腺	血中甲状腺ホルモン値（T ₃ 、T ₄ 値等）の上昇あるいは低下などの甲状腺機能異常

12. 臨床検査結果に及ぼす影響

酸化反応を利用した潜血試験において、本剤が検体に混入すると偽陽性を示すことがある²⁾。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤使用時の注意

14.1.1 エタノールによる刺激作用を有するため、損傷・創傷皮膚及び粘膜には使用しないこと。

14.1.2 大量かつ長時間の接触によって接触皮膚炎、皮膚変色があらわれることがあるので、溶液の状態です長時間皮膚と接触させないこと³⁾。本剤が手術時に体の下にたまった状態や、ガーゼ・シーツ等にしみ込み湿った状態で、長時間皮膚と接触しないよう消毒後は拭き取るか乾燥させるなど注意すること。

14.1.3 眼に入らないように注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。

14.1.4 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い落としてから使用すること。

14.1.5 電気的な絶縁性をもっているため、電気メスを使用する場合には、本剤が対極板と皮膚の間に入らないよう注意すること。

14.1.6 エタノールを含有しているため、電気メスを使用する場合には、本剤を乾燥させ、エタノール蒸気の拡散を確認してから使用すること。特にドレープ（覆い布）等の使用時には、本剤が液状として残ったり、ドレープ下に気化したエタノール蒸気が充満することで、引火しやすくなるおそれがある。

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

水溶液中のポビドンヨード液はヨウ素を遊離し、その遊離ヨウ素（I₂）が水を酸化してH₂OI⁺が生じる。H₂OI⁺は細菌及びウイルス表面の膜タンパク（-SHグループ、チロシン、ヒスチジン）と反応することにより、細菌及びウイルスを死滅させると推定される。

18.2 細菌等に対する効果（in vitro）

18.2.1 本剤が細菌等を殺菌するのに要する最小時間は次のとおりであった⁴⁾。

被験菌	殺菌時間
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538P	30秒以内
<i>Staphylococcus aureus</i> No.26	30 "
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228	30 "
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 10389	30 "
<i>Corynebacterium diphtheriae</i> Type Gravis	30 "
<i>Escherichia coli</i> NIHJ JC-2	30 "
<i>Salmonella paratyphi</i> A	30 "
<i>Salmonella paratyphi</i> B	30 "
<i>Shigella sonnei</i> 91-66	30 "
<i>Proteus vulgaris</i> OX-19	30 "
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> IAM 1007	30 "
<i>Candida albicans</i> IAM 4888	30 "

18.2.2 ポビドンヨード製剤（10%液剤）の臨床分離株に対する効果は次のとおりであった^{5) -8)}。

被験菌	株数	ポビドンヨード製剤（10%液剤）の希釈倍率（PVP-I濃度）	作用時間	滅菌率
<i>Staphylococcus aureus</i> (MSSA)	20	20倍（0.5%）	30秒	99.99%以上
<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)	20	20倍（0.5%）	30秒	99.99%以上
<i>Escherichia coli</i>	10	20倍（0.5%）	30秒	99.99%以上
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	20	20倍（0.5%）	30秒	99.99%以上
<i>Serratia marcescens</i>	20	20倍（0.5%）	30秒	99.99%以上
<i>Burkholderia cepacia</i>	10	20倍（0.5%）	30秒	99.99%以上
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	10	20倍（0.5%）	30秒	99.99%以上
<i>Mycobacterium avium</i>	2	100倍（0.1%）	30秒	99.9%以上
<i>Mycobacterium kansasii</i>	3	100倍（0.1%）	30秒	99.9%以上
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	7	100倍（0.1%）	30秒	99.99%以上
<i>Bordetella pertussis</i>	10	50倍（0.2%）	15秒	99.99%以上

18.3 ウイルスに対する効果（in vitro）

ポビドンヨード製剤（10%液剤）のウイルスに対する効果は次のとおりであった^{9) -14)}。


ウイルス	ポビドンヨード製剤（10%液剤）の希釈倍率（PVP-I濃度）	作用時間	ウイルス不活化率
単純ヘルペスウイルス	10倍（1.0%）	30秒	99.99%以上
アデノウイルス	10倍（1.0%）	30秒	99.9%以上
風疹ウイルス	10倍（1.0%）	60秒	99.99%以上
麻疹ウイルス	10倍（1.0%）	60秒	99.0%以上
ムンプスウイルス	10倍（1.0%）	60秒	99.99%以上
インフルエンザウイルス	10倍（1.0%）	30秒	99.99%以上
ロタウイルス（サル）	10倍（1.0%）	30秒	99.9%以上
ポリオウイルス	2倍（5.0%）	30秒	99.9%以上
HIV	20倍（0.05%）	30秒	99.9%以上
サイトメガロウイルス	10倍（1.0%）	30秒	99.9%以上
SARSウイルス	10倍（1.0%）	60秒	99.99%以上
鳥インフルエンザウイルス（高病原性）	5倍（2.0%）	10秒	99.99%以上
鳥インフルエンザウイルス（低病原性）	5倍（2.0%）	10秒	99.99%以上
豚インフルエンザウイルス	10倍（1.0%）	10秒	99.99%以上

ウイルス	ポビドンヨード製剤（10%液剤）の希釈倍率（PVP-I濃度）	作用時間	ウイルス不活化率
カリシウイルス（ネコ、イヌ）	40倍（0.25%）	10秒	99.9%以上
マウスノロウイルス	50倍（0.2%）	15秒	99.99%以上

また、コクサッキーウイルス、エコーウイルス、エンテロウイルスに対しても効果が認められた^{15)、16)}。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：ポビドンヨード（Povidone-Iodine）
 化学名：Poly[1-(2-oxopyrrolidin-1-yl)ethylene]iodine
 分子式：(C₅H₉NO)_n・xI
 化学構造式：



性状：ポビドンヨードは暗赤褐色の粉末で、僅かに特異なおいがある。
 本品は水又はエタノール（99.5）に溶けやすい。
 本品1.0gを水100mLに溶かした液のpHは1.5～3.5である。

20. 取扱い上の注意

直射日光を避けて保存すること。

22. 包装

プラスチックボトル：250mL

23. 主要文献

- 1) 竹内 敏ほか：日本小児外科学会雑誌. 1994；30(4)：749-754
- 2) Bar-Or, D., et al. : Lancet. 1981；2(8246)：589
- 3) Okano, M. : J Am Acad Derm. 1989；20(5)：860
- 4) 塚本美樹ほか：基礎と臨床. 1994；28(2)：399-406
- 5) 国定孝夫ほか：環境感染. 1999；14(2)：142-147
- 6) 国定孝夫ほか：環境感染. 2000；15(2)：156-162
- 7) Rikimaru, T., et al. : Dermatology. 1997；195(Suppl.2)：104-106
- 8) Suzuki, T., et al. : J Infect Chemother. 2012；18(2)：272-275
- 9) 川名林治ほか：臨床とウイルス. 1998；26(5)：371-386
- 10) Kariwa, H., et al. : Dermatology. 2006；212(Suppl.1)：119-123
- 11) Ito, H., et al. : Dermatology. 2006；212(Suppl.1)：115-118
- 12) 伊藤啓史ほか：日本化学療法学会雑誌. 2009；57(6)：508-510
- 13) 遠矢幸伸ほか：日本化学療法学会雑誌. 2006；54(3)：260-262
- 14) Matsuhira, T., et al. : Exp Anim. 2012；61(1)：35-40
- 15) 栗村 敬ほか：Biomedica. 1987；2(12)：1223-1226
- 16) 野田伸司ほか：岐衛研所報. 1979；24：15-21

24. 文献請求先及び問い合わせ先

塩野義製薬株式会社 医薬情報センター
 〒541-0045 大阪市中央区道修町3丁目1番8号
 電話 0120-956-734
 FAX 06-6202-1541
<https://med.shionogi.co.jp/>

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

ムンディファーマ株式会社
 東京都港区港南 2-15-1

26.2 販売

塩野義製薬株式会社
 〒541-0045 大阪市中央区道修町3丁目1番8号