

処方せん医薬品[※]

日本薬局方
生理食塩液
生食注「トローワ」

日本標準商品分類番号 873311

貯 法：室温保存
使用期限：外箱、アンプルに記載

ISOTONIC SODIUM CHLORIDE INJECTION “TOWA”

承認番号	薬価収載	販売開始	再評価結果
(61AM)3082	薬価基準収載	不 明	1977年10月

【組成・性状】

1 管容量	20mL
有効成分	日局 塩化ナトリウム ……………180mg (0.9 ^w /v%)
添加物	—
性状	無色澄明の液で、弱い塩味がある。
pH	4.5～8.0

【効能・効果】

注 射：細胞外液欠乏時、ナトリウム欠乏時、クロール欠乏時、
注射剤の溶解希釈剤
外 用：皮膚・創傷面・粘膜の洗浄・湿布、含そう・噴霧吸入剤
として気管支粘膜洗浄・喀痰排出促進
その他：医療用器具の洗浄

【用法・用量】

注 射：(1)通常20～100mLを皮下、静脈内注射又は点滴静注す
る。なお、年齢、症状により適宜増減する。
(2)適量を取り注射用医薬品の希釈、溶解に用いる。
外 用：(1)皮膚、創傷面、粘膜の洗浄、湿布に用いる。
(2)含そう、噴霧吸入に用いる。
その他：医療用器具の洗浄に用いる。

【使用上の注意】

- 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
 - 心臓、循環器系機能障害のある患者〔循環血流量を増やすこと
から心臓に負担をかけ、症状が悪化するおそれがある。〕
 - 腎障害のある患者〔水分、塩化ナトリウムの過剰投与に陥
りやすく、症状が悪化するおそれがある。〕
- 副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を
実施していない。
副作用が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置
を行うこと。

	頻度不明
大量・急速投与	血清電解質異常、うっ血性心不全、浮腫、アシドーシス

- 高齢者への投与
一般に高齢者では生理機能が低下しているので、投与速度を緩
徐にし、減量するなど注意すること。
- 適用上の注意
 - 調製時：注射剤の溶解・希釈液として使用する場合は、生
理食塩液が適切であることを確認すること。
 - 投与前：
 - 投与に際しては、感染に対する配慮をすること（患者の皮
膚や器具消毒）。
 - 寒冷期には体温程度に温めて使用すること。
 - 開封後直ちに使用し、残液は決して使用しないこと。
 - 投与时：ゆっくり静脈内に投与すること。
 - アンプルカット時：本剤はワンポイントカットアンプルで

あるが、異物の混入を避けるため、アンプルカット部分を
エタノール綿等で清拭してからカットすることが望ましい。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：塩化ナトリウム (Sodium Chloride)
分子式：NaCl
分子量：58.44
性 状：無色又は白色の結晶又は結晶性の粉末である。水に溶け
やすく、エタノール(99.5)にほとんど溶けない。

※※【取扱い上の注意】

- 注意
本剤はワンポイントカットアンプルを使用しているの
で、アンプル頭部の●マークを上にして反対方向に折りとること。
- 安定性試験
最終包装製品を用いた長期保存試験（室温、5年）の結果、
生食注「トローワ」は通常の市場流通下において5年間安定である
ことが確認された¹⁾。

【包 装】

生食注「トローワ」：20mL×50管

※※【主要文献】

- ※※1) 東和薬品株式会社 社内資料：安定性試験

※※【文献請求先・製品情報お問い合わせ先】

主要文献（社内資料を含む）は下記にご請求下さい。
東和薬品株式会社 学術部DIセンター（24時間受付対応）
〒571-8580 大阪府門真市新橋町2番11号
☎0120-108-932 TEL 06-6900-9108 FAX 06-6908-5797
<http://www.towayakuhin.co.jp/forstaff>



製造販売元
東和薬品株式会社
大阪府門真市新橋町2番11号

注) 注意—医師等の処方せんにより使用すること