

2024年3月改訂(第1版)

貯法:室温保存

有効期間:5年

生薬

医療用

500g

日本薬局方 サンシシ トチモトのサンシシ

10090
山梔子(刻)

日本標準商品分類番号 875100

承認番号 15700AMZ00887000

販売開始 不明

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名:トチモトのサンシシ

有効成分:1g中、日局サンシシ1g含有

添加剤:なし

4. 効能又は効果 漢方処方調剤に用いる。

6. 用法及び用量 漢方処方調剤に用いる。

8. 重要な基本的注意

8.1 本剤の使用にあたっては、漢方処方における患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。

8.2 サンシシ含有製剤の長期投与(多くは5年以上)により、大腸の色調異常、浮腫、びらん、潰瘍、狭窄を伴う腸間膜静脈硬化症があらわれるおそれがある。長期投与する場合にあつては、定期的にCT、大腸内視鏡等の検査を行うことが望ましい。[11.1.1参照]

8.3 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

11. 副作用 次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 腸間膜静脈硬化症(頻度不明)

長期投与により、腸間膜静脈硬化症があらわれることがある。腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれた場合、又は便潜血陽性になった場合には投与を中止し、CT、大腸内視鏡等の検査を実施するとともに、適切な処置を行うこと。なお、腸管切除術に至った症例も報告されている。[8.2参照]

20. 取扱い上の注意

20.1 本品の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

20.2 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。

20.3 本品は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

22. 包装 500g[袋、脱酸素剤入]

24. 文献請求先及び問い合わせ先

株式会社栃本天海堂 お客様相談窓口

大阪市北区末広町3番21号

TEL: 06-7711-0730

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元 株式会社 栃本天海堂

大阪市北区末広町3番21号

<販売包装単位>

(17)000000(10)00000000



(01)14987466321180

<調剤包装単位>



(01)04987466221186

製造番号

使用期限

クチナシ *Gardenia jasminoides* J. Ellis (*Rubiaceae*) の果実で、ときには湯通し又は蒸したものを

2024年3月改訂(第1版)

貯法:室温保存

有効期間:5年

生薬

医療用
500g

日本薬局方 サンシシ トチモトのサンシシ

10092

山梔子
(丸手・刻)

日本標準商品分類番号 875100

承認番号 15700AMZ00887000

販売開始 不明

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名:トチモトのサンシシ

有効成分:1g中、日局サンシシ1g含有

添加剤:なし

4. 効能又は効果 漢方処方調剤に用いる。

6. 用法及び用量 漢方処方調剤に用いる。

8. 重要な基本的注意

8.1 本剤の使用にあたっては、漢方処方における患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。

8.2 サンシシ含有製剤の長期投与(多くは5年以上)により、大腸の色調異常、浮腫、びらん、潰瘍、狭窄を伴う腸間膜静脈硬化症があらわれるおそれがある。長期投与する場合にあつては、定期的にCT、大腸内視鏡等の検査を行うことが望ましい。[11.1.1参照]

8.3 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

11. 副作用 次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 腸間膜静脈硬化症(頻度不明)

長期投与により、腸間膜静脈硬化症があらわれることがある。腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれた場合、又は便潜血陽性になった場合には投与を中止し、CT、大腸内視鏡等の検査を実施するとともに、適切な処置を行うこと。なお、腸管切除術に至った症例も報告されている。[8.2参照]

20. 取扱い上の注意

20.1 本品の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

20.2 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。

20.3 本品は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

22. 包装 500g [袋、脱酸素剤入]

24. 文献請求先及び問い合わせ先

株式会社栃本天海堂 お客様相談窓口

大阪市北区末広町3番21号

TEL: 06-7711-0730

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元 株式会社 栃本天海堂

大阪市北区末広町3番21号

<販売包装単位>

(17)000000(10)00000000



(01)14987466321432

<調剤包装単位>



(01)04987466221438

製造番号

使用期限

クチナシ *Gardenia jasminoides* J. Ellis (*Rubiaceae*) の果実で、ときには湯通し又は蒸したものを

2024年3月改訂(第1版)

貯法:室温保存

有効期間:5年

生薬

医療用
500g

日本薬局方 サンシシ トチモトのサンシシ

10099

山梔子
(皮去・刻)

日本標準商品分類番号 875100

承認番号 15700AMZ00887000

販売開始 不明

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名:トチモトのサンシシ

有効成分:1g中、日局サンシシ1g含有

添加剤:なし

4. 効能又は効果 漢方処方調剤に用いる。

6. 用法及び用量 漢方処方調剤に用いる。

8. 重要な基本的注意

8.1 本剤の使用にあたっては、漢方処方における患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。

8.2 サンシシ含有製剤の長期投与(多くは5年以上)により、大腸の色調異常、浮腫、びらん、潰瘍、狭窄を伴う腸間膜静脈硬化症があらわれるおそれがある。長期投与する場合にあつては、定期的にCT、大腸内視鏡等の検査を行うことが望ましい。[11.1.1参照]

8.3 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

11. 副作用 次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 腸間膜静脈硬化症(頻度不明)

長期投与により、腸間膜静脈硬化症があらわれることがある。腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれた場合、又は便潜血陽性になった場合には投与を中止し、CT、大腸内視鏡等の検査を実施するとともに、適切な処置を行うこと。なお、腸管切除術に至った症例も報告されている。[8.2参照]

20. 取扱い上の注意

20.1 本品の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

20.2 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。

20.3 本品は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

22. 包装 500g[袋、脱酸素剤入]

24. 文献請求先及び問い合わせ先

株式会社栃本天海堂 お客様相談窓口

大阪市北区末広町3番21号

TEL: 06-7711-0730

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元 株式会社 栃本天海堂

大阪市北区末広町3番21号

<販売包装単位>

(17)000000(10)00000000



(01)14987466321197

<調剤包装単位>



(01)04987466221193

製造番号

使用期限

クチナシ *Gardenia jasminoides* J. Ellis (*Rubiaceae*) の果実で、ときには湯通し又は蒸したものを