

貯 法：室温保存

有効期間：3年

承認番号 20600AMZ01078000

販売開始 1995年9月

## 生薬製剤

## 日本薬局方 ブシ末

## 劇薬 本草加工ブシ末（調剤用）

## 3. 組成・性状

## 3.1 組成

|      |  |
|------|--|
| 販売名  | 本草加工ブシ末  |
| 有効成分 | 本品はアコニチン、メサコニチンを含むトリカブト属カラトリカブト ( <i>Aconitum carmichaeli</i> Debx.) 並びにオクトリカブト ( <i>Aconitum subcuneatum</i> Nakai) の塊根を加工したものである。総アルカロイド〔ベンゾイルアコニン ( $C_{20}H_{18}NO_{10}$ : 603.70) として] 0.4～1.2%を含む。(高压蒸気処理による加工) (ブシ末1) |
| 添加剤  | トウモロコシデンプン   |

## 3.2 製剤の性状

|       |        |
|-------|--------|
| 剤形    | 粉末     |
| 色調    | 淡褐色    |
| 識別コード | —      |
| におい   | 特異なにおい |

## 4. 効能又は効果

漢方処方調剤に用いる。

## 6. 用法及び用量

漢方処方調剤に用いる。

## 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

## 9.1 合併症・既往歴等のある患者

## 9.1.1 体力の充実している患者

副作用があらわれやすくなり、その症状が増強されるおそれがある。

## 9.1.2 暑がり、のぼせが強く、赤ら顔の患者

心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等があらわれるおそれがある。

## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

## 11.2 その他の副作用

|     |                    |
|-----|--------------------|
|     | 頻度不明               |
| その他 | 心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等 |

## 20. 取扱い上の注意

20.1 本品の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

20.2 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。

20.3 本品は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

## 22. 包装

500g（バラ包装）〔ボトル〕

## 24. 文献請求先及び問い合わせ先

本草製薬株式会社 学術部

〒468-0046 名古屋市天白区古川町125番地

TEL 052-892-1287 FAX 052-895-4928

## 26. 製造販売業者等

## 26.1 製造販売元

本草製薬株式会社

名古屋市天白区古川町125番地