

貯 法：室温保存
有効期間：3年

許可番号	13A2X00114
販売開始	1949年11月

賦形剤

日本薬局方 タルク

Talc

3. 組成・性状

3.1 組成

成 分	1g中 日局 タルク 1g
-----	---------------

3.2 製剤の性状

性 状	白色～灰白色の微細な結晶性の粉末である。 なめらかな触感があり、皮膚につきやすい。 水又はエタノール（99.5）にほとんど溶けない。
-----	--

4. 効能又は効果

丸剤、錠剤の賦形剤、滑沢剤として調剤に用いる。
また、散布剤として用いる。

6. 用法及び用量

丸剤、錠剤の賦形剤、滑沢剤として調剤に用いる。
また、散布剤として用いる。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤使用時の注意

創面や粘膜に散布すると癒着を起こしやすい欠点があるので、創面への散布剤として使用するのは避けること。

22. 包装

500g [内装：ポリ袋、外装：紙箱]

24. 文献請求先及び問い合わせ先

小塚製薬株式会社 学術情報室
〒130-0026 東京都墨田区両国4-36-9
TEL：03-3631-1495 FAX：03-3631-1457

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

小塚製薬株式会社
東京都墨田区両国4-36-9