

この説明文書はお薬とともに保管し、使用の際にはよくお読み下さい。

説明文書改訂年月

2017年12月

※(用法・用量の改訂)

※(使用上の注意の改訂)

※(成分・分量と作用の改訂)

ベルゲンカプセルⅢ 第②類医薬品

総合かぜ薬(ゴオウ・ビタミンB₁・B₂配合)

かぜをひきますと、悪寒・鼻水・鼻づまりをはじめとして、さらに、のどの痛み、頭痛、発熱など様々な症状があらわれます。

ベルゲンカプセルⅢは、このような諸症状の改善に、すぐれた効果を発揮するよう10の成分を配合したかぜ薬です。

使用上の注意



してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる

1 次の人は服用しないで下さい

※①本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

②本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

※③12歳未満の小児。

2 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含む内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい

(眠気等があらわれることがある。)

4 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい

5 服用前後は飲酒しないで下さい

6 長期連用しないで下さい



必ずお守り下さい



相談すること

1 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

①医師又は歯科医師の治療を受けている人。

②妊婦又は妊娠していると思われる人。

③高齢者。

④薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

⑤次の症状のある人。

高熱、排尿困難

※⑥次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

2 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
シ ョ ッ ク (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症)	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る。全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
※呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
便秘、口のかわき、眠気

4 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

裏面もお読み下さい→

※用法・用量

いずれも、1日3回食後なるべく30分以内に服用して下さい。

年 齢	1 回 量	服用回数
成 人 15歳以上	2カプセル	1日3回
12歳以上15歳未満	1カプセル	
12歳未満	服用しない×	

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 用法及び用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (3) カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲み下さい。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



効能・効果

かぜの諸症状

(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和



※成分・分量と作用

成 分	成人1日量(6カプセル)中	作 用
アセトアミノフェン	900.0mg	かぜに伴う悪寒、発熱、のどの痛み、筋肉の痛みに効果があります。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	かぜの初期にみられる、鼻水、鼻づまり、くしゃみに効果があります。
ジヒドロコデインリン酸塩	24.0mg	中枢に作用して、せきをしずめます。
ノスカピン	48.0mg	中枢に作用して、せきをしずめます。
d l-メチルエフェドリン塩酸塩	60.0mg	気管支をひろげてせきをしずめます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	240.0mg	気道の粘膜についているたんをうすめて、はきだしやすくします。
無水カフェイン	75.0mg	脳の血管に働いて、頭痛をやわらげます。
チアミンジスルフィド(ビタミンB ₁)	24.0mg	ビタミンB ₁ 、ビタミンB ₂ をおぎないますと、回復しやすくなります。
リボフラビン(ビタミンB ₂)	12.0mg	ビタミンB ₁ 、ビタミンB ₂ をおぎないますと、回復しやすくなります。
ゴオウ	3.0mg	生薬成分で、強心・解熱作用があります。


添加物として、沈降炭酸カルシウム、バレイシヨデンブ、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、カラギーナン、ソルビタン脂肪酸エステルを含有します。

〈成分及び分量に関連する注意〉

本剤中のビタミンB₂(リボフラビン)により、尿が黄色になる場合があります。


保管及び取扱い上の注意


- 1 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 2 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 3 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 4 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。



お問い合わせ先
大協薬品工業株式会社
お客様相談窓口 TEL076-479-1313
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

発売元
 大協薬品工業株式会社
富山県富山市三郷6番地

製造販売元
 大協薬品工業株式会社
富山県富山市水橋島等173