

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品
総合かぜ薬

シジエムゴールド

「シジエムゴールド」は様々なかぜの症状に効果的な9つの有効成分を配合した総合かぜ薬です。アセトアミノフェンとエテンザミドは頭痛・発熱を鎮める作用があり、ジヒドロコデインリン酸塩はせき中枢に作用してつらいせきを鎮めます。また、体力の回復を促したり、かぜの時に大切なビタミンB₁・B₂を配合しています。12歳以上のお子様からご年配の方まで服用頂けます。

△ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと**（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

- 次の人は服用しないでください
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
(3)12歳未満の小児。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください（眠気等があらわれることがあります。）
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- 服用前後は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください

🗨️ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15歳未満）。
(4)高齢者。
(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6)次の症状のある人。 高熱、排尿困難
(7)次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	過度の体温低下

まれに右記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
薬剤性過敏症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節（首、わきの下、股の付け根等）のはれ等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

裏面も必ずお読みください

【用法・用量】

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	2 カプセル	3 回 食後なるべく30分以内に服用してください。
12歳以上15歳未満	1 カプセル	
12歳未満	服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 用法・用量を厳守してください。
2. 12歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
3. カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏側のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）

PTPシート取り出し図



【効能・効果】

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒（発熱によるさむけ）、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

【成分・分量】

6カプセル（1920mg）中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量	作 用
アセトアミノフェン	600mg	速効的に熱や痛みの中枢に作用し、解熱・鎮痛効果をあらわします。
エテンザミド	500mg	持続的に熱や痛みの中枢に作用し、解熱・鎮痛効果をあらわします。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支を広げ、呼吸を楽にして、せきをしずめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	くしゃみ、鼻みず、鼻づまりの症状をおさえます。
無水カフェイン	50mg	アセトアミノフェンやエテンザミドの鎮痛作用を助け、痛みを和らげます。
ビスベンチアミン	5mg	かぜの際に不足しがちなビタミンB ₁ を補給します。
リボフラビン	3mg	かぜによって消耗した体力の回復を促します。
ジヒドロコデインリン酸塩	18mg	せき中枢にはたらき、せきをしずめます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	170mg	気道粘液の分泌を高め、のどにからんだたんを薄めて出しやすくします。

添加物として、乳糖水和物、バレイシヨデンブ、D-マンニトール、結晶セルロース、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ゼラチン、ラウリル硫酸ナトリウム、亜硫酸水素ナトリウムを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
4. 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。

本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

販売元 **CGM Innovation株式会社** 〒136-0071 東京都江東区亀戸3丁目24番7号
<https://www.cgmgroupp.jp>

お客様相談室：TEL 03-6811-2345 受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

薬の使用等に関するお問い合わせ先
日新薬品工業株式会社 お客様相談室
〒520-3426 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1
☎. 0120-415-688
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度

☎. 0120-149-931

製造販売元
日新薬品工業株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1