

この説明文書はお薬とともに保管し、使用の際にはよくお読み下さい。

説明文書改訂年月  
2012年4月  
(記載要領変更に伴う改訂)  
※(使用上の注意の改訂)

㊦

# ベルゲンET 第②類医薬品

総合かぜ薬(リゾチーム塩酸塩・トラネキサム酸配合)

ベルゲンETは、アレルギーや炎症の抑制作用を持つトラネキサム酸に鼻やのどの炎症時に作用するリゾチーム塩酸塩の2つの成分や、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン薬などかぜの諸症状に適した成分を効果的に配合した総合かぜ薬です。ベルゲンETは、大人から子どもまで服用しやすい小型の錠剤です。

## ⚠ 使用上の注意

**⊗ してはいけないこと** 守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる

### ❶ 次の人は服用しないで下さい

- ①本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ②本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

### ❷ 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)、トラネキサム酸を含有する内服薬

### ❸ 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい

(眠気等があらわれることがある。)

### ❹ 服用前後は飲酒しないで下さい

### ❺ 長期連用しないで下さい

必ずお守り下さい



## 相談すること

### ❶ 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- ①医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- ②妊婦又は妊娠していると思われる人。
- ③授乳中の人。
- ④高齢者。
- ⑤薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ⑥本人又は家族がアレルギー体質の人。
- ⑦次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
- ⑧次の診断を受けた人。  
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、血栓のある人(脳血栓、心筋梗塞、血栓静脈炎等)及び血栓症を起こす恐れのある人

### ❷ 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胸やけ、胃部不快感、胃痛、口内炎
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
シ ョ ッ ク (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

### ❸ 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

### ❹ 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

裏面もお読み下さい→

## 用法・用量

1日3回食後なるべく30分以内に服用して下さい。

年齢	1回量	服用回数
成人 15歳以上	3錠	1日3回
11歳以上15歳未満	2錠	
5歳以上11歳未満	1錠	
5歳未満	服用しない <b>×</b>	


＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (2) 5歳未満の小児には服用させないで下さい。

## 効能・効果

### かぜの諸症状

(のどの痛み、せき、たん、発熱、悪寒、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み、くしゃみ、鼻水、鼻づまり)の緩和




## 成分・分量と作用

成分	成人1日量(9錠)中	作用
アセトアミノフェン	900.0mg	熱を下げ、頭痛、悪寒、関節の痛み、のどの痛みをやわらげます。
トラネキサム酸	420.0mg	アレルギーや鼻・のどの炎症をおさえます。
リゾチーム塩酸塩(リゾチームとして)	60.0mg(力価)	鼻やのどの炎症時に作用し、粘稠なたんを切れやすくします。
チベピジンヒベンス酸塩	75.0mg	咳中枢に直接作用し、せき・たんをしずめます。
d l-メチルエフェドリン塩酸塩	60.0mg	気管支をひろげ、せき・たんをしずめます。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりをおさえます。
無水カフェイン	75.0mg	頭痛をやわらげます。

添加物として、乳糖水和物、セルロース、クロスカルメロースNa、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール、三二酸化鉄、カルナウバロウ、ミツロウを含有しています。

## 保管及び取扱い上の注意

- 1 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 2 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 3 他の容器に入れ替えないで下さい。  
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 4 水分が錠剤に付きますと、内容成分の変化の原因となりますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないで下さい。
- 5 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- 6 ビンのキャップは湿気などを避けるために使用のつどしっかりしめて下さい。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。  
明治薬品株式会社お客様相談室  
電話 話：☎0120-53-3451  
受付時間：9:00~17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)