



ご使用に際し、この添付文書は必ずお読みください。また、必要な時にお読みになれるように大切に保管してください。

非βリン系
かぜ薬 スパロンゴールド 第Ⅱ種医薬品

かぜは初期の治療が一番大切です。クシャミ、鼻水が出たら早めに「スパロンゴールド」を服用してください

 『使用上の注意』

 してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 今までに本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 15才未満の小児

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気があらわれることがある。)

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

5. 服用時は飲酒しないでください

6. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難、頻尿、排尿痛、血尿、残尿感
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しき、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化したります。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢、尿量の減少等があらわれる。
ぜんそく	息をすくとゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しき等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には服用を中止

し、医師薬剤師又は登録販売者に相談してください

口のかわき

4.5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

[効能又は効果]

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

[用法及び用量]

15才以上1回 2カプセル

1日3回、食後なるべく30分以内に水またはお湯と一緒に服用して下さい。

15才未満 服用しないこと

「用法及び用量に関連する注意」

定められた用法、用量を厳守してください。

(カプセルの取り出し方)

カプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込まないでください)



[成分及び分量] 1日量 (6カプセル)中

アセトアミノフェン	300mg
エテンザミド	1,000mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7mg
dI-メチルエフェドリン塩酸塩	30mg
無水カフェイン	150mg
ゴオウ	3mg

添加物として顆粒剤に乳糖、アラビアゴム及びカプセルにゼラチン、赤色3号、黄色4号、酸化チタン、ラウリル硫酸ナトリウムを含有する。

[保管及び取扱い上の注意]

1. 直射日光のあたらない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 誤用をさげ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
4. 使用期限(外箱記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先
森田製薬株式会社 御貴者相談窓口
電話 0954-62-2331
受付時間 午前9:00～午後5:00まで
(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

発 売 元 森田製薬株式会社

佐賀県鹿島市大字三河内甲960番地

製造販売元 カシマ薬品商事株式会社

佐賀県鹿島市古枝字天神甲470-12