

ご使用に際し、この添付文書は必ずお読みください。
また、必要な時にお読みになれるように大切に保管してください。

第②類医薬品

かぜ薬 ヒカリゴールド顆粒

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

- (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと (眠気があらわれることがある。)

4. 服用時は飲酒しないこと

5. 長期連用しないこと

相談すること 🗨

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)授乳中の人。
- (4)水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。
- (5)高齢者。
- (6)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (7)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (8)次の症状のある人。高熱、排尿困難
- (9)次の診断を受けた人。

心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、
甲状腺機能障害、糖尿病、高血圧

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振	その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイアンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
ぜんそく	

(2)5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
口のかわき

【効能・効果】

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

【用法・用量】

年齢区分	服用量(1回量)	年齢区分	服用量(1回量)
15歳以上	1包	3歳以上 7歳未満	1/3包
11歳以上15歳未満	2/3包	1歳以上 3歳未満	1/4包
7歳以上11歳未満	1/2包	1歳未満	服用しないこと

1. いずれも1日3回、食後なるべく30分以内に服用すること。
2. 水またはお湯と一緒に服用すること。

(用法・用量に関連する注意)

1. 定められた用法、用量を厳守すること。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】 1日量 3包(4,500mg)中に次の成分を含んでいます。

成分名	含有量	成分名	含有量
アセトアミノフェン	580mg	チクセツニンジン末	1,200mg
エテンザミド	520mg	カンゾウ末	750.5mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	ケイヒ末	300mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	45mg	ショウキョウ末	300mg
無水カフェイン	100mg		

添加物として、乳糖、カルメロースカルシウムを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 誤用をさげ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。
4. 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。
5. 使用期限（外袋記載）を過ぎた製品は服用しないこと。

お問い合わせ先

製造販売元 西海製薬株式会社

住 所 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦192番地

電話番号 0942-92-2303(代)

受付時間 9:00~16:00(土、日、祝日を除く)