

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

総合感冒薬

第②類医薬品

ハイドリンS小児用

ハイドリンS小児用は、お子様のかぜの諸症状を緩和するシロップ剤です。

⚠ 使用上の注意

本剤は小児用ですが、総合感冒薬として定められた一般的な注意事項を記載しております。

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含む有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい

（眠気等があらわれることがあります。）

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい

5. 服用前後は飲酒しないで下さい

6. 長期連用しないで下さい

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)高齢者。
- (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5)次の症状のある人。

高熱、むくみ、排尿困難

(6)次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|-------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい |
| 泌尿器 | 排尿困難 |
| その他 | 過度の体温低下 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

| 症状の名称 | 症 状 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ショック (アナフィラキシー) | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |
| 腎障害 | 発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。 |
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、 ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| ぜんそく | 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。 |
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。 |

（裏面もお読み下さい。）

| | |
|-------|-------------------------|
| 無顆粒球症 | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 |
| 呼吸抑制 | 息切れ、息苦しさがあらわれる。 |

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
便秘、口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和。

用法・用量

1日3回毎食後及び必要な場合には就寝前に服用して下さい。場合により1日6回まで服用して差し支えありませんが、原則として4時間の間隔をおいて服用して下さい。

| 年 齢 | 1回量 | 備 考 |
|----------|---------|----------------------------------|
| 3才以上7才未満 | 3.0mL | 添付の計量コップを用い、年齢に応じて、左記の分量を計って下さい。 |
| 1才以上3才未満 | 2.0mL | |
| 1才未満 | 服用しないこと | |

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法、用量を厳守して下さい。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- 12才未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先して下さい。

成分・分量

| 成 分 | 1日量(18mL)中 | 働 き |
|------------------------|------------|------------|
| アセトアミノフェン | 240mg | 発熱、頭痛などの緩和 |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 1.8mg | 鼻水、鼻づまりの緩和 |
| ジヒドロコデインリン酸塩 | 6mg | せき、たんの緩和 |
| dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | 12mg | せき、たんの緩和 |
| 無水カフェイン | 30mg | 頭痛の緩和 |
| カンゾウエキス(カンゾウとして996mg) | 249mg | のどの痛みの緩和 |
| ジリュウ流エキス(ジリュウとして120mg) | 0.12mL | 発熱の緩和 |

添加物としてクエン酸、クエン酸Na、安息香酸Na、パラベン、エタノール、プロピレングリコール、香料、白糖、カラメルを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- びんの口、計量コップは常に清潔にして下さい。
- 使用期限はケース底面及びラベルに記載されています。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く服用して下さい。
- 本剤は生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用して下さい。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

消費者相談窓口 日新製薬株式会社

TEL 0748-62-4163

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

製造販売元

日新製薬株式会社

〒528-0013 滋賀県甲賀市水口町宮の前2-62