

2018年4月

第②類医薬品

この説明書は本剤とともに保管し、服用に際しては必ずお読みください。

かぜ薬


非ピリン系

地竜・生姜(ショウキョウ)
配合のかぜ薬

ミミトンエースカプセル
MimitonA

ミミトンエースカプセル
MimitonA は熱を下げるのにすぐれた効果を発揮する生薬の地竜エキスやショウキョウ末を配合したかぜ薬で、熱、せき、いたみなど11のかぜの諸症状を改善します。

⚠ 使用上の注意



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)



1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと (眠気等があらわれることがある。)

4. 服用前後は飲酒しないこと

5. 長期連用しないこと



相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。高熱、排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人。心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

裏面もお読みください

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステップ・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壞死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒュヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりべつとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 口のかわき、眠気
4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[効能・効果]

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

[用法・用量]

1日3回、食後なるべく30分以内に服用

年 齢	成 人(15歳以上)	7歳以上15歳未満	7歳未満
1回量	1回2カプセル	1回1カプセル	服用しないこと

〔用法・用量に関する注意〕

- (1)用法・用量を厳守すること。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

〔成分・分量〕 6カプセル(成人1日量) 中に次の成分を含んでいます。

成 分	分 量	成 分	分 量
アセトアミノフェン	538.0mg	クエン酸チベピジン	60.0mg
エテンザミド	400.0mg	地竜乾燥エキス	51.95mg
無水カフェイン	100.0mg	(原生葉換算量 地竜400.0mg)	
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	ショウウキョウ末	200.0mg
添加物としてカルメロースカルシウム、ヒドロキシプロビルセルロース、乳糖水和物、パレイショデンプン、カプセル本体にヒプロメロース(植物由来)、カラギーナン、ソルビタン脂肪酸エステル、着色料(酸化チタン)を含む。			

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
(2)小児の手の届かない所に保管すること。
(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

お問い合わせ先

連絡先 わき製薬株式会社 お客様相談室
住 所 奈良県北葛城郡広陵町南郷898
電 話 0120-200-114
受付時間 午前9時から午後5時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元

WAKI ワキ製薬株式会社
〒635-0814 奈良県北葛城郡広陵町南郷898
URL: <http://www.a-kusuri.co.jp/>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話: 0120-149-931 (フリーダイヤル)