

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるように大切に保管して下さい。

肩こり痛 腰痛に **ペインサール[®]** 顆粒

シャクヤク・カンゾウエキス配合

解熱鎮痛薬 第②類医薬品

特 長

- ◆解熱鎮痛成分アセトアミノフェンなどのほか、芍薬、甘草の各エキスが配合されています。
- ◆腰痛・関節痛・神経痛・筋肉痛などいろいろな痛みに対し良く効きます。
- ◆溶けやすく飲みやすい顆粒剤です。



使用上のご注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないで下さい。
 - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
（眠気等があらわれることがあります）
4. 服用前後は飲酒をしないで下さい。
5. 長期連用しないで下さい。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15才未満)。
 - (4)高齢者。
 - (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6)次の症状のある人。 むくみ
 - (7)次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精 神 神 経 系	めまい
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

症状の名称	症 状
皮膚粘膜眼症候群 (ステイブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をししたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

保管及び取り扱い上の注意

- 1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)
- 4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用して下さい。
- 5)使用期限の過ぎた製品は服用しないで下さい。

効能・効果

- 1)腰痛・関節痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・神経痛・頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- 2)悪寒・発熱時の解熱

用法・用量

- 15才以上1回 …………… 1包
11才以上15才未満1回 …………… 2/3包
7才以上11才未満1回 …………… 1/2包
1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用して下さい。
服用間隔は4時間以上おいて下さい。
- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
 - (2)7才未満の小児には服用させないで下さい。
 - (3)用法及び用量をお守り下さい。

成分・分量 1日量(3包中) 1包量0.8g

シャクヤク(芍薬)エキス……………200mg(原生薬2000mgに相当する)
カンゾウ(甘草)エキス……………250mg(原生薬1000mgに相当する)
アセトアミノフェン……………900mg
エテンザミド……………300mg
無水カフェイン……………150mg
アリルイソプロピルアセチル尿素……………180mg
添加物として、乳糖水和物、リン酸水素Ca水和物を含有します。

製造販売元 株式会社廣昌堂 富山県射水市水戸田2841

消費者ご相談窓口

本剤をご使用になり、何かお気づきの点がございましたら下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

発売元 **日新製薬株式会社**

滋賀県甲賀市水口町宮の前2-62

お客様相談窓口：0120-967-862

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)