



効能・効果

- 1) 頭痛・神經痛・月経痛(生理痛)・肩こり痛・関節痛・腰痛・筋肉痛・歯痛・咽喉痛・抜歯後の疼痛・耳痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛
- 2) 悪寒・発熱時の解熱

用法・用量

大人 15才以上 1回1包(4粒)
7才以上15才未満 1回1/2包(2粒)
1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさせて服用する。
服用間隔は6時間以上おくこと。

注意

(1) 用法・用量を厳守すること。(2) 小児に服用させる場合は、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量 1包(1.3g)中
T・D・S(ビタミンB1) 10mg アセトアミノフェン 300mg リホフタリン(ビタミンB2) 2mg エテナゼミド 500mg ブロモバレリル尿素 200mg 無水カフェイン 100mg 添加物: サッカリン・Na水和物、黄色4号(タトラジン)、赤色3号、カシワ、パレイショニンブン、アラビアゴム、オレンジ油、寒梅粉、酸化チタン、タルク、ヒドロキシプロピルセルロース

1.3g×2包入
希望小売価格
¥200+税
配置期限

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

成光薬品工業株式会社 奈良県北葛城郡広陵町大塚739
相談窓口 0745-55-0044

紙外装 プラ分包

服用に際して、この文書を必ずお読みください。
又、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

解熱鎮痛薬

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)
1. 次の人は服用しないこと
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことのある人。
 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬
 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと

(眠気等があらわれることがある。)
 4. 服用前後は飲酒しないこと
 5. 長期連用しないこと

▢ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人は。
 - (4) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。
 - (5) 高齢者。
 - (6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (7) 次の診断を受けた人。心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振	その 他	過度の体温低下

裏面もお読みください

まれに下記の重篤な症状が起ることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、どののかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステーフンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなプツプツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(筋々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒュヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 眠気

4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[保管及び取り扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。
- (5) 配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。



成光薬品工業株式会社

〒635-0834 奈良県北葛城郡広陵町大塚739
TEL 0745-55-0044 FAX 0745-55-5265

