

第②類医薬品



非ピリン系

鎮痛・解熱

チンツァーサン

歯痛・頭痛・神経痛・生理痛

製造販売元

中新薬業株式会社

富山県滑川市上小泉504-2

お客様相談室 電話076(475)2121 内線57(開発部)



品目番号78-431

**有効成分** 1日量(2包)中(1包量:1,200mg)  
 アセトアミノフェン……………600mg  
 エテンザミド……………1,000mg  
 アリルインプロピルアセチル尿素……………120mg  
 無水カフェイン……………120mg  
 添加物として乳糖水和物、トウモロコシデンプン、黄色5号を含有する。(その他の添加物成分は、説明文書をご覧ください)

**効能効果**

- 1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- 2) 悪寒・発熱時の解熱

**用法用量**

年齢	1回量	年齢	1回量
15歳以上	1包	3歳以上7歳未満	1/2包
11歳以上15歳未満	2/3包	1歳以上3歳未満	1/4包
7歳以上11歳未満	1/2包		

1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用して下さい。服用間隔は6時間以上おいて下さい。

**注意**

1. 次の人は服用しないで下さい。  
 (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人  
 (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
  2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
  3. 服用が適さない場合があるので、服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  4. 服用に際しては、説明文書をよく読んで下さい。
  5. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
  6. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
  7. 配置期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- 副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

配置期限 2包入 ¥250+税



## 解熱鎮痛薬(顆粒剤)

第②類医薬品



## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないで下さい。
  - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。  
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。  
(眠気等があらわれることがあります)
- 服用前後は飲酒しないで下さい。
- 長期連用しないで下さい。

## 相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - 医師又は歯科医師の治療を受けている人
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)
  - 高齢者
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 次の診断を受けた人  
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振	その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

腎障害	発熱、発疹、尿量減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

#### 眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

#### 効能・効果

- (1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛  
(2) 悪寒・発熱時の解熱

#### 用法・用量

年 齢	1 回量	1 日服用回数
15歳以上	1 包	2 回を限度とする
11歳以上15歳未満	2/3包	
7 歳以上11歳未満	1/2包	
3 歳以上7 歳未満	1/3包	
1 歳以上3 歳未満	1/4包	
1 歳未満	服用しないこと	

なるべく空腹時をさけて服用して下さい。服用間隔は6時間以上おいて下さい。

#### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。  
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

#### 成分・分量 1 日量（2 包）中

アセトアミノフェン	600mg
エテンザミド	1000mg
ア Rilイソプロピルアセチル尿素	120mg
無水カフェイン	120mg
添加物として乳糖水和物、トウモロコシデンプン、黄色5号、無水ケイ酸、カルメロースCa、メチルセルロースを含有する。	

#### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。  
(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。  
(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）  
(4) 1 包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2 日以内に服用して下さい。  
(5) 表示の期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

#### お問い合わせ先

中新薬業株式会社 お客様相談室  
電 話 076 (475) 2121 内線 57(開発部)  
受付時間 9:00～16:00 (土、日、祝日を除く)



製造販売元 **中新薬業株式会社**  
富山県滑川市上小泉504-2