

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

頭痛・神経痛・腰痛などの痛みとねつに

第2類医薬品

解熱鎮痛薬

頭痛ノコサンA

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3) 15歳未満の小児。
 - (4) 出産予定日12週以内の妊婦。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
(眠気があらわれることがある)
4. 服用前後は飲酒しないこと
5. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の診断を受けた人。
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、青あざができる
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胸やけ、胃もたれ、腹痛、下痢、血便、胃腸出血
精神神経系	めまい
その他	鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、発熱、のどの痛み、背中への痛み、過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、 皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に 小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、 食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色 くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等 があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切 れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみら れ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするとゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息 苦しい等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関 節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘 膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分 が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製
品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

- 1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- 2) 悪寒・発熱時の解熱

用法・用量

1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用すること。服用間隔は6時間以上おくこと。

年 齢	成人(15才以上)	15才未満
1回量	1 包	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守すること。

成分・分量 1日量(2包)中(1包1g)

成 分	2包中	はたらき
アスピリン	650mg	熱を下げ、痛みをしずめます
アセトアミノフェン	450mg	〃
エテンザミド	400mg	〃
プロモバレルリル尿素	150mg	気持ちをしずめます
無水カフェイン	150mg	頭痛をしずめます

添加物として、バレイシヨデンブンを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。

お問い合わせ先

吉田製薬株式会社 お客様相談室
☎ 0745-69-2048

製造販売元

吉田製薬株式会社

〒639-2102 奈良県葛城市東室34