

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

のりもの酔いに

第2類医薬品

ジャニメイト

ジャニメイトは、乗車船30分から1時間前の服用で、乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の症状を予防します。気分が悪くなつてからの服用でも、乗物酔いの症状を緩和します。



使用上の注意



してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります〕

- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- 医師の治療を受けている人。
- 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 高齢者。
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の症状のある人。
排尿困難
(6)次の診断を受けた人。
緑内障、心臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、便秘、眠気、目のかすみ

裏面もよくお読みください。

【効能・効果】

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

【用法・用量】

次の量を、水又は白湯にて服用してください。

ただし、乗物酔いの予防には乗車船30分から1時間前に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1錠	必要に応じて追加服用する場合には、服用間隔は4時間以上をおいて2回を限度としてください
15歳未満		服用しないでください

〈用法・用量に関する注意〉

用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】

1錠中の量

成 分	分 量
塩酸メクリジン	25mg
ピリドキシン塩酸塩	10mg
スコポラミン臭化水素酸塩水和物	0.25mg
無水カフェイン	20mg

添加物として、セルロース、トウモロコシデンプン、リン酸水素Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、タルク、ステアリン酸Mg、l-メントールを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

**〈お問い合わせ先〉**

本剤のご使用により、何かお気付きの点がございましたら、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

日本薬剤株式会社「お客様相談窓口」

電話番号 076-424-2239

[月～金 9:00～17:00 (祝日を除く)]

製造販売元 **日本薬剤株式会社**

富山市東中野町一丁目1番1号

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

2NN2