

第3類医薬品

開封口

日本薬局方

炭酸水素ナトリウム

(重曹)

炭酸水素ナトリウム「コザカイ・P」

Sodium Bicarbonate

制酸剤

500g



製造販売元 小堺製薬株式会社
東京都墨田区両国4-36-9

2012年4月改訂(記載要領変更に伴う改訂等)

この外箱の説明書は、本剤の使用前に必ずお読みください。
なお、必要なとき読めるよう大切に保管してください。

使用上の注意

⊗ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。】

1. 次の人は服用しないでください。
透析療法を受けている人
2. 長期連用しないでください。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 次の診断を受けた人
腎臓病
2. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)嘔吐、飲みすぎ、胃痛

用法・用量

大人(15歳以上) 1回1.5g
8歳以上～15歳未満は大人量の1/2量
3歳以上～8歳未満は大人量の1/4量を1日3回、食前または食間に服用する。
(スプーンすり切り1杯は1.5gです。)

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

第3類医薬品

日本薬局方

炭酸水素ナトリウム

(重曹)

炭酸水素ナトリウム「コザカイ・P」

Sodium Bicarbonate

制酸剤

500g



製造販売元 小堺製薬株式会社
東京都墨田区両国4-36-9

使用期限:

製造番号:

成分

本品1日量(4.5g)中、日本薬局方 炭酸水素ナトリウム4.5g含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話:0120-149-931(フリーダイヤル)

〈小堺製薬お客様相談窓口〉

電話:03-3631-1495(代表)

受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)



紙 外箱

内袋 スプーン