

液状の胃ぐすり


第2類医薬品

水なしで服用できる

胃もたれ・むかつき・胸やけ・胃痛

ダラマックSP

Suspensions Stomach Medicine 〈分包〉



製造販売元

新生薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町清水谷1269

12包

第2類医薬品

液状の胃ぐすり

ダラマック
SP

Suspensions
Stomach Medicine



胃もたれ



むかつき

第2類医薬品

液状の胃ぐすり

ダラマック
SP

Suspensions
Stomach Medicine



水なしで服用できる

第2類医薬品

液状の胃ぐすり 〈分包〉 ダラマックSP

ケースは本剤とともに保管し、服用の際には必ずお読みください。

△【使用上の注意】

☒ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1. 次の人は服用しないこと
透析療法を受けている人。
 2. 長期連用しないこと

☑ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 次の診断を受けた人。腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、このケースを持って医師又は薬剤師に相談してください
- (1) 2週間位服用しても症状がよくならない場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
便秘、下痢

【成分・分量】

1包(10g)中

成分	分量
合成ヒドロタルサイト	1000mg
グリシン	100mg

添加物：D-ソルビトール、D-マンニトール、クエン酸水合物、サッカリンNa水合物、デヒドロ酢酸Na、カルメルロスNa、香料（l-メントール）

【効能・効果】

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ（胃もたれ）、胃重、胸つかえ、げっぷ（おくび）、はきけ（むかつき）、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気（悪心）、嘔吐、飲み過ぎ（過飲）、胃痛

【用法・用量】

次の量を、食間空腹時に服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1包	3回
15歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

液の飛び出しに注意し、分包の順序で服用してください。

【保管及び取扱上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 1里の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 配置期限（ケースに記載）を過ぎた製品は服用しないでください。

【お問い合わせ先】

新生薬品工業株式会社
電話番号 0744-52-3330
受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

12包入 ¥1,300

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931