

肥後赤玉



胃腸薬

赤玉腹調丸

発売元

熊本県家庭薬株式会社

熊本県玉名郡和水町江田四三一九一

TEL0968(86)2010

受付時間 9時～16時(土日祝日を除く)

第2類医薬品

効能・効果

胃もたれ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ、胸やけ、胸つかえ、胃部・腹部膨満感、食欲不振、消化不良、胃弱、食べ過ぎ

用法・用量

大人(15歳以上)……………1回 45丸(1包)
11歳以上15歳未満……………1回 30丸(2/3包)
8歳以上11歳未満……………1回 22丸(約1/2包)
5歳以上8歳未満……………1回 15丸(1/3包)
1日3回、食前または食間に服用してください。
(5歳未満は服用しないでください)

成分・分量

3包(135丸)(大人の1日量)中
ロートエキス……………30mg オウバク末……………1000mg
センブリ末……………50mg ショウキョウ末……………250mg
ゲンチアナ末……………250mg ゲンノショウコ末……………1500mg
添加物：寒梅粉、デヒドロ酢酸Na、ヒプロメロース、酸化チタン、タルク、赤色2号、赤色102号

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

1包45丸入 2包 ¥250

製造販売元



佐藤薬品工業株式会社

奈良県橿原市観音寺町9番地の2



配置期限

製造番号

注意

1. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
2. 服用が適さない場合がありますので、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
3. 服用に際しては、説明文書をよくお読みください
4. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
5. 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください

*2011年10月改訂(記載要領変更に伴う改訂)

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

胃腸薬の使用上の注意

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 胃腸鎮痛鎮痙薬
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
排尿困難
2. 次の診断を受けた人。
心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

裏面もお読みください

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

口のかわき

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

その他の注意

母乳が出にくくなることがあります。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。