

第2類医薬品

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう、大切に保管してください。

防湿アルミパック包装

胃もたれ・飲みすぎ・食べ過ぎ・胸やけに

和漢生薬配剤

新アロセロン顆粒

胃痛・胃弱・消化不良・二日酔・悪酔のむかつきに

人間が健康で快適な生活を送るには身体の諸器官が全て健全でなければなりませんが、とりわけ胃腸は食物を消化吸収し、栄養分を体内に供給する重要な臓器であります。日常生活においての過労や食べすぎ、飲みすぎ、神経的緊張などによりその胃腸機能が衰えると不快な症状が生じることがあります。本剤は炭水化物、たんぱく質など食物の消化をうながす消化酵素、胃液の酸度をととのえる制酸剤、それに鎮痛剤、健胃生薬などを合理的に配合した胃腸薬で胃腸の不快症状にすぐれた効果をあらわします。

[成分・分量] 1包 (1.5g) 中

ケイヒ(桂皮)末	135mg	ゲンチアナ末	6.7mg
シュクシャ(縮砂)末	50mg	ビオヂアスターぜ700	40mg
ショウキョウ(生姜)末	33.3mg	アルカマック	160mg
チョウジ(丁子)末	10mg	重質炭酸マグネシウム	50mg
ウイキョウ(茴香)末	16.7mg	炭酸水素ナトリウム	500mg
センブリ(当薬)末	1.2mg	ロートエキス	10mg
ニクズク(肉豆蔻)末	8.3mg		

他に芳香剤としてL-メントール、矯味剤としてカンゾウ末、崩壊剤としてD-マンニトール、ヒドロキシプロピル starch、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、着香料として香料を含む。

[新アロセロンの働きと特長]

- 胃のもたれ、胃重、胸のつかえを去り、胃腸の働きを活発にします。
- 消化酵素（ビオヂアスターぜ700）の働きで食物の消化を助け、胃腸の負担を軽くします。
- 健胃生薬（胃のためによい薬草成分）は、芳香性、辛味性及び苦味性健胃剤を組み合わせました。これらの和漢生薬の香りや味が口の粘膜や胃壁を刺激して、唾液・胃液など消化液の分泌を促し、食欲不振・消化不良など消化機能が低下した胃の働きを活発にします。
- 制酸剤のアルカマック、重質炭酸マグネシウム及び炭酸水素ナトリウムの働きにより胃内の酸度を調整し、胃粘膜を保護し、胸やけ、げっぷ、胃のむかつきなどの症状に効果をあらわします。又胃の神経緩和作用をあらわすロートエキスにより胃の痛みをやわらげます。
- 健胃・消化剤と制酸剤を別々に整粒することによって、それぞれの成分の安定性を増加させています。
- 本剤の顆粒は、水が浸透しやすく早く崩壊するようつくられていますので、口に含むと、サッと溶け、ざらつき感もなく、のみやすくなっています。
- 品質を保つために防湿効果のすぐれたアルミパック包装を採用しています。

[効能・効果]

胃酸过多、胸やけ、胃部不快感、もたれ（胃もたれ）、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ（むかつき）、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、恶心）、嘔吐、飲みすぎ、胃痛、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感。

[用法・用量]

15才以上 1回 1包 11才以上 15才未満 1回 $\frac{2}{3}$ 包
8才以上 11才未満 1回 $\frac{1}{2}$ 包 5才以上 8才未満 1回 $\frac{1}{3}$ 包
1日 3回 食後服用する。

(注意) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用されること。

裏面もお読みください

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる）

1. 次の人は服用しないこと。

透析療法を受けている人

2. 本剤を服用している間は、次の医薬品も服用しないこと。

胃腸鎮痛鎮痙薬

3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること。（母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある。）

4. 長期連用しないこと。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 高齢者。

(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(5) 次の症状のある人。 排尿困難

(6) 次の診断を受けた人。腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。 □のかわき

4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

その他の注意

母乳がでにくくなることがある。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。

(2) 小児の手の届かない所に保管すること。

(3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わること。）

■お問い合わせ先

製造販売元 天真堂製薬株式会社 お客様相談室

奈良県高市郡明日香村越495の1

電話 0744(54)3088(代表)

受付時間：午前9時から午後5時まで（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931