

胃腸薬

新和喜胃腸薬「錠剤」

新和喜胃腸薬「錠剤」は制酸剤と胃の調子を整える4種類の生薬を主薬とし、胸やけ、胃もたれ、飲み過ぎ、食べ過ぎ、胃痛などの不快な諸症状を改善する胃腸薬です。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください。
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)次の診断を受けた人。

腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、下痢
3. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔効能・効果〕

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部・腹部膨満感、もたれ（胃もたれ）、胃重、胃弱、胸つかえ、げっぷ（おくび）、食欲不振（食欲減退）、消化不良、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、恶心）、嘔吐、飲み過ぎ、食べ過ぎ、胃痛

〔用法・用量〕

年齢	1回量
成人15歳以上	4錠
11歳以上15歳未満	3錠
5歳以上11歳未満	2錠
5歳未満	服用しないこと

1日3回食後服用する。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

〔成分・分量〕 12錠（成人1日量）中に次の成分を含む褐色の錠剤

沈降炭酸カルシウム	1500mg
炭酸マグネシウム	200mg
チンピ末	500mg
ゲンノショウコ末	300mg
ケイヒ末	200mg
ショウキョウ末	200mg
ニガキ末	200mg

添加物として結晶セルロース、アラビアゴム末、L-メントール、ショ糖脂肪酸エステルを含む。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

■お問い合わせ先 ワキ製薬株式会社 お客様相談室

住所 奈良県北葛城郡広陵町南郷898

電話 0120-200-114

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

URL:<http://www.a-kusuri.co.jp/>

製造販売元 ワキ製薬株式会社 奈良県北葛城郡広陵町南郷898

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話：0120-149-931（フリーダイヤル）