

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品 食べすぎ・飲みすぎ・胸やけに

新佐藤胃腸薬〈分包〉

新佐藤胃腸薬〈分包〉は、制酸成分、消化酵素、健胃生薬を配合した胃腸薬です。

新佐藤胃腸薬〈分包〉は、速効性で持続性の制酸成分である合成ヒドロタルサイト、複合消化酵素ビオザスターゼ1000、鎮痛作用のあるロートエキスに5種類の健胃生薬を配合した服用しやすい胃腸薬です。食べすぎ、飲みすぎ、胸やけ、はきけ、胃痛、消化不良による胃部・腹部膨満感等に効果があります。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
（母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。）
4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5)次の症状のある人。
排尿困難
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効能・効果

食べすぎ、飲みすぎ、胸やけ、胃酸過多、胃部不快感、胃もたれ、胃痛、はきけ（胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき）、嘔吐、胸つかえ、げっぷ、食欲不振、消化不良、胃弱、消化不良による胃部・腹部膨満感

用法・用量

次の量を食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	1 包	3 回
11歳以上15歳未満	2/3包	
8 歳以上11歳未満	1/2包	
5 歳以上 8 歳未満	1/3包	
5 歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

3 包（成人の1日量）中

成 分	含 量	は た ら き
合成ヒドロタルサイト	1500mg	過剰の胃酸を中和して、不快な過酸症状を改善します。
ピオヂアスターゼ1000	150mg	炭水化物、蛋白質、脂肪の消化を助けます。
ロートエキス	30mg	胃酸の分泌を抑え、胃の痛みを和らげます。
ゲンチアナ末	75mg	低下した胃腸のはたらきを活発にし、消化液の分泌を促して消化機能を整えます。
ショウキョウ末	120mg	
ケイヒ末	300mg	
ウイキョウ末	105mg	
チョウジ末	60mg	

添加物：l-メントール、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ポビドン、無水ケイ酸

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4)1 包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2 日以内に服用してください。
- (5)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

- (1)本製品の購入先
- (2)佐藤薬品工業株式会社 医薬情報室
TEL 0744-28-0021
受付時間 9：00～16：30（土・日・祝日を除く）

製造販売元



佐藤薬品工業株式会社
奈良県橿原市観音寺町9番地の2