



第3類医薬品

スルートス

おしり想いの
便秘薬

便をやわらかくして、出す
便秘、*食欲不振(食欲減退)、*腹部膨満、*痔の方に

180錠

▲吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりとしめて下さい。▲

この説明書は、服用前に必ずお読み下さい。
また、必要時に読めるよう保管しておいて下さい。

第3類医薬品

販売名:スルートス

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化し、副作用が起こりやすくなる)
本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと:他の瀉下薬(下剤)

☒ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。(4) 次の症状のある人: はげしい腹痛、吐き気・嘔吐。
(5) 次の診断を受けた人: 腎臓病。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状	関係部位	症状
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐	呼吸器	息苦しい
精神神経系	強い眠気、意識がうされる	その他	筋力の低下、口のかわき
循環器	立ちくらみ、脈が遅くなる		

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること: 下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】○便秘○便秘に伴う次の症状の緩和: 頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常酵素、痔

【用法・用量】次の量を就寝前にコップ1杯の水で服用すること。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しづつ增量又は、減量すること。

年齢	1回量	1日服用回数	年齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	3~6錠	1回	5歳~6歳	1~2錠	1回
11歳~14歳	2~4錠		乳幼児(5歳未満)	服用しないこと	
7歳~10歳	2~3錠				

【用法・用量】(1) 定められた用法、用量を厳守すること。(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】6錠(大人の1日量)中

成分	分量	添加物: クロスカルメロースナトリウム(クロスCMC-Na)、 ショ糖脂肪酸エステル、結晶セルロース
酸化マグネシウム	2000mg	

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わるために) (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

発売元: ミライズ製薬株式会社

東京都中央区築地6丁目22-4

お問い合わせ先: 未来堂

電話 0570-78-3639 受付時間 9:00~18:00(土・日・祝日を除く)

製造販売: 原沢製薬工業株式会社

東京都港区高輪3丁目19番17号

製造

番号

使用

期限



4 595056 643036

副作用被害救済制度 0120-149-931

MADE IN JAPAN

M334P1①



PE. 金属