

【用法・用量】次の量を1日1回、就寝前(又は空腹時)に服用します。ただし、初回は最少量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。(本剤は腸溶錠ですので、かんだり、つぶしたりせずにそのまま服用してください)

年齢	15歳以上	11歳以上15歳未満	11歳未満
1回量	2~3錠	1~2錠	服用しないこと

【用法・用量に関連する注意】(1)定められた用法・用量を厳守してください。(2)小児に服用する場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。(3)本剤は腸溶錠ですので、かんだり、つぶしたりせずにそのまま服用してください。また、剤服剤(異業に含まれる)や牛乳を飲まれたあとは、しばらく服用しないでください。(4)錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、断面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(崩壊してそのまま飲み込みますと食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)

【効能・効果】○便秘の便秘に伴う次の症状の緩和:頭痛、のぼせ、おし下す
 肛めれ、軟出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

50錠

第②類医薬品



BENTOL
 ベントール



4 580602 370335



販売名:ベントール

【成分・分量】1日量3錠中 ビソコシル……15mg センソシド……40mg

添加物として、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、ヒドロキシプロピルメタクリレート、クエン酸トリエチル塩、タルク、アラビアゴム末、ゼラチン、白糖、マゴロール、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、カルメロースナトリウム、カルナウバロウ、赤色3号を含有します。

【成分・分量に関連する注意】●本剤の服用により、尿が黄褐色又は赤褐色になることがあります。これは主成分センソシドによるものであり、異常ではありません。

第②類医薬品

使用期限

製造番号

版No.1

開封口



発売元 株式会社フロムココロ
 福岡県福岡市中央区薬院1-5-6 5F

製造販売元 至誠堂製薬株式会社 奈良県御所市茅原220-1

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
 ①他の瀉下薬(下剤) ②授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。③大量に服用しないでください

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 次の症状のある人。はげしい腹痛、吐き気・嘔吐 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢
 4. 1週間単位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【保管及び取扱い上の注意】1. 直射日光の当たらない湿気の少ない所に保管してください。2. 小児の手の届かない所に保管してください。3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。4. 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

お問い合わせ窓口(お客様相談室)
 株式会社フロムココロ 0120-556-073
 受付時間 9:00~18:00