

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の強心薬



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

3. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■効能・効果

動悸、息切れ、気付け

■用法・用量

次の量を、食後水又は白湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上(成人)	2粒	朝夕 2回
15歳未満	服用しないこと	

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) かまわずに服用してください。

■成分・分量 4粒(1日量、50mg)中

ゴオウ……………2mg 牛胆……………2mg
センソ末……………4mg 真珠末……………4mg
ニンジン末……………10mg 鹿茸末(ロクジョウマツ)……………2mg
沈香末……………2mg 龍腦……………2mg
添加物としてトウモロコシデンプン、セルロース、アルファー化デンプン、デヒドロ酢酸Na、薬用炭、アラビアゴムを含有します。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

■その他

本品は、手に乗せた場合、黒い粉末状のものが付着する場合がありますが、これは剤形及び品質保持の目的で丸剤をコーティングしている薬用炭によるもので、問題はありません。

■お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いします。
日野薬品工業株式会社 お客様相談窓口
電話 0748-52-1232 受付時間 9時～17時(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **日野薬品工業株式会社**
滋賀県蒲生郡日野町上野田119

A2012A

この添付文書は服用前に必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう本剤とともに保管してください。

第2類医薬品

虔修六神丸

強心薬