



第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

☒してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の強心薬

相談すること

- 次の人には服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- 医師の治療を受けている人
- 妊娠又は妊娠していると思われる人
- 次の症状のある人
激しい下痢、高熱

- 服用後、次の症状が現れた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

まれに下記の重篤な症状が起ることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる

- 5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分及び分量 (1包中)

カンゾウ	GLYCYRRHIZAE RADIX	50mg
トウキ	ANGELICAE RADIX	100mg
ジャコウ	MOSCHUS	0.6mg
ゴオウ	BEZOAR BOVIS	6mg
センソ	BUFONIS CRUSTUM	0.5mg
ニンジン	GINSENG RADIX	100mg
ボタンビ	MOUTAN CORTEX	100mg
ブクリョウ	PORIA	100mg
ソウジュツ	TRACTYLODIS LANCEAE RHIZOMA	100mg
タイソウ	ZIZYPHI FRUCTUS	100mg
サイコ	BUPLEURI RADIX	200mg
カシュウ	POLYGONI MULTIFLORI RADIX	200mg
チンビ	CITRI UNSHIU PERICARPIUM	100mg
沈降炭酸カルシウム	CALCI CARBONAS PRAECLIPITATUS	342.9mg

効能又は効果

動悸、息切れ、気付け、ねあせ、小児疳症(神経過敏)

用法及び用量

次の量を、朝夕、食前又は食間に水または白湯で服用すること

年令	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	2回
8歳以上15歳未満	1/2包	2回

〈用法・用量に関する注意〉

- 用法・用量を厳守すること
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること

保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光の当らない湿気の少ない涼しい所に保管すること
- 小児の手の届かない所に保管すること
- 他の容器に入れ替えないこと
(誤用の原因になったり品質が変わる)

消費者相談窓口

- 購入された薬局、薬店
- 芳香園製薬株式会社
香川県綾歌郡宇多津町浜八番丁134番地5
電話: 0877-49-0021
(午前9時から午後5時まで 土、日、祝日を除く)

芳 香 園 製 薬 株 式 会 社
香川県綾歌郡宇多津町浜八番丁134番地5