

△使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起こりやすくなる)

(1) 小児には服用させないでください。

(2) 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用
しないでください。

他の強心薬

☑ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売
者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用
の可能性があるので、直ちに服用を中止し、
この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売
者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

3. 5～6日間服用しても症状がよくならない場
合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬
剤師又は登録販売者に相談してください。

どうき 息切れ 気付け

1回2粒 1日2回

開封口

第2類医薬品

ケゴン

効能又は効果

動悸、息切れ、気付け

成分及び分量 1日量(4粒)中59.9mg

ゴ オ ウ	2mg	沈 香 末	5mg
セ ン ソ	5mg	五 八 霜 末	10mg
サ フ ラ ン	5mg	藤 脳	2.5mg
鹿 茸 末	4mg	ニンジ ン末	7.5mg
牛 胆	2.5mg		

イカリソウエキス(乾燥)…10mg(原生薬として100mg)
添加物としてサリチル酸、寒梅粉、アラビアゴム末、全糖
を含有しています。

用法及び用量

大人1回2粒 1日2回 朝夕に水又は白湯にて服用してください。
小児(15歳未満)は、本剤を服用しないでください。

用法及び用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) かまずに服用してください。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 服用に際しては、説明文をよく読んでください。
- (4) 缶の容器に入れかえないでください。(服用の原因になったり品質が変わります。)
- (5) 期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用救済相談センター ☎0120-149-931
配達品目番号 第4-503-26

製造販売元 **三星製薬株式会社**

〒650-0001 兵庫県神戸市153番地
電話 0745-65-2130

紙 : 箱
台紙

キャップ : 中栓

ガラス : 瓶