

この説明文書は服用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## つらいせき・たんに 鎮咳去痰薬

第2類医薬品

# グレイスせき止め錠

グレイスせき止め錠は、せきをすみやかにしずめるだけでなく、粘るたんをうすめ、のどの粘膜を修復するL-カルボシステインや、去たん生薬のカンゾウ・バクモンドウが、たんの排出をスムーズにし、たんが絡むことで出るせきもしずめます。

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が  
起こりやすくなる)

#### 1. 次の人は服用しないこと

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと (眠気等があらわれることがある。)


必ずお読みください。



#### 🗨️ 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、肝臓病、甲状腺機能障害



#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、興奮、けいれん
呼吸器	息苦しさ、息切れ
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効 能

せき、たん

## 用法・用量

次の量を、水又はぬるま湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	服用回数
成人(15才以上)	2錠	1日3回食後
8才～14才	1錠	
8才未満	服用しないでください。	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。  
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



## 成分・分量

6錠中

成分名	分量
L-カルボシステイン	750mg
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	60mg
クレマスチンフマル酸塩(クレマスチンとして1mg)	1.34mg
トリメトキノール塩酸塩水和物	6mg
無水カフェイン	90mg
カンゾウ乾燥エキス(カンゾウ820mgに相当)	105mg
バクモンドウ乾燥エキス(バクモンドウ1350mgに相当)	270mg

添加物：CMC-Ca、メタケイ酸アルミン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、トウモロコシデンプン、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、タルク、酸化チタン、カルナウバロウ、黄色5号

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。
- (5)表面の一部が溶けて斑点になりますので、ぬれた手でふれないでください。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室  
電話：0120-584-419  
受付時間：10時～16時(土、日、祝日を除く)

## 副作用被害救済制度の お問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構  
☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元 小林薬品工業株式会社  
岐阜県岐阜市中鶉1丁目139番地