

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品



ゼリア新葉

せき・たんに

# セピーせき止め顆粒

CEPIE COUGH GRANULE

鎮咳・去痰生薬配合

鎮咳去痰薬

## 〔特徴〕

セピーせき止め顆粒は、せきを鎮める成分（ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩）、たんの切れをよくする成分（グアヤコールスルホン酸カリウム）にさらに4種類の生薬を配合した優れた鎮咳・去痰剤です。



## 使用上の注意

## してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

## \*\* 1. 次の人は服用しないでください

- (1) 12才未満の小児。
- (2) フェニルケトン尿症の人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気等があらわれることがあります。)
4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
5. 過量服用・長期連用しないでください

## 相談すること



## 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。高熱、排尿困難
- \*(6) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

## 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

\*まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
便秘、口のかわき、眠気

4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## [効能・効果]

せき、たん

## \*\*[用法・用量]

年齢	1回量	用法
成人(15才以上)	1包	1日3回、食後に服用してください。
12才以上15才未満	2/3包	
12才未満		服用しないでください。

### 〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 定められた用法・用量を厳守してください。

## [成 分] 1日量(3包)中

ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	キキョウ乾燥エキス	40mg(キキョウ400mgに相当)
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	セネガ乾燥エキス	27mg(セネガ405mgに相当)
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg	キヨウニンエキス	40mg(キヨウニン400mgに相当)
グアヤコールスルホン酸カリウム	270mg	ケイヒ末	100mg
添加物：アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、D-マンニトール、結晶セルロース、カルメロースカルシウム、香料、エタノール、バニリン			

## [保管及び取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080  
〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町 10-11  
受付時間 9:00 ~ 17:50 (土・日・祝日を除く)

ホームページ <https://www.zeria.co.jp/>

### 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 [https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

セピーはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



製造販売元



ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11