

TRADE MARK



第②類医薬品

せき、たんじ

セルフメディケーション

税 控除 対象

**新セキドメS**

ジヒドロコデインリン酸塩主剤

製造販売元 御所薬舗株式会社  
奈良県御所市1207

お客様相談窓口 電話 0745-62-3388

## 効能・効果 せき、たん

### 用法・用量

大人15歳以上…1回1包 12歳以上15歳未満…1回2/3包  
1日3回、毎食後に服用してください。

【用法及び用量に関連する注意】(1)用法及び用量を厳守すること。(2)小児(12歳以上15歳未満)に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

### 成分・分量 1日量(3包)中

シトロコテインリン酸塩… 30mg dL-メチルエフドリン塩酸塩… 75mg  
グアヤコールスルホン酸カリウム… 270mg キキョウ末… 1000mg  
添加物としてパレイショデンプン、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

### ⚠ 使用上の注意 ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと。12歳未満の小児。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと。他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。(眠気等があらわれることがある。) 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること。 5. 過量服用・長期連用しないこと。

### 🌸 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 高齢者。(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5) 次の症状のある人。高熱(6) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、

肥満症 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。
------	------------------

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。便秘、眠気 4.5~6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【保管及び取扱い上の注意】(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)

2包(1包1050mg×2)入 希望小売価格 ¥250+税

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

使用期限

製造番号

