

TRADE MARK



第②類医薬品

せき、たん

新セキドメS

ジヒドロコデインリン酸塩主剤

キキョウ末配合 顆粒〈6包入〉

発売元 増田製薬株式会社 奈良県橿原市川西町429

せき、たんにも **新セキドメS**

第②類
医薬品

第②類
医薬品

効能・効果

せき、たん

注意

1. 次の人は服用しないこと 12歳未満の小児 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと 3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること 4. 服用が適さない場合があるので、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 5. 服用に際しては、説明文書をよく読むこと 6. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること

用法・用量

15歳以上 1回 1包
12歳以上15歳未満 1回 2/3包
1日3回、毎食後に服用してください。

成分・分量 1日量(3包)中

ジヒドロコデインリン酸塩 30mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg
グアヤコールスルホン酸カリウム 270mg
キキョウ末 1000mg
添加物としてバレイシヨデンブ、ヒドロキシブ
ロピルセルロース、カルメロースCaを含有する。

押しあける

配置期限

2025.02

A09

6包(1包1.050mg)入 ¥750+税

新セキドメS

新セキドメS


第②類
医薬品

セキドメ使用上の注意  (裏面へつづく)

 **してはいけないこと** **第②類医薬品**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと。12歳未満の小児。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと。他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。(眠気等があらわれることがある。)
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること。
5. 過量服用・長期連用しないこと。

 **相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)高齢者。(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5)次の症状のある人。高熱(6)次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。
------	------------------

- 3.**服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。便秘、眠気
- 4.5**～**6**回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【用法及び用量に関連する注意】

- (1)用法及び用量を厳守すること。
 (2)小児(12歳以上15歳未満)に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

- 【保管及び取扱い上の注意】 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
 (2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)