

ホノピレチン[®]「せき」*deux*

第2類医薬品

- ◆ のどや気管の弱い体質の人は、かぜをひくと“せき”の出ることが多いものです。また、かぜをこじらせる
と咽喉や気管に細菌やウイルスが繁殖し、“せき”がよく出るようになります。さらに“せき”が続くと咽喉
や気管に炎症が起こり、そこに細菌・ウイルスが繁殖するため悪化すると肺の方にまで病気が及びます。
悪化しないうちに、ホノピレチン「せき」*deux*で“せき・たん”を止めて下さい。
- ◆ ホノピレチン「せき」*deux*のキョウニン・ゴミシ・サイシン・シャゼンシ・ノスカピンなどは“せき”を止め
るように働き、カンゾウ・シャゼンシとともに“たん”を除きます。ショウキョウ・ハンゲはゴミシなどの
鎮咳効果（ちんがい）を助けます。さらにソヨウ・カンゾウ・*d*-クロルフェニラミンマレイン酸塩は“せき・たん”の
原因となるアレルギー症状に対応し、かぜをひいたときの“せき・たん”を鎮めます。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、
乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
（眠気等があらわれることがある。）



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人。
緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、
この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受ける
こと。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜 が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が 悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた
場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるため、医師、
薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

せき、たん

用法・用量

次の量を食後に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	6 錠	3 回
11歳以上15歳未満	4 錠	
8歳以上11歳未満	3 錠	
5歳以上 8歳未満	2 錠	
5 歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本剤18錠(3.6g)中

キョウニンエキス…………… 54 mg、ゴミシエキス……………120mg
サイシンエキス…………… 36 mg、シャゼンシエキス…………… 25mg
ソヨウエキス……………100 mg、ハンゲエキス…………… 60mg
カンゾウ末……………900 mg、ショウキョウ末……………100mg
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩…………… 4.5mg、ノスカピン…………… 45mg

添加物としてカルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖を含有する。

- ・本剤は淡褐色で、特異なおいを有し、味は甘く後苦い素錠です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

薬と養生

ホノピレチン「せき」*deux*は生薬の特性を活かした生薬配合製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

また、気持ちの持ち方(気の養生)や食生活(食の養生)に注意することも、病気を治すためには大事なことです。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬配合製剤や養生方法のをご理解いただいている医師やホノミ漢方会々員の薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号