



大晃生薬印



大晃生薬有限公司

名古屋市千種区松軒一丁目5番12号

【用法及び用量】

大人（15歳以上）は1回量0.5g、1日2回、食前または食間に服用する。

（食間とは…食後2～3時間を指します。）

【効能又は効果】

激しい咳、咽喉痛の緩解



内袋: PE/PET

（裏面の「使用上の注意」などもよくお読みください。）

第2類医薬品

日本薬局方

カンゾウ末

内容量 500g

Lot.



4 987716 121754

保管及び取扱い上の注意

- (1)本品は吸湿してカビが生じたり虫がつく事がありますので、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記をお願いいたします。

大晃生薬有限会社 試験室

電話：フリーダイヤル 0120-335064

受付時間：9時～12時、13時～17時

(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：フリーダイヤル 0120-149-931

⚠ 使用上の注意

3

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

短期間の服用にとどめ、連用しないでください。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 次の症状のある人……むくみ
- (5) 次の診断を受けた人…高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。