

← 開封口

【効能・効果】

せき、たん

【用法・用量】

- 5才以上8才未満……………1回 10mL
- 3才以上5才未満……………1回 7.5mL
- 1才以上3才未満……………1回 6mL
- 3カ月以上1才未満……………1回 3mL
- 3カ月未満……………服用しないでください

1日3回毎食後及び必要な場合には就寝前に服用してください。また、約4時間の間隔をおいていただければ1日6回まで服用できます。

＜用法・用量に関する注意＞

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
- (3)用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】1日量(60mL中)

有効成分	含量	はたらき
デキストロメトルファン 臭化水素酸塩水和物	20mg	せき中枢に働き、せきを しずめます。
グアイフェネシン	100mg	気道粘膜に働いて、たん を出やすくします。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	4mg	炎症に伴うせきをし ずめます。

添加物として、白糖、果糖ブドウ糖液糖、クエン酸、安息香酸ナトリウム、パラベン、プロピレングリコール、香料を含む。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お問い合わせ先】

- (1)購入した薬局・薬店
- (2)中北薬品株式会社 製薬工場事業部
電話:0567-32-1431
受付時間:9時から17時まで
(土、日、祝日及び弊社指定休日を除く)

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

安全キャップの使用方法

- 安全キャップの取り付け方
- ①付属の計量カップ及び安全キャップを外してから、キャップをあけてください。
- ②ボトルの口周囲に液の付着がないことを確認して、安全キャップを普通のキャップを閉める要領でしっかり閉めてください。
- 安全キャップのあけ方
- ①キャップを強く押しながら②矢印の方向に回してあけます。



第2類医薬品

セルフメディケーション

税 控除 対象

Akubi Girl®

©タツノコプロ



アビちゃんのこども せきどめシロップG

製造販売元


中北薬品株式会社

愛知県津島市白浜町字番場52-1



第2類医薬品

アビちゃん せきどめ



アビちゃんのこどもせきどめシロップG

3ヶ月以上8才未満

120mL

2024年5月作成(第1版)

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保存してください。

第2類医薬品 鎮咳去痰薬

販売名:アビちゃんのこどもせきどめシロップG

【特徴】

「アビちゃんのこどもせきどめシロップG」は3カ月から8才未満のおさま用のせき止めシロップです。せきを鎮め、たんの切れをよくします。

⚠ 使用上の注意

本剤は小児用ですが、鎮咳去痰薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。

⊗ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)
1. 次の人は服用しないでください
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがある。)

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4)次の症状のある人。 高熱、排尿困難
(5)次の診断を受けた人。 緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息苦しさ、息切れ
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、眠気
4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製造番号: _____

使用期限: _____

