



日本薬局方 シャゼンソウ

第3類医薬品

ナカジマ シャゼンソウ



4 936246 100401

9

使用期限

Lot.

副作用救済制度 TEL0120-149-931



, PA

【御注意】

- 一、本品は天産物ですから直射日光をさけ、又性質上吸湿しカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。
- 二、本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。
- 三、小児の手の届かない所に保管して下さい。

製造発売元

中嶋生薬株式会社

京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29-2

日本薬局方 シャゼンソウ
ナカジマ シャゼンソウ

第3類医薬品

使用上の注意
相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 次の症状のある人。 高熱
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5~6 回服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
定められた用法・用量を守り正しくお使いください

効能又は効果
せき。

用法及び用量

大人(15歳以上)は1日量10gを約600mLの水で約400mLになるまで煮つめ、滓をこし去り、食前又は食間3回に分けて服用して下さい。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 誤用を避け品質を保持するために、他の容器に入れ替えないで下さい。
- 本品は防虫、防カビのため脱酸素剤を封入していますので、これと一緒に煎じないようにご注意ください。
- ご購入の際、万一異常がありましたらお手数ですがお知らせ下さい。

製造販売元：中嶋生薬株式会社 ☎075-231-2633

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931