

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮咳薬（非麻薬性）

デキストロメトルファン臭化水素酸塩YO錠

■製品の特徴

- ・せき中枢に直接作用し、つらいせきに効果を発揮するデキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物を鎮咳成分として含有します。
- ・成人（15歳以上）はもちろん8歳以上の小児のつらいせきにも服用いただけます。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください。

- (1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人
- (2)8歳未満の小児

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など
（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など）

3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください。 （眠気などがあられることがある。）



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦または妊娠していると思われる人
- (3)薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
- (4)次の症状のある人 高熱

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息苦しさ、息切れ

まれに、下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合には、直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック （アナフィラキシー）	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って、医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

眠気

- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

■ 効能又は効果

せき

■ 用法及び用量

次の量を水または温湯で服用してください。

服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	2錠	3回
8歳以上15歳未満	1錠	
8歳未満	服用しないこと	

●定められた用法・用量を厳守してください。

●錠剤の取り出し方

錠剤の入っているシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、錠剤を取り出して服用してください。（誤ってシートをのみこんだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。）

■ 成分及び分量と働き

成人1日量 6錠中に以下の成分を含みます。

成分	分量	働き
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	60mg	延髄のせき中枢に直接はたらき、せきを鎮めます。

添加物として乳糖水和物、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願いいたします。

薬王製薬株式会社「お客様相談室」

電 話：0744-33-8855

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元

薬王製薬株式会社

奈良県磯城郡田原本町245番地