

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際にはよくお読みください。

鎮咳去痰薬 第2類医薬品

# CONTACTせき止め液 W

## 新コンタックせき止め液ダブルアタック

これは内服用のお薬(飲み薬)です。

- 新コンタックせき止め液ダブルアタックは、独自のダブルアタック処方で、せき・たん  
にすぐれた効果を発揮。
- せきを抑える有効成分デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物が、せき中枢に  
直接作用してせきをしずめ、グアイフェネシンがたんを出しやすくします。
- コデイン(麻薬性鎮咳成分)無配合・カフェイン無配合。
- 飲みやすい、はちみつレモン味。

### ⚠ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

#### 1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 肺感染症、重い喘息又は重い呼吸器疾患のある人。
- (3) モノアミン酸化酵素阻害剤(セレギリン塩酸塩等)を服用している  
又は過去2週間以内に服用したことがある人。

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等 (鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気等があら われることがあります。)

#### 4. 服用前後の飲酒はできるだけお控えください



#### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。  
高熱
- (6) 慢性又は持続性のせき、又は過剰な痰を伴うせきのある人。
- (7) 次の診断を受けた人。  
肝臓病、腎臓病、CYP2D6低代謝型(肝臓における代謝酵素の  
働きが弱い)
- (8) 選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)又は三環系抗うつ薬  
などのセロトニン作用を有するうつ病治療薬を服用している人。
- (9) 過去に薬物などをらん用したことがある人。

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ち に服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に 相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息苦しさ、息切れ

(裏面に続く)

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
セロトニン症候群	服用後、混乱する、落ち着かない、汗をかく、手やからだが震える、手足が勝手に動く、血圧の上昇等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 【効能】

せき、たん

### 【用法・用量】

下記の1回量を、添付の目盛り付きコップではかり、1日3回食後に服用してください。なお、場合により4時間ごとに1日6回まで服用することができます。

年 齢	1回量
成人(15歳以上)	10mL
15歳未満の小児	服用しないこと



### <用法・用量に関連する注意>

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。ただし、その範囲内のなるべく少ない回数で、最低限の期間の服用にとどめてください。

定められた用量を超えて本剤を服用した場合は、直ちに医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 【成分】 60mL中

成 分	分量(mg)
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	60
グアイフェネシン	300

添加物：グリセリン、スクラロース、クエン酸、クエン酸ナトリウム、安息香酸Na、エデト酸Na、香料

### 【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

### 【お問い合わせ先】

(1) 購入した薬局・薬店

(2) グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社

お客様相談室

【電 話】 0120-099-301

【受付時間】 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

コンタックの他の製品情報やかぜと鼻炎に関する様々な情報は、[contac.jp](http://contac.jp) へ

発売元

グラクソ・スミスクライン・  
コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社  
〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1

製造販売元

アルフレッサ ファーマ株式会社  
〒540-8575  
大阪府中央区石町二丁目2番9号