

第2類医薬品

鎮咳去痰薬

ビューンせきどめ顆粒

ビューンせきどめ顆粒はせきや痰のつらい症状を緩和するよう、ジヒドロコデインリン酸塩をはじめとする、さまざまな成分を配合した鎮咳去痰薬です。それぞれの成分がその特徴を活かし、優れた効果を発揮します。

- 不快なたんには：グアイフェネシン配合
- つらいせきには：ジヒドロコデインリン酸塩、ノスカピン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩配合
- のどの痛みを伴うせきには：無水カフェイン配合



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
 - (1) フェニルケトン尿症の人。
 - (2) 12歳未満の小児。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります。)
4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
5. 過量服用・長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しき等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、口のかわき、眠気
4. 5~6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

成分・分量

1日量3包(1包1g)中

成分	分量	はたらき
ジヒドロコデインリン酸塩	30.0mg	せき中枢及び気管支に作用し、せきを鎮めます。抗ヒスタミン剤クロルフェニラミンマレイン酸塩はこれらの作用を助けます。
ノスカピン	60.0mg	
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75.0mg	
グアイフェネシン	240.0mg	気道粘膜の分泌機能を高め、たんをうすめて出しやすくします。
無水カフェイン	150.0mg	のどの痛みをやわらげます。

添加物として、水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈物、乳糖水和物、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)を含みます。

効能・効果

せき、たん

* 用法・用量

次の量を、食後なるべく30分以内に水と一緒に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
15歳未満12歳以上	2/3包	
12歳未満	服用しないでください	

《用法・用量に関連する注意》

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)配置期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

(お問い合わせ先) 本剤についてのお問い合わせは下記までご連絡ください。

新生薬品工業株式会社

電話番号 0744-52-3330 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

発売元



株式会社 中京医薬品

愛知県半田市亀崎北浦町2-15-1

製造販売元

新生薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町清水谷1269