

第2類医薬品

販売名:ピタセキストローチ
 特徴 ●口腔内殺菌成分・セチルピリジニウム塩化物水合物を配合しており、のどの炎症によるのどの痛み・はれを抑えます。●鎮咳成分・フェノールフタリン酸デキストロメトランファンが咳中枢にはたらくいて、つらい咳を抑えます。

▲使用上の注意

- ☒してはけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1. 次の人は使用しないこと。本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 2. 本剤を使用している間は、次いずれの医薬品も使用しないこと。他の鎮咳薬(咳止薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(消炎内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等))
 3. 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと(眠気等があらわれることがある。)

▲相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 次の症状のある人。高熱
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息苦しさ、息切れ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。悪寒
4. 5-6回使用しても症状よくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

S231005 副作用被害救済制度 TEL 0120-149-931

使用
期限
製造
番号



使用に際してはこの説明書をよく読み、本剤とともに保管してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手が届かぬ所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になり品質が変わる)。(4) アルミ袋開封後はすみやかに使用すること。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

【効能・効果】せき、たん、のどの炎症によるのどの痛み、のどのはれ、のどのあれ、のどの不快感、声がれ

【用法・用量】次の量を口中に含み、かまずにつり溶かして使用すること。

年齢	1回量	1日使用回数	使用期間
成人(15歳以上)	1個	6回	2週間以上
15歳未満			使用しないこと。

<用法・用量に関連する注意>


- (1) 定められた用法・用量を厳守すること。
- (2) かんたに、のみこんだりしないこと。

【成分】6個(1日使用量)中


成分	含量
フェノールフタリン酸デキストロメトラン	60mg
グアヤコールスルホン酸カリウム	140mg
セチルピリジニウム塩化物水合物	6mg

添加物:ヒドロキシプロピルセルロース、ポビドン、プルラン、マクロゴール、トメントール、タンニン酸、D-ソルビトール、サッカリンNa、ショ糖脂肪酸エステル、スクラロース、銅クロロフィリンNa、香料

<のみにごまさないために> 使用例



舌にのせ、口を開き、上あごに貼る時により口中でゆっくり溶かしてください



製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
 東京都千代田区稲田町1-27
 お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>

話しながら使える
 貼り付くトローチ

咳やたんを
 おさえる

ぴたっと

PITAS

—ピタス—



実物大



移動中



会議中



鑑賞中

販売名:
 ピタセキストローチ

セルフメディケーション

税 控除 対象

第2類医薬品

12 個入り