

パープルショット うがい薬

Purple Shot
Gargle **AZC**

100mL 第3類医薬品

パープルショット うがい薬

Purple Shot
Gargle **AZC**



口の中 のどのはれ

殺菌消毒・口の洗浄
口臭除去
Swelling, Disinfection,
Cleaning in oral cavity
Bad breath removal
Made in Japan



100mL 第3類医薬品



販売名: パープルショットうがい薬AZC 第3類医薬品

ご使用に際しては、この説明書をお読みください。
また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

効能・効果
口腔・咽頭のはれ、口腔内及びのどのはれ、消毒・洗浄、口臭の軽減

用法・用量

1日約0.5mL(15~20回)の本品を水又は純蒸馏水約100mLに薄めて、数回うがいをしてください。これを1日に数回行ってください。

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 用法・用量を厳守してください。(必ず薄めて使用してください)
- (2) 小児に使用させる場合には、必ず保護者の指導のもとで使用させてください。
- (3) 目に入らぬよう注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、眼科医の診察を受けてください。
- (4) うがい薬のみ使用し、列剤や他のうがい薬と一緒に使用しないでください。
- (5) 本品をご使用の度に薄め、薄めた後は早めにご使用ください。

成分・分量 本品100mL中

- アズレン/ホジ酸ナトリウム水和物(水溶性アズレン).....0.4g
 - セリシチリジウム塩化水化物(CPC).....1.0g
- 添加物として、L-メントール、グリセリン、D-ソルビトール、キシリトール、液状アジチン酸化マシ油、プロピルグリコール、パラベン、リン酸水素Na、リン酸二水素Na、香料を含む。




4 935583 204551
パープルショットうがい薬AZC

開封年月日

開封時に記入してください。

(うがい液の薄め方)



1. カップ底面の目盛り 2. カップを水平に保ちが水平になるようにし、上部に刻んであるカップを傾け(45°)、る100の線まで水本剤を0.5mLの目盛り位置まで入れてください。

△使用上の注意

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人。
(3) 次の症状のある人、口内のひびきたれ
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
口	痒痛部

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器へ入れ替えないでください。(誤用の原因につながる危険等がある場合があります。)
- (4) 開けて薬液が乾燥等に対応した場合は、すぐに捨て、よく洗い落してください。
- (5) 計量カップは使用のあと、水洗い等して常に清潔に保ってください。
- (6) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。尚、使用期限があっても、開封後はなるべく早く使用してください。(使用期限はパッケージ底面に記載しております。)




発売元 白金製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市 上品寺町515

お客様相談室 TEL: 0744-21-5588
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造 ダイヤ製薬株式会社
販売元 〒634-0803 奈良県橿原市 上品寺町515

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931



紙 計量カップ: PP

MADE IN JAPAN

製造番号

使用期限