

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。



痔疾用剤

第②類医薬品

痔光軟膏ホワイテ

■外用痔疾用薬 ■販売名：痔光軟膏ホワイテ

痔光軟膏ホワイテは、炎症をおさえるヒドロコルチゾン酢酸エステル、グリチルレチン酸をはじめ、鎮痛作用を有するリドカイン、殺菌作用を有するイソプロピルメチルフェノールを配合した白色軟膏で、痔の諸症状を緩和します。

痔光軟膏ホワイテは油性基剤を使用していますが、水で洗い流すことができます。



使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないでください
・患部が化膿している人。
2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
そ の 他	刺激感、化膿

3. 10日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

■ 効能・効果

きれ痔（さけ痔）・いば痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒

■ 用法・用量

適量を取り、肛門部に塗布する。なお、1日3回まで使用できる。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 肛門部にのみ使用してください。

■ 成分・分量（100g中）

ヒドロコルチゾン酢酸エステル	500mg
リドカイン	3000mg
グリチルレチン酸	1000mg
イソプロピルメチルフェノール	100mg

※添加物として、白色ワセリン、セタノール、ミリスチン酸イソプロピル、ステアリン酸ポリオキシシル40、ソルビタンセスキオレイン酸エステルを含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 軟膏が冷たくなりすぎるとチューブから出なくなる場合があります。
その場合には、暖かい場所に移してしばらくしてから使用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までお願いいたします。

合名会社 東宝製薬 電話 058-251-6668 (代表)
受付時間 10:00~16:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元 合名会社 東宝製薬
岐阜市沖ノ橋町3丁目45番地